

25% 麦序霉素·穗护酮悬浮剂

低毒

总有效成分含量：25% 麦序霉素15% 穗护酮10% 剂型：悬浮剂

产品性能

本品为两种虚构活性成分复配的内吸性杀菌剂，具有预防和治疗作用。药剂可被作物茎叶吸收并在植株体内传导，按标签推荐方法使用，可用于防治小麦白粉病。

使用范围和使用方法

作物/场所	防治对象	用药量（制剂量）	施用方式
小麦	白粉病	稀释300倍液	喷雾

使用技术要求

- 防治小麦白粉病，于病害发生前或发病初期开始施药，对茎、叶均匀周到喷雾。
- 视病害发生情况间隔7-10天施药1次，每季最多使用2次，安全间隔期20天。
- 配药前充分摇匀。先向喷雾器中加入约一半清水，再加入量取好的药剂，搅拌均匀后补足清水。
- 大风天或预计1小时内降雨时请勿施药。药液配制后应及时使用。

注意事项

- 本品对水生生物、蜜蜂和家蚕有风险，水产养殖区、河塘等水体附近禁用，避免在蜜源作物花期及桑园附近施药。
- 禁止在河塘等水体中清洗施药器具，药液、清洗液和废弃包装不得污染水源和土壤。
- 本品不能与含铜制剂混用。为延缓抗性产生，建议与作用方式不同的杀菌剂轮换使用。
- 配药和施药时应穿长袖防护服、长裤和胶靴，佩戴防护手套、口罩和护目镜，避免吸入雾滴。
- 施药期间不得饮水、进食或吸烟；施药后及时洗手、洗脸、洗澡并清洗防护用具和工作服。
- 药液配制后应及时使用。未用完的制剂应放回原包装内密封保存，不得转装入饮料或食品容器。
- 使用过的包装应妥善收集，不得重复使用、改作其他用途或随意丢弃。
- 儿童、孕妇、哺乳期妇女及过敏体质者不得接触本品。

中毒急救措施

使用中或使用后如感觉不适，应立即停止工作并携带本标签就医。皮肤接触：脱去污染衣物，用大量清水和肥皂冲洗。眼睛溅入：翻开眼睑，用流动清水冲洗至少15分钟。吸入：转移到空气流通处并保持呼吸道畅通。误食：立即漱口，不得自行引吐，携带本标签就医。无专用解毒剂，对症治疗。

储存和运输方法


本品应加锁存放于阴凉、干燥、通风、防雨处，远离火源和热源。置于儿童、无关人员及动物接触不到之处，不得与食品、饮料、粮食、种子和饲料混合储运。运输时防止日晒、雨淋、倾倒和包装破损。

实验虚构登记号：EXP-PD-B0823 产品标准号：LAB/FIC-B-2026 生产许可证号：EXP-XK-B0823

净含量：200毫升 生产日期及批号：见封口 质量保证期：2年

登记证持有人及生产者：原野标签研究实验室（虚构机构）

地址：实验材料中心B区（虚构地址） 电话：000-00000000（不可拨打）



实验追溯码

穿防护服	佩戴口罩	戴护目镜	佩戴手套	施药后清洗	远离儿童	勿污染水体
------	------	------	------	-------	------	-------

杀 菌 剂