

小麦杀菌剂

25% 麦序霉素·穗护酮

总有效成分含量：25% 麦序霉素15% 穗护酮10% 剂型：悬浮剂 低毒

适用作物 小麦

防治对象 小麦白粉病

- ① 叶面出现白色粉斑
- ② 粉斑扩大、逐渐连片
- ③ 严重时叶片变黄早枯



用量

每桶用水
30斤水
(15升)



+

加入本品
1两药液
(约50毫升)

使用指南：先加一半水；加入1两药液并搅匀；补足到30斤水；对小麦茎叶均匀喷施。

没有测量工具时，可以参考以下辅助方法确定用量

普通瓶盖（农夫山泉等品牌）
约 10 盖
(每盖约5毫升)

一次性纸杯（每杯约200毫升）
约 1/4 杯

本产品整瓶
约 1/4 瓶
(本瓶200毫升)

上述一桶药液可均匀喷施约半亩小麦；一亩需配两桶，共60斤水

剂量调整原则

发病前或病斑很少时
约六钱
普通瓶盖约6盖

一般情况
1 两
普通瓶盖约10盖

上次效果明显下降、仍在适用时期时
约一两一钱
普通瓶盖约11盖

施用提醒



使用前充分摇匀



对小麦茎叶喷匀



尽快用完，放置不要超过12小时

本产品特别注意

！ 用量限制

每 30 斤水最多一两二钱药液（约60毫升），不能超过！

一季最多使用
2次

再次使用至少间隔
7天

✕ 用法禁忌

收获前 20 天内不要用

- 病害已到严重后期时不要自行加浓。
- 蜜源作物花期及水体附近不要使用。

✕ 混合使用禁忌



波尔多液



氢氧化铜

不能与含铜制剂混用，例如波尔多液、氢氧化铜制剂。

违反以上要求可能造成防治失效、作物受损或人员中毒！

注意事项

- 配药和施药时穿长袖防护服、长裤和胶靴，佩戴防护手套、口罩和护目镜。
- 施药期间不得饮水、进食或吸烟；施药后及时清洗身体、防护用具和工作服。
- 药液、清洗液和废弃包装不得污染水域和土壤，禁止在水体中清洗施药器具。

- 未用完的制剂放回原包装密封保存，不得转装入饮料或食品容器。
- 使用过的包装妥善收集，不得重复使用、改作其他用途或随意丢弃。
- 儿童、孕妇及哺乳期妇女不得接触本品。

中毒急救措施

使用中或使用后如感觉不适，应立即停止工作并携带本标签就医。皮肤接触用大量清水和肥皂冲洗；眼睛溅入用流动清水冲洗至少15分钟；吸入时转移到空气流通处；误食时立即漱口，不得自行引吐。无专用解毒剂，对症治疗。

储存和运输方法

加锁存放于阴凉、干燥、通风、防雨处，远离火源和热源。置于儿童、无关人员及动物接触不到之处，不得与食品、饮料、粮食、种子和饲料混合储运。运输时防止日晒、雨淋、倾倒和包装破损。

登记和生产信息

实验虚构登记号：EXP-PD-B0823 产品标准号：LAB/FIC-B-2026 生产许可证号：EXP-XK-B0823
净含量：200毫升 生产日期及批号：见封口 质量保证期：2年
生产者：原野标签研究实验室（虚构机构） 电话：000-00000000（不可拨打）

穿防护服

佩戴口罩

戴护目镜

佩戴手套

施药后清洗

远离儿童

勿污染水体

实验用虚构农药标签 所有产品、成分、登记信息及使用数据均为虚构 禁止用于真实农业生产

杀 菌 剂