

玉米杀虫剂

16% 穗巡酰胺·苗护菊酯

总有效成分含量：16% 穗巡酰胺10% 苗护菊酯6% 剂型：悬浮剂 低毒

适用作物 玉米

防治对象 玉米螟（钻心虫）

- ① 心叶出现一排小孔
- ② 心叶里有虫粪和碎屑
- ③ 低龄幼虫藏在心叶里



玉米螟低龄幼虫



幼虫在叶面取食

用量

每桶用水
30斤水
(15升)



15升喷雾器加满



5升大矿泉水瓶 × 3

+

加入本品
1两药液
(约50毫升)

使用指南：先加一半水；加入1两药液并搅匀；补足到30斤水；重点喷玉米心叶和受害部位。

没有测量工具时，可以参考以下辅助方法确定用量



普通瓶盖（农夫山泉等品牌）

约 10 盖
(每盖约5毫升)



一次性纸杯（每杯约200毫升）

约 1/4 杯



本产品整瓶

约 1/4 瓶
(本瓶200毫升)

上述一桶药液可均匀喷施约半亩玉米；一亩需配两桶，共60斤水

剂量调整原则

刚见卵块或低龄幼虫很少时
约八钱
普通瓶盖约8盖

一般情况
1 两
普通瓶盖约10盖

虫较多但仍是低龄幼虫、上次效果不佳时
约一两一钱
普通瓶盖约11盖

施用提醒



使用前充分摇匀



重点喷玉米心叶



尽快用完，放置不要超过12小时

本产品特别注意

！ 用量限制

每 30 斤水最多一两二钱药液（约60毫升），不能超过！

一季最多使用

3次

再次使用至少间隔

7天

✖ 用法禁忌



幼虫大量钻入茎秆后，不要再自行加浓

- 收获前 14 天内不要使用。

✖ 混合使用禁忌



石硫合剂

×



波尔多液

不能与碱性药剂混用，例如石硫合剂、波尔多液。

违反以上要求可能造成防治失效、作物受损或人员中毒！

注意事项

- 配药和施药时穿长袖防护服、长裤和胶鞋，佩戴防护手套、口罩和护目镜。
- 施药期间不得饮水、进食或吸烟；施药后及时清洗身体、防护用具和工作服。
- 药液、清洗液和废弃包装不得污染水域和土壤，禁止在水体中清洗施药器具。

- 未用完的制剂放回原包装密封保存，不得转装入饮料或食品容器。
- 使用过的包装妥善收集，不得重复使用、改作其他用途或随意丢弃。
- 儿童、孕妇及哺乳期妇女不得接触本品。

中毒急救措施

使用中或使用后如感觉不适，应立即停止工作并携带本标签就医。皮肤接触用大量清水和肥皂冲洗；眼睛溅入用流动清水冲洗至少15分钟；吸入时转移到空气流通处；误食时立即漱口，不得自行引吐。无专用解毒剂，对症治疗。

储存和运输方法

加锁存放于阴凉、干燥、通风、防雨处，远离火源和热源。置于儿童、无关人员及动物接触不到之处，不得与食品、饮料、粮食、种子和饲料混合储运。运输时防止日晒、雨淋、倾倒和包装破损。

登记和生产信息

实验虚构登记号：EXP-PD-C0823 产品标准号：LAB/FIC-C-2026 生产许可证号：EXP-XK-C0823
净含量：200毫升 生产日期及批号：见封口 质量保证期：2年
生产者：原野标签研究实验室（虚构机构） 电话：000-00000000（不可拨打）

穿防护服

佩戴口罩

戴护目镜

佩戴手套

施药后清洗

远离儿童

勿污染水体

实验用虚构农药标签 所有产品、成分、登记信息及使用数据均为虚构 禁止用于真实农业生产

杀 虫 剂