

24% 玉净酮·禾封嗉悬浮剂

低毒

总有效成分含量：24% 玉净酮10% 禾封嗉14% 剂型：悬浮剂

产品性能

本品为两种虚构活性成分复配的选择性苗后除草剂。药剂经杂草茎叶吸收后抑制其生长，按标签推荐方法使用，可用于防除玉米田一年生禾本科杂草。

使用范围和使用方法

作物/场所	防治对象	用药量（制剂量）	施用方式
玉米田	一年生禾本科杂草	稀释600倍液	茎叶喷雾

使用技术要求

- 于玉米3-5叶期、杂草2-4叶期施药，对杂草茎叶均匀喷雾；避开玉米心叶。
- 每季最多使用1次，不得重复施用或自行增加浓度。
- 配药前充分摇匀。先加约一半清水，再加入量取好的药剂，搅匀后补足清水。
- 大风天或预计1小时内降雨时请勿施药，避免药液漂移至小麦、蔬菜等邻近敏感作物。

注意事项

- 本品仅用于玉米田一年生禾本科杂草，不得用于小麦田，不得在玉米5叶期后使用。
- 本品不能与有机磷类杀虫剂混用。
- 配药和施药时穿长袖防护服、长裤和胶靴，佩戴防护手套、口罩和护目镜。
- 施药期间不得饮水、进食或吸烟；施药后及时清洗身体、防护用具和工作服。
- 药液、清洗液和废弃包装不得污染水域和土壤，禁止在水体中清洗施药器具。
- 未用完的制剂放回原包装密封保存，不得转装入饮料或食品容器。
- 使用过的包装妥善收集，不得重复使用、改作其他用途或随意丢弃。
- 儿童、孕妇及哺乳期妇女不得接触本品。

中毒急救措施

使用中或使用后如感觉不适，应立即停止工作并携带本标签就医。皮肤接触用大量清水和肥皂冲洗；眼睛溅入用流动清水冲洗至少15分钟；吸入时转移到空气流通处；误食时立即漱口，不得自行引吐。无专用解毒剂，对症治疗。


储存和运输方法

加锁存放于阴凉、干燥、通风、防雨处，远离火源和热源。置于儿童、无关人员及动物接触不到之处，不得与食品、饮料、粮食、种子和饲料混合储运。运输时防止日晒、雨淋、倾倒和包装破损。

实验虚构登记号：EXP-PD-A0823 产品标准号：LAB/FIC-A-2026 生产许可证号：EXP-XK-A0823

净含量：200毫升 生产日期及批号：见封口 质量保证期：2年

生产者：原野标签研究实验室（虚构机构） 电话：000-00000000（不可拨打）



实验追溯码

穿防护服	佩戴口罩	戴护目镜	佩戴手套	施药后清洗	远离儿童	勿污染水体
------	------	------	------	-------	------	-------

除 草 剂

玉米除草剂

24% 玉净酮·禾封嗪

总有效成分含量：24% 玉净酮10% 禾封嗪14% 剂型：悬浮剂 低毒

适用作物 玉米 | 防治对象 狗尾草、马唐、牛筋草、稗草



用量

每桶用水

30斤水

(15升)



15升喷雾器加满



5升大矿泉水瓶 × 3

+

加入本品

半两药液

(约25毫升)

使用指南：先加一半水；加入半两药液并搅匀；补足到30斤水；对着杂草茎叶均匀喷施。

没有测量工具时，可以参考以下辅助方法确定用量

普通瓶盖（农夫山泉等品牌）  约 5 盖 (每盖约5毫升)	一次性纸杯（每杯约200毫升）  约 1/8 杯	本产品整瓶  约 1/8 瓶 (本瓶200毫升)
--	--	--

上述一桶药液可均匀喷施约半亩玉米田；一亩需配两桶，共60斤水

用量调整原则

草少、刚冒头或初次使用本品 约四钱 普通瓶盖约4盖	一般情况 半两 普通瓶盖约5盖	草密但仍矮小或使用多次后效果不佳时 最多六钱 普通瓶盖约6盖
---------------------------------	-----------------------	--------------------------------------

施用提醒

 使用前充分摇匀

 对着杂草茎叶喷匀

 尽快用完，放置不要超过12小时

本产品特别注意

！ 用量限制

每 30 斤水最多六钱药液（约30毫升），不能超过！

一季最多使用 1 次

✕ 用法禁忌



玉米长到第 6 片展开叶后，不再使用本品

- 大风天或一小时内可能下雨时不要喷。
- 不要喷到其他作物上。

✕ 混合使用禁忌



敌敌畏



辛硫磷

✕

不能与有机磷类杀虫剂混用，例如图中的敌敌畏、辛硫磷。

违反以上要求可能造成作物受损、死亡或人员中毒！

注意事项

1. 配药和施药时穿长袖防护服、长裤和胶靴，佩戴防护手套、口罩和护目镜。

2. 施药期间不得饮水、进食或吸烟；施药后及时清洗身体、防护用具和工作服。

3. 药液、清洗液和废弃包装不得污染水域和土壤，禁止在水体中清洗施药器具。
4. 未用完的制剂放回原包装密封保存，不得转装入饮料或食品容器。

5. 使用过的包装妥善收集，不得重复使用、改作其他用途或随意丢弃。

6. 儿童、孕妇及哺乳期妇女不得接触本品。

中毒急救措施

使用中或使用后如感觉不适，应立即停止工作并携带本标签就医。皮肤接触用大量清水和肥皂冲洗；眼睛溅入用流动清水冲洗至少15分钟；吸入时转移到空气流通处；误食时立即漱口，不得自行引吐。无专用解毒剂，对症治疗。

储存和运输方法

加锁存放于阴凉、干燥、通风、防雨处，远离火源和热源。置于儿童、无关人员及动物接触不到之处，不得与食品、饮料、粮食、种子和饲料混合储运。运输时防止日晒、雨淋、倾倒和包装破损。

登记和生产信息

实验虚构登记号：EXP-PD-A0823 产品标准号：LAB/FIC-A-2026 生产许可证号：EXP-XK-A0823
净含量：200毫升 生产日期及批号：见封口 质量保证期：2年
生产者：原野标签研究实验室（虚构机构） 电话：000-00000000（不可拨打）

穿防护服	佩戴口罩	戴护目镜	佩戴手套	施药后清洗	远离儿童	勿污染水体
------	------	------	------	-------	------	-------

实验用虚构农药标签 所有产品、成分、登记信息及使用数据均为虚构 禁止用于真实农业生产

除 草 剂

25% 麦序霉素·穗护酮悬浮剂

低毒

总有效成分含量：25% 麦序霉素15% 穗护酮10% 剂型：悬浮剂

产品性能

本品为两种虚构活性成分复配的内吸性杀菌剂，具有预防和治疗作用。药剂可被作物茎叶吸收并在植株体内传导，按标签推荐方法使用，可用于防治小麦白粉病。

使用范围和使用方法

作物/场所	防治对象	用药量（制剂量）	施用方式
小麦	白粉病	稀释300倍液	喷雾

使用技术要求

- 防治小麦白粉病，于病害发生前或发病初期开始施药，对茎、叶均匀周到喷雾。
- 视病害发生情况间隔7-10天施药1次，每季最多使用2次，安全间隔期20天。
- 配药前充分摇匀。先向喷雾器中加入约一半清水，再加入量取好的药剂，搅拌均匀后补足清水。
- 大风天或预计1小时内降雨时请勿施药。药液配制后应及时使用。

注意事项

- 本品对水生生物、蜜蜂和家蚕有风险，水产养殖区、河塘等水体附近禁用，避免在蜜源作物花期及桑园附近施药。
- 禁止在河塘等水体中清洗施药器具，药液、清洗液和废弃包装不得污染水源和土壤。
- 本品不能与含铜制剂混用。为延缓抗性产生，建议与作用方式不同的杀菌剂轮换使用。
- 配药和施药时应穿长袖防护服、长裤和胶靴，佩戴防护手套、口罩和护目镜，避免吸入雾滴。
- 施药期间不得饮水、进食或吸烟；施药后及时洗手、洗脸、洗澡并清洗防护用具和工作服。
- 药液配制后应及时使用。未用完的制剂应放回原包装内密封保存，不得转装入饮料或食品容器。
- 使用过的包装应妥善收集，不得重复使用、改作其他用途或随意丢弃。
- 儿童、孕妇、哺乳期妇女及过敏体质者不得接触本品。

中毒急救措施

使用中或使用后如感觉不适，应立即停止工作并携带本标签就医。皮肤接触：脱去污染衣物，用大量清水和肥皂冲洗。眼睛溅入：翻开眼睑，用流动清水冲洗至少15分钟。吸入：转移到空气流通处并保持呼吸道畅通。误食：立即漱口，不得自行引吐，携带本标签就医。无专用解毒剂，对症治疗。

储存和运输方法


本品应加锁存放于阴凉、干燥、通风、防雨处，远离火源和热源。置于儿童、无关人员及动物接触不到之处，不得与食品、饮料、粮食、种子和饲料混合储运。运输时防止日晒、雨淋、倾倒和包装破损。

实验虚构登记号：EXP-PD-B0823 产品标准号：LAB/FIC-B-2026 生产许可证号：EXP-XK-B0823

净含量：200毫升 生产日期及批号：见封口 质量保证期：2年

登记证持有人及生产者：原野标签研究实验室（虚构机构）

地址：实验材料中心B区（虚构地址） 电话：000-00000000（不可拨打）



实验追溯码

穿防护服	佩戴口罩	戴护目镜	佩戴手套	施药后清洗	远离儿童	勿污染水体
------	------	------	------	-------	------	-------

杀 菌 剂

小麦杀菌剂

25% 麦序霉素·穗护酮

总有效成分含量：25% 麦序霉素15% 穗护酮10% 剂型：悬浮剂 低毒

适用作物 小麦

防治对象 小麦白粉病

- ① 叶面出现白色粉斑
- ② 粉斑扩大、逐渐连片
- ③ 严重时叶片变黄早枯



用量

每桶用水
30斤水
(15升)



15升喷雾器加满



5升大矿泉水瓶 × 3

+

加入本品
1两药液
(约50毫升)

使用指南：先加一半水；加入1两药液并搅匀；补足到30斤水；对小麦茎叶均匀喷施。

没有测量工具时，可以参考以下辅助方法确定用量



普通瓶盖（农夫山泉等品牌）
约 10 盖
(每盖约5毫升)



一次性纸杯（每杯约200毫升）
约 1/4 杯



本产品整瓶
约 1/4 瓶
(本瓶200毫升)

上述一桶药液可均匀喷施约半亩小麦；一亩需配两桶，共60斤水

剂量调整原则

发病前或病斑很少时
约六钱
普通瓶盖约6盖

一般情况
1 两
普通瓶盖约10盖

上次效果明显下降、仍在适用时期时
约一两一钱
普通瓶盖约11盖

施用提醒



使用前充分摇匀



对小麦茎叶喷匀



尽快用完，放置不要超过12小时

本产品特别注意

！ 用量限制

每 30 斤水最多一两二钱药液
(约60毫升)，不能超过！

一季最多使用
2次

再次使用至少间隔
7天

× 用法禁忌

收获前 20 天内不要用

- 病害已到严重后期时不要自行加浓。
- 蜜源作物花期及水体附近不要使用。

× 混合使用禁忌



波尔多液



氢氧化铜

不能与含铜制剂混用，例如波尔多液、氢氧化铜制剂。

违反以上要求可能造成防治失效、作物受损或人员中毒！

注意事项

- 配药和施药时穿长袖防护服、长裤和胶靴，佩戴防护手套、口罩和护目镜。
- 施药期间不得饮水、进食或吸烟；施药后及时清洗身体、防护用具和工作服。
- 药液、清洗液和废弃包装不得污染水域和土壤，禁止在水体中清洗施药器具。

中毒急救措施

使用中或使用后如感觉不适，应立即停止工作并携带本标签就医。皮肤接触用大量清水和肥皂冲洗；眼睛溅入用流动清水冲洗至少15分钟；吸入时转移到空气流通处；误食时立即漱口，不得自行引吐。无专用解毒剂，对症治疗。

登记和生产信息

实验虚构登记号：EXP-PD-B0823 产品标准号：LAB/FIC-B-2026 生产许可证号：EXP-XK-B0823
净含量：200毫升 生产日期及批号：见封口 质量保证期：2年
生产者：原野标签研究实验室（虚构机构） 电话：000-00000000（不可拨打）

- 未用完的制剂放回原包装密封保存，不得转装入饮料或食品容器。
- 使用过的包装妥善收集，不得重复使用、改作其他用途或随意丢弃。
- 儿童、孕妇及哺乳期妇女不得接触本品。

储存和运输方法

加锁存放于阴凉、干燥、通风、防雨处，远离火源和热源。置于儿童、无关人员及动物接触不到之处，不得与食品、饮料、粮食、种子和饲料混合储运。运输时防止日晒、雨淋、倾倒和包装破损。

穿防护服

佩戴口罩

戴护目镜

佩戴手套

施药后清洗

远离儿童

勿污染水体

实验用虚构农药标签 所有产品、成分、登记信息及使用数据均为虚构 禁止用于真实农业生产

杀 菌 剂

16% 穗巡酰胺·苗护菊酯悬浮剂

低毒

总有效成分含量：16% 穗巡酰胺10% 苗护菊酯6% 剂型：悬浮剂

产品性能

本品为两种虚构活性成分复配的杀虫剂，具有触杀和胃毒作用。按标签推荐方法使用，可用于防治玉米螟低龄幼虫。

使用范围和使用方法

作物/场所	防治对象	用药量（制剂量）	施用方式
玉米	玉米螟	稀释300倍液	喷雾

使用技术要求

- 于玉米螟卵孵化盛期至低龄幼虫期开始施药，重点喷施玉米心叶和受害部位。
- 视虫害发生情况间隔7-10天施药1次，每季最多使用3次，安全间隔期14天。
- 配药前充分摇匀。先加约一半清水，再加入量取好的药剂，搅匀后补足清水。
- 大风天或预计1小时内降雨时请勿施药。建议与作用方式不同的杀虫剂轮换使用。

注意事项

- 本品不能与碱性药剂混用。
- 本品对蜜蜂、家蚕、水生生物有风险，蜜源作物花期、桑园及水体附近禁用。
- 配药和施药时穿长袖防护服、长裤和胶靴，佩戴防护手套、口罩和护目镜。
- 施药期间不得饮水、进食或吸烟；施药后及时清洗身体、防护用具和工作服。
- 药液、清洗液和废弃包装不得污染水域和土壤，禁止在水体中清洗施药器具。
- 未用完的制剂放回原包装密封保存，不得转装入饮料或食品容器。
- 使用过的包装妥善收集，不得重复使用、改作其他用途或随意丢弃。
- 儿童、孕妇及哺乳期妇女不得接触本品。

中毒急救措施

使用中或使用后如感觉不适，应立即停止工作并携带本标签就医。皮肤接触用大量清水和肥皂冲洗；眼睛溅入用流动清水冲洗至少15分钟；吸入时转移到空气流通处；误食时立即漱口，不得自行引吐。无专用解毒剂，对症治疗。


储存和运输方法

加锁存放于阴凉、干燥、通风、防雨处，远离火源和热源。置于儿童、无关人员及动物接触不到之处，不得与食品、饮料、粮食、种子和饲料混合储运。运输时防止日晒、雨淋、倾倒和包装破损。

实验虚构登记号：EXP-PD-C0824 产品标准号：LAB/FIC-C-2026 生产许可证号：EXP-XK-C0824

净含量：200毫升 生产日期及批号：见封口 质量保证期：2年

生产者：原野标签研究实验室（虚构机构） 电话：000-00000000（不可拨打）



实验追溯码

穿防护服	佩戴口罩	戴护目镜	佩戴手套	施药后清洗	远离儿童	勿污染水体
------	------	------	------	-------	------	-------

杀 虫 剂

玉米杀虫剂

16% 穗巡酰胺·苗护菊酯

总有效成分含量：16% 穗巡酰胺10% 苗护菊酯6% 剂型：悬浮剂 低毒

适用作物 玉米

防治对象 玉米螟（钻心虫）

- ① 心叶出现一排小孔
- ② 心叶里有虫粪和碎屑
- ③ 低龄幼虫藏在心叶里



玉米螟低龄幼虫



幼虫在叶面取食

用量

每桶用水
30斤水
(15升)



15升喷雾器加满



5升大矿泉水瓶 × 3

+

加入本品
1两药液
(约50毫升)

使用指南：先加一半水；加入1两药液并搅匀；补足到30斤水；重点喷玉米心叶和受害部位。

没有测量工具时，可以参考以下辅助方法确定用量



普通瓶盖（农夫山泉等品牌）
约 10 盖
(每盖约5毫升)



一次性纸杯（每杯约200毫升）
约 1/4 杯



本产品整瓶
约 1/4 瓶
(本瓶200毫升)

上述一桶药液可均匀喷施约半亩玉米；一亩需配两桶，共60斤水

剂量调整原则

刚见卵块或低龄幼虫很少时
约八钱
普通瓶盖约8盖

一般情况
1 两
普通瓶盖约10盖

虫较多但仍是低龄幼虫、上次效果不佳时
约一两一钱
普通瓶盖约11盖

施用提醒



使用前充分摇匀



重点喷玉米心叶



尽快用完，放置不要超过12小时

本产品特别注意

！ 用量限制

每 30 斤水最多一两二钱药液
(约60毫升)，不能超过！

一季最多使用
3次

再次使用至少间隔
7天

× 用法禁忌



幼虫大量钻入茎秆后，不要再自行加浓

- 收获前 14 天内不要使用。

× 混合使用禁忌



石硫合剂



波尔多液

不能与碱性药剂混用，例如石硫合剂、波尔多液。

违反以上要求可能造成防治失效、作物受损或人员中毒！

注意事项

- 配药和施药时穿长袖防护服、长裤和胶靴，佩戴防护手套、口罩和护目镜。
- 施药期间不得饮水、进食或吸烟；施药后及时清洗身体、防护用具和工作服。
- 药液、清洗液和废弃包装不得污染水域和土壤，禁止在水体中清洗施药器具。

中毒急救措施

使用中或使用后如感觉不适，应立即停止工作并携带本标签就医。皮肤接触用大量清水和肥皂冲洗；眼睛溅入用流动清水冲洗至少15分钟；吸入时转移到空气流通处；误食时立即漱口，不得自行引吐。无专用解毒剂，对症治疗。

登记和生产信息

实验虚构登记号：EXP-PD-C0823 产品标准号：LAB/FIC-C-2026 生产许可证号：EXP-XK-C0823
净含量：200毫升 生产日期及批号：见封口 质量保证期：2年
生产者：原野标签研究实验室（虚构机构） 电话：000-00000000（不可拨打）

- 未用完的制剂放回原包装密封保存，不得转装入饮料或食品容器。
- 使用过的包装妥善收集，不得重复使用、改作其他用途或随意丢弃。
- 儿童、孕妇及哺乳期妇女不得接触本品。

储存和运输方法

加锁存放于阴凉、干燥、通风、防雨处，远离火源和热源。置于儿童、无关人员及动物接触不到之处，不得与食品、饮料、粮食、种子和饲料混合储运。运输时防止日晒、雨淋、倾倒和包装破损。

穿防护服

佩戴口罩

戴护目镜

佩戴手套

施药后清洗

远离儿童

勿污染水体

实验用虚构农药标签 所有产品、成分、登记信息及使用数据均为虚构 禁止用于真实农业生产

杀 虫 剂