

|                     |   |            |            |
|---------------------|---|------------|------------|
| Nombre del paciente |   | Expediente |            |
| PAB                 | — | Cama       | —          |
| Sexo                | — | Fecha      | 2026-07-14 |
| Edad                | — | Médico     | —          |
| Diagnóstico         | — |            |            |


| Criterio                                                                | Respuesta | Puntos   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| <b>HISTORIA</b>                                                         |           |          |
| Edad > 70 años                                                          | NO        | 0        |
| Infarto de miocardio en los 6 meses previos                             | NO        | 0        |
| <b>EXPLORACIÓN</b>                                                      |           |          |
| Tercer tono ó presión venosa yugular elevada                            | NO        | 0        |
| Estenosis aórtica significativa                                         | NO        | 0        |
| <b>ELECTROCARDIOGRAMA</b>                                               |           |          |
| Ritmo no sinusal ó extrasistolia supraventricular en el último ECG      | NO        | 0        |
| Más de 5 extrasístoles ventriculares/min en cualquier ECG preoperatorio | NO        | 0        |
| <b>ESTADO GENERAL</b>                                                   |           |          |
| PO <sub>2</sub> < 60 ó PCO <sub>2</sub> > 55 mmHg                       | NO        | —        |
| K < 3 ó HCO <sub>3</sub> < 20 mEq/L                                     | NO        | —        |
| BUN > 50 ó Cr > 3 mg/dl                                                 | NO        | —        |
| GOT sérica anormal ó signos de hepatopatía crónica                      | NO        | —        |
| Hospitalizado por causa no cardiaca                                     | NO        | —        |
| Estado general alterado (cualquiera de los anteriores)                  | NO        | 0        |
| <b>INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA</b>                                          |           |          |
| Intraperitoneal, intratorácica ó aórtica                                | NO        | 0        |
| Urgente                                                                 | NO        | 0        |
| <b>TOTAL</b>                                                            |           | <b>0</b> |

|                     |                            |               |                       |
|---------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|
| Score               | 0                          | Clasificación | Clase I (Riesgo Bajo) |
| Mortalidad estimada | Mortalidad estimada: 0,20% |               |                       |


|                     |   |
|---------------------|---|
| Diagnóstico del ECG | — |
|---------------------|---|

ECG adjunto (PDF): ECG.pdf

ECG 1 / 1 100%



1



| Clase | Puntuación | Mortalidad |
|-------|------------|------------|
| I     | 0 – 5      | 0,20%      |
| II    | 6 – 12     | 1,50%      |
| III   | 13 – 25    | 2,30%      |
| IV    | > 25       | 56%        |

Adaptado de Goldman L, et al. N Engl J Med 1977;297:845.

---

Nombre y firma del médico