

## 微积分乙 2018-2019 学年第一学期期中考试试卷

## 一、填空题(24 分)

1. 极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! \cdot (4n)!}{(2n)! \cdot (3n)!} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 曲线  $\begin{cases} x = 3t^2 - 5t - 1 \\ y = \ln(t-1) + 3 \end{cases}$  在  $x=1$  处的切线方程  $\underline{\hspace{2cm}}.$

3. 若  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\tan 2x - xf(x)}{x^3} \right) = 0$ , 则  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{2-f(x)}{x^2} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 函数  $y = \frac{e^{\frac{1}{x-1}}}{1 - e^{\frac{1}{x-1}}}$  的间断点及其类型为  $\underline{\hspace{2cm}}.$

5. 设  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[ (x^5 + 7x^4 + 3)^a - x \right] = b \neq 0$ , 则常数  $a = \underline{\hspace{2cm}}$ ,  $b = \underline{\hspace{2cm}}.$

6. 设  $y = y(x)$  是由方程  $y = x + \arctan y$  确定的函数, 则  $\frac{d^2 y}{dx^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

## 二、求下列极限(10 分)

(1)  $\lim_{x \rightarrow 0} (e^{x^2} + \ln(1+x^2))^{\frac{1}{1-\cos x}};$


(2)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - (1+2x)^{\frac{1}{2x}}}{\sin x}$

三、(10 分) 设  $X_n = \sum_{i=1}^n \left( \sqrt{1 + \frac{i}{n^2}} - 1 \right)$ , 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} X_n$

四、(10 分) 设  $a_1 = 2, a_2 = 2 + \frac{1}{a_1}, \dots, a_n = 2 + \frac{1}{a_{n-1}}, \dots$ , 求证:  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  存在, 并求其值。

五、(12 分) 设  $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x}}$ , 求  $f^{(n)}(x)$ .

六、(12 分) 宽为 2 米的走廊与另一走廊垂直相交, 要使长为 16 米的细杆能水平的移动通过走廊拐角, 问另一走廊宽度  $b$  至少是几米?



七、(12 分) 设  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上可微, 且  $f''(0)$  存在,  $f(0) = 0$ ,

(1) 函数  $g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0 \\ f'(0), & x = 0 \end{cases}$ , 在  $x=0$  处是否连续? 是否可导? 并说明理由;

(2) 求出  $g(x)$  的导函数表达式。

八、(10 分) 设  $f_n(x) = 1 - (1 - \cos x)^n, n = 1, 2, 3, \dots$ , 求证:

(1) 对任意正整数  $n$ , 方程  $f_n(x) = \frac{1}{2}$  在  $(0, \frac{\pi}{2})$  中仅有一根,

(2) 若有  $x_n \in (0, \frac{\pi}{2})$ , 满足  $f_n(x_n) = \frac{1}{2}$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\pi}{2}$ .

## 2018-2019 学年第一学期期中考试试卷参考答案

## 一、填空题(24 分)

1、【正解】  $+\infty$ 

【解析】  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! \cdot (4n)!}{(2n)! \cdot (3n)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(4n)!}{(3n)!} \cdot \frac{n!}{(2n)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(4n) \cdots (3n+1)}{(2n) \cdots (n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4 \cdots (3 + \frac{1}{n})}{2 \cdots (1 + \frac{1}{n})}$

$= +\infty.$

【考点延伸】专题一 函数、极限、连续性 第二部分 极限 2.3、极限的计算

2、【正解】  $y = \frac{1}{7}x + \frac{20}{7}$ 

【解析】容易得到  $\begin{cases} x'(t) = 6t - 5 \\ y'(t) = \frac{1}{t-1} \end{cases}$ ,  $x=1$  时, 得到  $t_1=2$ ,  $t_2=-\frac{1}{3}$ , 由于  $y=\ln(t-1)+3$  中要求

$t>1$ , 则  $t=2$ , 则  $y=3$ , 故  $\frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{1}{7}$ , 因此切线方程  $y-3 = \frac{1}{7}(x-1) \Rightarrow y = \frac{1}{7}x + \frac{20}{7}$ .

【考点延伸】专题二 导数、微分 第三部分 求导类型 3.3、参数方程求导

3、【正解】  $-\frac{8}{3}$ 【解析】当  $x \rightarrow 0$  时, 有  $\tan 2x \sim 2x + \frac{8}{3}x^3 + o(8x^3)$ , 则

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x - xf(x)}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x + \frac{8}{3}x^3 + o(8x^3) - xf(x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - f(x)}{x^2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{8}{3}x^3 + o(8x^3)}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - f(x)}{x^2} + \frac{8}{3} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - f(x)}{x^2} = -\frac{8}{3}. \end{aligned}$$

【考点延伸】专题一 函数、极限、连续性 第二部分 极限 2.3、极限的计算

4、【正解】  $x=0$  为无穷间断点,  $x=1$  为跳跃间断点

【解析】间断点:  $x=1$ ,  $x=0$ , 由于  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{1}{x-1}}}{1 - e^{\frac{x}{x-1}}} = \infty$ , 因此  $x=0$  为无穷间断点; 有  $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{e^{\frac{1}{x-1}}}{1 - e^{\frac{x}{x-1}}} =$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{1}{t}}}{1 - e^{\frac{t+1}{t}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{1 - e^{1+x}} = -\frac{1}{e}, \quad \lim_{x \rightarrow \Gamma} \frac{e^{\frac{1}{x-1}}}{1 - e^{\frac{x}{x-1}}} = \lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{e^{\frac{1}{t}}}{1 - e^{\frac{t+1}{t}}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{1 - e^{1+x}} = 0, \text{ 因此}$$

 $x=1$  为跳跃间断点。

【考点延伸】专题一 函数、极限、连续性 【重要题型】题型 4: 判断函数连续性和间断点

5、【正解】  $\frac{1}{5}; \frac{7}{5}$

【解析】  $\lim_{x \rightarrow \infty} [(x^5 + 7x^4 + 3)^a - x] = \lim_{x \rightarrow 0} \left[ \left( \frac{1}{x^5} + \frac{7}{x^4} + 3 \right)^a - \frac{1}{x} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(3x^5 + 7x + 1)^a - x^{5a-1}}{x^{5a}}$

该极限存在, 则  $\lim_{x \rightarrow 0} [(3x^5 + 7x + 1)^a - x^{5a-1}] = 0 \Rightarrow a = \frac{1}{5}$ , 带入得  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{5}(3x^5 + 7x)}{x} = \frac{7}{5} = b$ .

【考点延伸】专题一 函数、极限、连续性 【重要题型】题型 5: 求极限表达式中的未知参数

6、【正解】  $-\frac{2(y^2+1)}{y^5}$

【解析】对等式两端关于  $x$  求导:  $\frac{dy}{dx} = 1 + \frac{1}{1+y^2} \cdot \frac{dy}{dx} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = 1 + \frac{1}{y^2}$ , 再求导得到:  $\frac{d}{dx} \left( \frac{dy}{dx} \right) =$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = -\frac{2}{y^3} \cdot \frac{dy}{dx} = -\frac{2}{y^3} \cdot \frac{y^2+1}{y^2} = -\frac{2(y^2+1)}{y^5}.$$

【考点延伸】专题二 导数、微分 第三部分 求导类型 3.5、求高阶导数

## 二、求下列极限(10 分)

【解析】1、 $\lim_{x \rightarrow 0} (e^{x^2} + \ln(1+x^2))^{\frac{1}{1-\cos x}} = \exp \left\{ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^{x^2} + \ln(1+x^2))}{1-\cos x} \right\}, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^{x^2} + \ln(1+x^2))}{1-\cos x}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^{x^2} + \ln(1+x^2))}{\frac{x^2}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + \ln\left(1 + \frac{\ln(1+x^2)}{e^{x^2}}\right)}{\frac{x^2}{2}} = 2 + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\ln(1+x^2)}{x^2 e^{x^2}} = 2 + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2}{x^2 e^{x^2}}$$

$$= 4, \text{ 因此 } \lim_{x \rightarrow 0} (e^{x^2} + \ln(1+x^2))^{\frac{1}{1-\cos x}} = e^4.$$

$$2、\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - (1+2x)^{\frac{1}{2x}}}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} (1+2x)^{\frac{1}{2x}} \cdot \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - (1+2x)^{\frac{1}{2x}}}{x} = e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{2\ln(1+x) - \ln(1+2x)}{2x}} - 1}{x}$$

$$= e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\ln(1+x) - \ln(1+2x)}{2x^2}, \text{ 当 } x \rightarrow 0 \text{ 时, } \ln(1+x) \sim x - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2),$$

$\ln(1+2x) \sim 2x - 2x^2 + o(4x^2)$ , 因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\ln(1+x) - \ln(1+2x)}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2x - x^2 + o(x^2)) - (2x - 2x^2 + o(4x^2))}{2x^2} = \frac{1}{2}$$

$$\text{因此 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{1}{x}} - (1+2x)^{\frac{1}{2x}}}{\sin x} = \frac{e}{2}.$$

【考点延伸】专题一 函数、极限、连续性 第二部分 极限 2.3、极限的计算

三、【解析】利用拉格朗日中值定理  $\sqrt{1+\frac{i}{n^2}}-1=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{1+\theta\frac{i}{n^2}}}\cdot\frac{i}{n^2}$ ,  $\theta\in(0,1)$ , 可以得到

$$1\leq\sqrt{1+\theta\frac{i}{n^2}}\leq\sqrt{1+\frac{1}{n}}, \text{ 因此 } \sum_{i=1}^n\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}}\cdot\frac{i}{n^2}\leq\sum_{i=1}^n\sqrt{1+\frac{i}{n^2}}-1\leq\sum_{i=1}^n\frac{1}{2}\cdot\frac{i}{n^2}, \text{ 由于}$$

$$\lim_{n\rightarrow\infty}\sum_{i=1}^n\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}}\cdot\frac{i}{n^2}=\lim_{n\rightarrow\infty}\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}}\int_0^1xdx=\frac{1}{4}, \quad \lim_{n\rightarrow\infty}\sum_{i=1}^n\frac{1}{2}\cdot\frac{i}{n^2}=\lim_{n\rightarrow\infty}\frac{1}{2}\int_0^1xdx$$

$$=\frac{1}{4}, \text{ 由夹逼准则可以得到 } \lim_{n\rightarrow\infty}X_n=\frac{1}{4}.$$

【考点延伸】专题三 导数的应用、中值定理 第三部分 中值定理 3.2、拉格朗日中值定理  
专题一 函数、极限、连续性 第二部分 极限 2.3、极限的计算

四、【解析】容易得到  $a_n>2$ , 有  $|a_{n+1}-a_n|=\left|2+\frac{1}{a_n}-2-\frac{1}{a_{n-1}}\right|=\frac{|a_n-a_{n-1}|}{a_na_{n-1}}<\frac{|a_n-a_{n-1}|}{4}$ , 说

明  $\{a_n\}$  是压缩数列, 因此  $\lim_{n\rightarrow\infty}a_n$  存在, 设  $\lim_{n\rightarrow\infty}a_n=A$ , 则由  $a_n=2+\frac{1}{a_{n-1}}$  得到  $A=2+\frac{1}{A}$ , 求解得到  $A=1\pm\sqrt{2}$ , 而  $a_n>2$ , 则  $A=1+\sqrt{2}$ , 因此  $\lim_{n\rightarrow\infty}a_n=1+\sqrt{2}$ .

【考点延伸】专题一 函数、极限、连续性 【重要题型】题型 3: 证明数列极限存在

五、【解析】令  $u(x)=\frac{1}{\sqrt{1+x}}$ ,  $v(x)=x$ , 有  $\left(\frac{1}{\sqrt{1+x}}\right)^{(k)}=(-1)^k\frac{(2k-1)!!}{2^k}\frac{1}{(1+x)^{\frac{2k+1}{2}}}$ , 利用莱

$$\text{布尼茨公式可以得到 } f^{(n)}(x)=\sum_{k=0}^nC_n^ku^{(n-k)}v^{(k)}=u^{(n)}v+C_n^1u^{(n-1)}v' =$$

$$(-1)^n\frac{(2n-1)!!}{2^n}\frac{x}{(1+x)^{\frac{2n+1}{2}}}+(-1)^{n-1}\frac{n(2n-3)!!}{2^{n-1}}\frac{1}{(1+x)^{\frac{2n-1}{2}}}.$$

【考点延伸】专题二 导数、微分 【重要题型】题型 3: 求高阶导数

六、【解析】设细杆与另一端走廊的夹角为  $\theta$  ( $0<\theta<2\pi$ ), 则  $AB=\frac{2}{\cos\theta}$ ,


$$BC=16-\frac{2}{\cos\theta}, \text{ 依题意 } b(\theta)=BC\sin\theta=16\sin\theta-2\tan\theta \text{ 要最小, 有}$$

$$b'(\theta)=16\cos\theta-2\sec^2\theta=0 \text{ 求解得到 } \cos^3\theta=\frac{1}{8}\Rightarrow\cos\theta=\frac{1}{2}\Rightarrow\theta=\frac{\pi}{3},$$

因为  $b(\theta)$  只有一个极值, 则必定为极小值, 因此另一侧的走廊宽度至少

$$\text{为 } b_{\min}=6\sqrt{3}.$$

【考点延伸】专题三 导数的应用、中值定理 第一部分 极值、最值和凹凸性 1.2、最值



七、【解析】1、连续性： $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = f'(0) = g(0)$ ，因此  $g(x)$  在  $x=0$  处连续

$$\begin{aligned} \text{续：是否可导：} g'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x)}{x} - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - xf'(0)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{2} = \frac{f''(0)}{2} \text{ 存在，因此 } g(x) \text{ 在 } x=0 \text{ 处可导。} \end{aligned}$$

2、当  $x \neq 0$  时， $g'(x) = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}$ ，由第 1 小问知当  $x=0$  时， $g'(0) = \frac{f''(0)}{2}$ ，由于

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf''(x)}{2x} = \frac{f''(0)}{2}，\text{ 则 } g'(x) \text{ 在点 } x=0 \text{ 是连续的，因此}$$

$$g'(x) = \begin{cases} \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}, & x \neq 0 \\ \frac{f''(0)}{2}, & x = 0 \end{cases}.$$

【考点延伸】专题一 函数、极限、连续性 【重要题型】 题型 4：判断函数连续性和间断点

专题二 导数、微分 第一部分 基本概念 1.1、可导性

八、【解析】1、令  $g_n(x) = f_n(x) - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - (1 - \cos x)^n$ ，有  $g_n(0) = \frac{1}{2} - (1 - \cos 0)^n = \frac{1}{2} > 0$ ，

$$g_n\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2} - \left(1 - \cos \frac{\pi}{2}\right)^n = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2} < 0，\text{ 由零点存在定理可知，} g_n(x) \text{ 在 } \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \text{ 上至少}$$

有一个根，下面证明唯一性：有  $g'_n(x) = -n(1 - \cos x)^{n-1} \sin x < 0$  对  $\forall x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$  均成立，因此

$g_n(x)$  在  $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$  上严格单调减少，因此  $g_n(x)$  在  $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$  上有且仅有一个根。

2、有  $f_n(x_n) = \frac{1}{2} \Rightarrow (1 - \cos x_n)^n = \frac{1}{2} \Rightarrow x_n = \arccos\left(1 - \frac{1}{\sqrt[n]{2}}\right)$ ，有  $x_n \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ ，则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \arccos\left(1 - \frac{1}{\sqrt[n]{2}}\right) = \arccos 0 = \frac{\pi}{2}.$$

【考点延伸】专题一 函数、极限、连续性 第二部分 极限 2.3、极限的计算