

线性方程组

- 高斯消元法
- 系数矩阵&增广矩阵
- 解的存在性与唯一性

矩阵代数

- 矩阵的代数运算
- 矩阵的初等变换
- A 可逆
 - $\Leftrightarrow \exists$ 初等阵 P_1, P_2, L, P_k , 使得 $P_kLP_2P_1A = E$
 - $\Leftrightarrow AX = 0$ 只有0解
 - $\Leftrightarrow |A| \neq 0$
- 对称矩阵: $A^T = A$
- 反对称矩阵: $A^T = -A$
- 对角形矩阵
- 正交矩阵: $A^T = A^{-1}$

行列式

- 行列式的性质
- $\begin{vmatrix} A & B \\ 0 & C \end{vmatrix} = |A||C|$ $\begin{vmatrix} A & 0 \\ B & C \end{vmatrix} = |A||C|$ $\begin{vmatrix} 0 & A \\ C & B \end{vmatrix} = (-1)^{mn}|A||C|$ $\begin{vmatrix} B & A \\ C & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{mn}|A||B|$
 A 是 m 阶矩阵, C 是 n 阶矩阵
- 范德蒙德行列式:
$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \dots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{n \geq i > j \geq 1} (x_i - x_j)$$
- 伴随矩阵: A^* , 将每个元 a_{ij} 替换成其代数余子式 A_{ij}
$$AA^* = A^*A = |A|E$$
$$A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^*$$
$$|A^*| = |A|^{n-1}$$
- 克莱姆(Grammer)法则

$$n \text{元线性方程组} \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots\dots\dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

当 $|A| \neq 0$, 存在唯一解:

$$x_j = \frac{1}{|A|} \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1(j-1)} & b_1 & a_{1(j+1)} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2(j-1)} & b_2 & a_{2(j+1)} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n(j-1)} & b_n & a_{n(j+1)} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \frac{D_j}{|A|}$$

D_j 表示 A 的第 j 列换成常数列后的行列式

向量空间

向量的线性相关性

- 线性方程组 $BX = 0$ 与 $ABX = 0$ 解的关系
 - $BX = 0$ 的解一定是 $ABX = 0$ 的解
 - B 的列向量线性相关, 则 AB 的列向量也线性相关
 - AB 的列向量线性无关, 则 B 的列向量也线性无关
 - 若 A 的列向量线性无关, 则 $BX = 0$ 与 $ABX = 0$ 同解, 此时 AB 列向量线性相关(无关)当且仅当 B 的列向量线性相关(无关)。
- 向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, L, \alpha_p\}$ ($p \geq 2$) (I) 线性相关 $\Leftrightarrow (I)$ 中至少有一个向量可以由其余 $p - 1$ 个向量线性表出
- 向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, L, \alpha_p\}$ (I) 线性无关, $\{\alpha_1, \alpha_2, L, \alpha_p, \beta\}$ (II) 线性相关, 则 β 可由 (I) 线性表出, 且唯一线性表出。
- 向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, L, \alpha_p\}$ (I) 的一个部分组线性相关, 则 (I) 线性相关。
- 向量组 $a_j = (a_{1j}, a_{2j}, a_{3j})^T$ ($j = 1, 2, 3$) (I) 线性无关, 分别在 a_j 的后面添加一个分量得 $\beta_j = (a_{1j}, a_{2j}, a_{3j}, a_{4j})$ ($j = 1, 2, 3$), 则 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ (II) 线性无关。
- n 个 n 维列向量 $\alpha_1, \alpha_2, L, \alpha_n$ 线性相关 $\Leftrightarrow n$ 阶行列式 $\det(\alpha_1, \alpha_2, L, \alpha_n) = 0$
- 如果向量组所含向量个数比向量的分量数目更多, 则向量组必然线性相关。

向量组的极大无关线性组和秩

- 若向量组 A 和向量组 B 可以互相线性表出, 称向量组 A 与向量组 B 等价
- 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, L, \alpha_p$ 可由 $\beta_1, \beta_2, L, \beta_t$ 线性表出, 且 $p > t$, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, L, \alpha_p$ 必线性相关。
若线性无关向量组 $\alpha_1, \alpha_2, L, \alpha_p$ 可由 $\beta_1, \beta_2, L, \beta_t$ 线性表出, 则 $p \leq t$ 。
- 两个等价的线性无关向量组, 必包含相同个数的向量
- 极大无关组的一些性质:
 - 任意一个极大无关组都与向量组本身等价

- 一个向量组的任意两个极大无关组等价，且所含向量个数相等。

子空间

- 列空间 $Col A$ 是 A 的列向量的所有可能的线性组合构成的集合
- 行空间 $Row A$ 是 A 的行向量的所有可能的线性组合构成的集合
- 零空间 $Nul A$ 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的所有解向量构成的集合
- 解空间是 m 个方程 n 个未知量的齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解集构成的集合

基和维数

- 基和维数

对于矩阵 $A = \begin{bmatrix} -3 & 6 & -1 & 1 & -7 \\ 1 & -2 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 5 & 8 & -4 \end{bmatrix}$

$$A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

取 x_2, x_4, x_5 为自由变量，则解为：

$$x_1 = 2x_2 + x_4 - 3x_5, \quad x_3 = -2x_4 + 2x_5$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = x_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_5 \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = x_2 \alpha + x_4 \beta + x_5 \gamma$$

因此，

$\{\alpha, \beta, \gamma\}$ 是 $Nul A$ 的一组基，有 3 个向量，则维数 $\dim Nul A = 3$

$\{\alpha_2, \alpha_4, \alpha_5\}$ 是 $Col A$ 的一组基，有 3 个向量，则维数 $\dim Col A = 3$

- 过渡矩阵

设 $\epsilon_1, \epsilon_2, L, \epsilon_n$ (I) 与 $\eta_1, \eta_2, L, \eta_n$ (II) 是 n 维列向量空间 R^n 的两组基，则基 (II) 可由基 (I) 线性表出，即

$$(\eta_1, \eta_2, L, \eta_n) = (\epsilon_1, \epsilon_2, L, \epsilon_n) \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & L & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & L & a_{2n} \\ M & M & & M \\ a_{n1} & a_{n2} & L & a_{nn} \end{bmatrix}$$

则称 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是基 (I) 到基 (II) 的过渡矩阵，其中的第 j 列是 η_j 在基 (I) 下的坐标

- $rank A + \dim Nul A = n$

矩阵的秩

- $r(A) = r(A^T)$
- $r(A \pm B) \leq r(A) + r(B)$
- $A_{s \times n}, B_{s \times m}, r[A, B] \leq r(A) + r(B)$
- $A_{s \times n}, B_{s \times n}, A \text{与} B \text{等价} \Leftrightarrow r_A = r_B$
- $r(A) = n \Leftrightarrow |A| \neq 0$
- $r_{AB} \leq \min\{r_A, r_B\}$

特征值与特征向量

矩阵的特征值与特征向量

- 特征值与特征向量的定义
- 特征值的性质：
 - $\sum_{i=1}^n \lambda_i = \sum_{i=1}^n a_{ii}$
 - $\prod_{i=1}^n \lambda_i = |A|$
 - 若 λ 是 A 的特征值, 则 $f(\lambda)$ 是 $f(A)$ 的特征值
若 α 是 A 的对应特征值 λ 的特征向量, 则 α 也是 $f(A)$ 的对应特征值 $f(\lambda)$ 的特征向量
 - 方阵对应于不同特征值的特征向量线性无关

矩阵的相似及对角化

- 相似的定义: $\exists P, P^{-1}AP = B$, 则 A 与 B 相似, 记为 $A \sim B$
- 相似的性质:
 - $|A| = |B|$
 - $\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$
 - $|\lambda E - A| = |\lambda E - B|$
 - $\text{tr}A = \text{tr}B$
 - $A^m \sim B^m, m \in N$, 若 A 可逆, 则 $m \in Z$
 - $A^T \sim B^T$
 - $kA \sim kB$
 - $h(A) \sim h(B), h(x)$ 为任意多项式
- 可对角化的条件

实对称矩阵的对角化

- 存在正交矩阵 $Q(Q^T = Q^{-1})$, 使得 $Q^{-1}AQ$ 为对角形矩阵 (称为 A 正交相似于对角形矩阵)
- 施密特正交化:

设 $\Sigma_1: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t$ 是 R^n 中的线性无关组, 令

$$\beta_1 = \alpha_1,$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - (\beta_1, \beta_1)^{-1}(\alpha_2, \beta_1)\beta_1$$

.....

$$\beta_t = \alpha_t - \sum_{i=1}^{t-1} (\beta_i, \beta_i)^{-1}(\alpha_t, \beta_i)\beta_i$$

则 $\Sigma_2: \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 为一正交组, 将其单位化得 $\Sigma_3: \gamma_1 = \frac{1}{|\beta_1|}\beta_1, \gamma_2 = \frac{1}{|\beta_2|}\beta_2, \dots, \gamma_t = \frac{1}{|\beta_t|}\beta_t$

则 Σ_3 为一规范正交组, 且对 $\forall k = 1, 2, \dots, t$, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 与 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_k$ 等价

二次型

- 二次型的基本形式:
 - 标准型: 只有平方项
 - 规范型: 系数为1,-1,0的标准型
- 化为标准型的方法:
 - 配方法
 - 正交变换法
- 分类: 正定、负定、半正定、半负定、不定