


LE NERF FACIAL

Pr Yabka | Laboratoire d'anatomie générale Alger (LACA)

Plan du Cours :


1. Introduction
2. Anatomie descriptive
 - Origine
 - Trajet
 - Rapports
 - Branches collatérales
 - Branches terminales
3. Anatomie clinique



INTRODUCTION : La VIIe Paire des Nerfs Crâniens

Le nerf facial est formé par deux composantes :

- Le VII moteur
- Le VII sensitif ou nerf intermédiaire



Pathologie associée : Son atteinte entraîne la paralysie faciale.


ORIGINE DU NERF FACIAL

1. Origine Réelle (Noyaux dans le tronc cérébral) :

1. Noyau moteur du VII (muscles peauciers)
2. Noyau du faisceau solitaire (VII bis, Goût) [Ref: Q11, Q17]
3. Noyau salivaire supérieur
4. Noyau muco-lacrymo-nasal

2. Origine Apparente :


- Il naît de la partie latérale du sillon ponto-bulbaire. [Ref: Q11, Q13, Q17]
- Le nerf intermédiaire, plus grêle, est situé plus en dehors entre le VII moteur et le nerf cochléo-vestibulaire (VIII).



TRAJET : Les 03 Portions Anatomiques

Le nerf facial traverse successivement 03 portions [Ref: Q13] :

1. **Portion Intra-crânienne** : L'étage postérieur du crâne, au niveau de l'**angle ponto-cérébelleux**.
2. **Portion Intra-pétreuse** : Il passe par le **méat acoustique interne** pour pénétrer dans le rocher, puis traverse le **canal facial** (ou **aqueduc de Fallope**) qui est un canal osseux intra-pétreux. [Predicted - Séquence d'entrée]
3. **Portion Extra-pétreuse** : Par le **foramen stylo-mastoïdien** par lequel il sort du rocher.




RAPPORTS (1/3) : Fosse Crânienne & Méat Acoustique Interne

1. Dans la fosse crânienne postérieure :

- Le nerf VII est solidaire du nerf VIII.
- Il est surcroisé par l'artère cérébelleuse supérieure, puis il surcroise le sinus pétreux inférieur. [Predicted - Piège vasculaire]

2. Dans le méat acoustique interne :

- Le VII repose sur le nerf vestibulo-cochléaire (VIII). [Ref: Q13]
- Il est accompagné par l'artère labyrinthique.



RAPPORTS (2/3) : Le Canal Facial (Intra-pétreux)


Il est intra-pétreux et présente trois portions et 02 coudes [Ref: Q12].

1. La portion labyrinthique :

- Horizontale et longue de 4 mm. [Predicted]
- Passe entre la cochlée et le vestibule de l'oreille interne. [Ref: Q13, Q17]
- Se coude en arrière (genou du facial) où se trouve le ganglion géniculé.
- Donne 03 branches : n. grand pétreux, n. petit pétreux, n. pétreux externe.

2. La portion tympanique :

- Longue de 10 mm. [Predicted]
- Fait saillie sur la paroi médiale de la caisse du tympan. [Ref: Q12]
- Passe **sous** le canal semi-circulaire latéral.




RAPPORTS (3/3) : Portion Mastoïdienne & Foramen

3. La portion mastoïdienne (Dans le canal facial) :

- Verticale, longue de 18 mm. [Predicted - Suite (4, 10, 18)]
- Est accompagné par l'artère stylo-mastoïdienne.
- Se termine dans le foramen stylo-mastoïdien.

4. Dans le foramen stylo-mastoïdien :

- Le nerf sort du rocher par le foramen stylo-mastoïdien et devient extra-pétreux. [Ref: Q12]
- Il passe entre les muscles : digastrique et stylo-hyoïdien puis pénètre la glande parotide.



TERMINAISON : Glande Parotide & Branches Terminales

1. Trajet intra-parotidien (2 Branches) :


Il pénètre dans la parotide et se termine en donnant 02 branches terminales :

- Supérieure temporo-faciale
- Inférieure cervico-faciale

2. Divisions à la sortie de la parotide (5 Branches) :

À la sortie de la parotide, le nerf se divise en 05 branches collatérales terminales pour le visage :

- Temporale
- Zygomatique
- Buccale
- Mandibulaire
- Cervicale




BRANCHES COLLATÉRALES

Le nerf facial donne de multiples branches au cours de son trajet [Ref: Q10, Q11, Q12, Q14] :

Branches Intra-pétreuses

- Le nerf grand pétreux. [Ref: Q10, Q11, Q12, Q14]
- Le rameau communicant avec le nerf petit pétreux.
- Le nerf stapédien (muscle de l'étrier). [Ref: Q10, Q14]
- La corde du tympan. [Ref: Q10, Q12, Q14]
- Le rameau auriculaire (sensitif du MAE).



Branches Extra-pétreuses

- Les nerfs du digastrique et du stylo-hyoïdien. [Ref: Q10, Q11, Q12]
- Le nerf auriculaire postérieur. [Ref: Q10, Q12]
- Les rameaux communicants avec le IX et le X.

TERRITOIRES D'INNERVATION (SYNTHÈSE)


Moteur (VII)

- Les muscles peauciers de la face (nerf de la mimique).
[Ref: Q9, Q13, Q17]
- Le muscle stylo-hyoïdien, ventre postérieur du digastrique et muscle de l'étrier.




Sensitif et Sensoriel (VII bis)

- Sensitif : MAE, face externe du tympan, conque du pavillon : zone de Ramsey Hunt.
[Predicted]
- Sensoriel : innervation gustative des 2/3 antérieurs de la langue.
[Ref: Q13, Q17]



Végétatif

- Sécrétions muco-nasales, lacrymale et salivaire.
[Ref: Q9, Q13, Q17]



CLINIQUE : Paralysie Faciale (Périphérique vs Centrale)

Caractéristiques	Paralysie Faciale Périphérique	Paralysie Faciale Centrale
Lésion	Lésion nucléaire et infra-nucléaire.	Lésion supra-nucléaire.
Fréquence	La plus fréquente.	Moins fréquente.
Étendue	Totale : toute l'hémiface homolatérale est paralysée.	Quadrant supérieur épargné (froncement front/fermeture yeux possibles).
Signe de Charles Bell	PRÉSENT : Occlusion des yeux accompagnée d'élévation de l'œil/paupière (action synergique releveur + droit sup, innervés par III). [Predicted]	ABSENT.

Périphérique



Signe de Charles Bell



Centrale

EXAM PATTERN ANALYSIS : Stratégie de Révision

Analyse algorithmique des QCM :


Top 1 : La Composition Mixte (100%). Tests systématiques sur moteur (peauciers, JAMAIS masticateurs) vs végétatif (glandes) vs sensoriel (2/3 ant. langue via corde du tympan).

Top 2 : Les Branches Collatérales. La corde du tympan et le nerf grand pétreux dominant l'intra-pétreux. Le digastrique est le piège majeur en extra-pétreux.

Top 3 : Topographie intra-pétreuse. Emplacements exacts : tympanique (paroi médiale caisse du tympan) et labyrinthique (entre cochlée et vestibule).

Zone de Risque Futur : Mesures exactes (4mm, 10mm, 18mm), le mécanisme intime synergique du Signe de Charles Bell (VII paralysé / III intact), et la Zone de Ramsey Hunt.

Hexagonal Radar Chart of Exam Probability



CARTE MENTALE DU NERF FACIAL (VII)

[Schéma de Synthèse Absolue à Mémoriser]

