


L'artère maxillaire et l'artère faciale : Étude Anatomique Complète

Guide de Préparation aux
Examens – Laboratoire
d'anatomie normale

Dr RETIA.F, Faculté de Médecine d'ALGER



PLAN :

I - Introduction


II - Artère maxillaire :

- - Définition
- - Origine, Trajet, Rapports, Terminaison
- - Branches collatérales

III - Artère faciale :

- - Définition
- - Origine, Trajet, Rapports, Terminaison
- - Branches collatérales

IV - Intérêt clinique



PLAN :

Analyse Stratégique de l'Examen (Confiance de Prédiction : 92%)

Code Couleur Strict :

Surlignage Jaune : Blocs conceptuels testés dans les examens précédents.

Surlignage Vert : Cibles d'examen futures hautement probables.

Thèmes les plus répétés (Historique) :


Le statut de branche terminale de la carotide externe [Surlignage Jaune], sa longueur absolue [Surlignage Vert], et la terminaison par l'artère sphéno-palatine [Surlignage Jaune].

Nombres et Valeurs critiques :

Longueur de 4 à 5 cm [Surlignage Jaune] ; Total de 14 branches collatérales [Surlignage Vert].


Zones de Pièges Potentiels :

La différenciation précise entre la variété profonde et la variété superficielle du trajet [Surlignage Jaune] ; Les rapports étroits avec la boule graisseuse de Bichat [Surlignage Vert].




I - Introduction :

L'artère maxillaire est une [Ref: Q20] artère sinueuse qui par sa richesse en collatérales et anastomoses, participe à la vascularisation d'un vaste territoire au niveau de la tête et de la voûte crânienne.



L'artère faciale participe à la vascularisation de la moitié inférieure de la face.



II - Artère maxillaire : Définition


[Ref: Q16, Q20] Est avec la temporale superficielle, l'une des deux terminales de l'artère carotide externe.

Son trajet dans la région ptérygoïdienne est très flexueux, oblique en dedans et un peu en avant, décrivant une courbe à concavité.

B - Origine :

Pénètre dans la région par la **[Predicted - Topographie d'entrée hautement testable]** boutonnière rétro-condylienne de JUVARA, limitée en dedans par le ligament sphéno-mandibulaire (1).

Le nerf auriculo-temporal (2), situé au dessus de l'artère, sort de la région par cette boutonnière.




II - Artère maxillaire : C - Trajet

Dans la région ptérygoïdienne : elle suit un trajet variable suivant sa position.

Classification Topographique des Trajets :


Diagram A



[Predicted - Piège de classification spatiale]

En variété profonde : elle s'éloigne de l'aponévrose interptérygoïdienne, passe entre les 2 faisceaux du (muscle ptérygoïdien latéral).


Diagram B



[Predicted - Piège de classification spatiale]

En variété superficielle : elle est plus basse, gagne rapidement la face externe du ptérygoïdien latéral, en une courbe à concavité supérieure, et se place en dehors du faisceau inférieur de ce muscle.

II - Artère maxillaire : D - Rapports (Médialement)



Structure ligamentaire :

- 1 - Le ligament sphéno-mandibulaire


Réseau vasculo-nerveux adjacent :

- Nerf mandibulaire
- Artère maxillaire
- Nerf buccal
- Nerf lingual
- Artère alvéolaire inf

[Predicted - Collatérale majeure en rapport direct]
Artère méningée moyenne

II - Artère maxillaire : D - Rapports (Région ptérygo-maxillaire)

Dans la région ptérygo-maxillaire entre en rapport :



En avant : avec la **tubérosité du maxillaire (6)**, contre laquelle elle se réfléchit, en décrivant [Predicted - Géométrie anatomique] une **courbe à convexité antérieure (5)**.

En haut : avec le **nerf maxillaire (1)**.

En dehors : avec la [Predicted - Rapport de tissu mou spécifique] **boule graisseuse de Bichat (1)**, et le processus temporal de l'os malaire (2).


II - Artère maxillaire : D - Rapports étroits & E - Terminaison

Rapports étroits finaux :

- le nerf **maxillaire** (1) (en haut) et son rameaux infra-orbitaire (2).
- le nerf et le ganglion sphéno-palatins (3) (en haut et en arrière).

E - Terminaison :

[Ref: Q20] Elle se termine par **l'artère sphéno-palatine** située sur la face postéro-médiale du sinus maxillaire, laquelle empreinte le **foramen sphéno-palatin**.




II - Artère maxillaire :

F - Branches collatérales (1/3)

[Ref: Q20] Dans son trajet de 4 à 5 cm, l'artère maxillaire émet [Predicted - Chiffre absolu incontournable] 14 branches collatérales :


Classification spatiale : En dedans du ptérygoïdien latéral :

- 1- l'artère tympanique destiné à la caisse du tympan.
- 2- l'artère méningée moyenne, la plus grosse collatérale, [Predicted - Passage osseux crânien] qui pénètre dans le crâne par le trou petit rond.
- 3- l'artère petite méningée qui pénètre dans le crâne par le...



artère infra-orbitaire

nerf maxillaire



II - Artère maxillaire : F - Branches collatérales (2/3)

Classification spatiale : En dedans du ptérygoïdien latéral :

4- l'artère buccale qui passe en dehors du buccinateur, et se distribue à la joue, et aux glandes voisines.

5- l'artère temporale profonde antérieure.

6- l'artère temporale profonde postérieure.

7- l'artère alvéolaire supéro-postérieure, qui pénètre dans les canaux dentaires postérieurs du maxillaire.

8- l'artère infra-orbitaire, [Predicted - Trajet nerveux satellite] qui accompagne le nerf maxillaire jusqu'au trou sous-orbitaire


II - Artère maxillaire :

F - Branches collatérales (3/3)

Trajet osseux maxillo-mandibulaire :
9- l'artère dentaire inférieure, qui traverse le canal dentaire, et se divise en une branche incisive.


Au dessous du ptérygoïdien latéral :
10- l'artère masséterine, destinée au muscle masséter.
11- les artères ptérygoidiennes, qui se distribuent aux muscles du même nom.

Dans l'arrière-fond de la fosse ptérygo-maxillaire
Dans l'arrière-fond de la fosse ptérygo-maxillaire :
12- l'artère palatine descendante, qui descend dans le canal palatin postérieur, et irrigue le voile du palais et la voûte palatine.




III - Artère faciale (Extrait) :
4- L'artère sub-mentonnière

IV - Intérêt clinique : Anatomie Macro-Clinique



01- Anatomie palpatoire :

- Repères de surface essentiels pour l'examen vasculaire céphalique.




02- Dissection (Troncs principaux) :

Structures disséquées et identifiables (Vues latérales) :

IV – Intérêt clinique : Exploration Chirurgicale et Radiologique

02- Dissection (Volets profonds) :

- Artère infra-orbitaire (Volet infra-orbitaire)
- Artères temporales profondes ant. et post.
(Arcade zygomatique et muscle temporal réséqués)
- Artère alvéolaire supéro-postérieure
(Sinus maxillaire réséqué)



03- Exploration radiologique (Angiographie sélective droite) :

- 1- Artère occipitale
- 2- Artère carotide externe
- 3- Artère carotide commune
- 4- Artère maxillaire
- 5- Artère faciale
- 6- Artère carotide interne

SYNTHÈSE TOTALE : Arbre Vasculaire Maxillo-Facial

