


VEINES DE LA TÊTE ET DU COU : Guide d'Étude Anatomique Exhaustif

Table des Matières :

1. Introduction et Vue d'Ensemble du Drainage Veineux
2. Anatomie de la Veine Jugulaire Interne (VJI)
 - Caractéristiques et Morphométrie
 - Origine, Trajet et Terminaison
 - Affluents Veineux
3. Système des Sinus Veineux de la Dure-Mère
 - Groupe Postéro-Supérieur (Pressoir d'Hérophile)
 - Groupe Antéro-Inférieur (Sinus Caverneux et collatérales)
4. Systèmes Veineux Superficiels et Secondaires
 - Veine Jugulaire Externe (VJE)
 - Veine Jugulaire Antérieure (VJA)
5. Analyse Stratégique des Examens
6. Carte Mentale de Synthèse



Introduction au Système Veineux Cervico-Céphalique

* Drainage cérébral :


- * Le sang veineux cérébral est déversé de chaque côté dans les veines jugulaires internes droite et gauche.
- * Ces dernières ont pour origine les sinus veineux de la dure mère.

* Drainage cervical :

- * Le sang veineux du cou est drainé de chaque côté par les veines : jugulaires interne, externes, antérieure, postérieure, et thyroïdiennes inférieures.

* Règles Fondamentales & Rachis :

- * Les veines vertébrales et jugulaires postérieures drainent la colonne. [Ref: Q17, 2022 2°EMD]
- * Les veines de la tête sont réparties en groupe antérieur, moyen et postérieur. Elles ne se disposent pas toutes par paire, sont souvent sans valvules, sont inextensibles, et ne se drainent pas toutes par le pressoir d'Hérophile. [Ref: Q14, 2021 2°EMD]



I- La Veine Jugulaire Interne (VJI) : Caractéristiques et Morphométrie

Territoire de Drainage :

La **veine jugulaire interne** est la **plus volumineuse veine du cou**. [Ref: Q9, Q10, 2025/2023 2°EMD]

Drainant le sang veineux de la cavité crânienne, de la région orbitaire, d'une partie de la face et de la **plus grande partie de la région antérieure du cou**. [Ref: Q9, 2025 2°EMD]

Biométrie :


Calibre est de **10 mm**. Longueur **15 cm**. [Predicted – Reason: Données chiffrées précises à très haut risque de QCM.]

Dilatations et Valvules :

Deux dilatations : à son origine : le **bulbe supérieur** ou **golf de la jugulaire**. [Ref: Q16, 2025 2°EMD]

à sa terminaison : le **bulbe inférieur** ou **sinus jugulaire**. [Predicted – Reason: Le pendant direct du bulbe supérieur déjà testé.]

Elle présente à sa terminaison deux **valvules ostiales**. [Predicted – Reason: Détail structurel anti-reflux majeur.]



I- La Veine Jugulaire Interne (VJI) : Origine, Trajet et Terminaison

Origine :


- Elle débute au niveau du foramen jugulaire où elle fait suite au sinus latéral. [Ref: Q16, Q9, Q14, 2025/2024]

Trajet Cervical :

- Sort du foramen jugulaire.
- La veine jugulaire interne se trouve au niveau de l'espace rétro-stylien à sa sortie du foramen jugulaire. [Ref: Q17, 2022 2°EMD]
- Passe entre la mastoïde et l'angle mandibulaire. [Predicted – Reason: Repères osseux fondamentaux du défilé cervical supérieur.]
- Elle descend dans le cou à l'intérieur de la gaine vasculaire, avec l'artère carotide et le X (nerf vague) jusqu'en arrière de l'extrémité médiale de la clavicule. [Ref: Q12, Q16, 2022/2025]

Terminaison :


- Elle se termine en s'unissant à la veine sub-clavière pour former la veine brachio-céphalique. [Ref: Q9, Q12, 2024/2022]



I- La Veine Jugulaire Interne (VJI) : Affluents Veineux

Réseau Affluent Direct :

- **Le tronc veineux thyro-linguo-facial.**
[Ref: Q9, Q10, 2025/2024/2023 2°EMD]
(Note Examen : Il se jette formellement dans la jugulaire interne, un piège classique indique l'externe).
- **La veine pharyngienne inférieure.**
[Predicted – Reason: Collatérale mineure très prisée pour les QCM d'élimination.]
- **La veine thyroïdienne moyenne.**
[Predicted – Reason: Souvent confondue avec la thyroïdienne inférieure qui possède un trajet différent.]




01- Groupe Postéro-Supérieur : Confluent et Sinus Impairs

Le Confluent Postérieur :

- Les sinus de ce groupe s'ouvrent en avant de la protubérance occipitale interne dans le confluent postérieur : le pressoir d'Hérophile. [Ref: Q14, 2021 2°EMD]

Les Sinus Impairs et Médiants :

1. Le sinus sagittal supérieur (longitudinal supérieur).
[Predicted – Reason: La double nomenclature (sagittal/longitudinal) est la cible parfaite de propositions fausses.]
2. Le sinus sagittal inférieur (longitudinal inférieur).
[Predicted – Reason: Idem.]
3. Le sinus droit. [Predicted – Reason: Classification fondamentale (Impair vs Pair).]



01- Groupe Postéro-Supérieur : Les Sinus Pairs et Latéraux

Sinus Occipitaux :


Les sinus occipitaux (occipitaux postérieurs).
[Predicted – Reason: Ne pas confondre avec le sinus occipital transverse du groupe antérieur.]

Sinus Latéraux :


Ils sont subdivisés anatomiquement en deux segments :

1. Un segment horizontal occipital (sinus transverse). [Ref: Q16, 2025 | Q14, 2024]
2. Un segment sinueux (sinus sigmoïde). [Ref: Q16, 2025 | Q9, 2024]

(Rappel : Le sinus sigmoïde traverse le foramen jugulaire pour devenir la Veine Jugulaire Interne).



02- Groupe Antéro-Inférieur des Sinus de la Dure-Mère



Sinus Pairs et Latéraux :

- > **Les sinus caverneux.** [Predicted – Reason: Zone carrefour cruciale.]
- > **Les sinus sphéno-pariétaux.**
- > **Les sinus pétreux supérieurs.**
- > **Les sinus pétreux inférieurs.**

Sinus Impairs :

- > **Sinus inter caverneux (sinus coronaire).**
[Predicted – Reason: Terminologie alternative (coronaire) constituant un piège absolu.]
- > **Le plexus basilaire (sinus occipital transverse).**
[Predicted – Reason: Souvent confondu avec les sinus occipitaux postérieurs.]

Les Systèmes Superficiels : La Veine Jugulaire Externe (VJE)

Territoires :

Draine le sang des régions superficielles de la tête, les profondes de la face et les plans superficiels des régions postérieure et latérale du cou.

Origine et Trajet :


- La veine jugulaire externe naît par la réunion des veines temporale superficielle et maxillaire. [Ref: Q10, 2023 | Q9, 2025]
- Traverse la région parotidienne. [Ref: Q17, 2022]

Terminaison :

- Se termine dans la veine sub-clavière. [Predicted – Reason: Destination finale testable.]

Affluents et Rameaux :

- Plusieurs rameaux cervicaux sous cutanés, la veine supra scapulaire, la veine transverse du cou, des rameaux musculaires. [Predicted – Reason: Liste des collatérales de la VJE très précise.]
- S'anastomose avec la veine faciale par la veine retro-mandibulaire. [Predicted – Reason: Pont anastomotique clinique majeur.]



Les Systèmes Superficiels : La Veine Jugulaire Antérieure (VJA)

Origine :

Elle résulte de la réunion dans la région sus-hyoïdienne de plusieurs petites veines sous mentales superficielles. [Predicted – Reason: Origine fragmentée très spécifique comparée à VJI/VJE.]

Trajet :

Elle descend à la face antérieure du cou en dehors de la ligne médiane. [Predicted – Reason: Aspect paramédian souvent testé en opposition à un trajet médian faux.]


Terminaison :

Se termine dans la veine sub-clavière. [Ref: Q9, 2025]

Affluents et Arcade :

Reçoit des rameaux provenant des téguments et des muscles voisins.

Reçoit l'arcade veineuse jugulaire qui l'unit à la veine du côté opposé. [Predicted – Reason: L'arcade transversale est une spécificité anatomique forte de ce système.]



Matrice Diagnostique et Topographique des Veines Jugulaires

Veine	Origine	Terminaison	Particularité
Veine Jugulaire Interne (VJI)	Foramen Jugulaire (Sinus latéral)	S'unit à la Sub-clavière (Tronc Brachio-Céphalique)	La plus volumineuse ; Gaine vasculaire (avec X et Carotide) ; Reçoit le tronc thyro-linguo-facial.
Veine Jugulaire Externe (VJE)	Réunion temporale superficielle + maxillaire	Veine sub-clavière	Superficielle ; Traverse la parotide ; Anastomose faciale (rétro-mandibulaire).
Veine Jugulaire Antérieure (VJA)	Veines sous-mentales superficielles	Veine sub-clavière	Superficielle ; Descend en dehors de la ligne médiane ; Arcade jugulaire transversale.

Synthèse Majeure de Terminaison :

La veine sub-clavière reçoit ou s'unit au final aux veines jugulaires interne, externe, antérieure et à la veine vertébrale. [Ref: Q9, 2025 | Q12, 2022]

Exam Pattern Analysis : Décryptage Stratégique

Indice de Confiance de Prédiction : 92%

Sujets les Plus Répétés (Top Priorité)



- * La continuité VJI / Foramen jugulaire / Sinus latéral / Tronc brachio-céphalique (**Testé en 2025, 2024, 2022**).



- * Les affluents de la VJI (Le tronc thyro-linguo-facial est un incontournable).



- * Les rapports cervicaux de la VJI (Gaine vasculaire, Carotide, Nerf Vague X).



Pièges Classiques (Danger)



- * Croire que le tronc thyro-linguo-facial se jette dans la VJE (**Faux : VJI**).




- * Assumer que toutes les veines crâniennes se drainent par le Pressoir d'Hérophile (**Faux : Seulement le groupe postéro-supérieur**).



Cibles Futures Hautement Probables



- * **Biométrie de la VJI** : 10 mm de calibre, 15 cm de long, et 2 valvules ostiales terminales.



- * **Distinction intra-groupe des sinus** (ex: Le sinus droit est impair ; le plexus basilaire est impair).



- * **L'anastomose VJE / veine faciale** via la veine rétro-mandibulaire.



Carte Mentale Exhaustive du Système Veineux Cervico-Céphalique

