


Variations Morphologiques des Dents Permanentes

Le Guide Complet pour le Diagnostic et la Préparation aux Examens

Dr. BOUCEBHA

Les Bases : Variation vs. Anomalie

- **Variation anatomique** : Une forme anatomique plus ou moins éloignée du type le plus fréquent.
- **Anomalie** : Une forme anatomique qui résulte d'une déviation du développement embryonnaire normal.
- **Causes Principales** : Le plus souvent liées à des facteurs héréditaires ou à des troubles du métabolisme ou du développement.
- **Aspects Affectés** : Les variations et anomalies peuvent affecter la forme, la structure et/ou le volume des dents.



Un Germe ou Deux ? Gémination vs. Fusion



Gémination

- **Définition:** Résulte du dédoublement d'un seul germe dentaire (Q4).
- **Signes Cliniques:** Cavité pulpaire simple et une encoche nette sur le bord libre (Q2).
- **Numération:** Le nombre de dents sur l'arcade est normal.



Fusion

- **Définition:** C'est l'accolement de deux germes dentaires adjacents (Q4).
- **Signes Cliniques:** Les cavités pulpaires sont distinctes.
- **Numération:** On compte une dent de moins sur l'arcade (Q22).



Question de Taille : Macrodontie & Microdontie



- **Définition:** Volume dentaire plus fort que la limite supérieure admise.
- **Manifestation Clinique:** Se manifeste par des malpositions dentaires.
- **Macrodontie Relative:** Est une illusion due à la petitesse des maxillaires (Q15).



- **Définition:** Volume dentaire plus faible que la limite inférieure admise.
- **Manifestation Clinique:** Se manifeste par des diastèmes interdentaires (Q3).

Formes Internes : Taurodontisme & Dens in Dente


Taurodontisme

- **Caractéristiques:** Se caractérise par l'augmentation du volume de la chambre pulpaire (Q6).
- **Signe Radiologique Clé:** Le plancher pulpaire est repoussé très loin dans la racine (Q6).
- **Note:** Il n'y a pas d'étranglement au collet.



Dens in Dente (Odontome intradentaire)

- **Mécanisme:** Résulte de l'invagination de l'organe de l'émail à l'intérieur de la dent (Q1), formant "une dent dans une dent".
- **Localisation fréquente:** La dent la plus touchée est l'incisive latérale supérieure permanente.



Les Incisives : Des Formes Révélatrices



Incisive de Hutchinson

Décrite comme une incisive en 'lame de tournevis', elle est un signe morphologique de la syphilis congénitale (Q34).



Incisive en 'pelle'

Caractérisée par une accentuation des crêtes marginales sur sa face linguale (Q16), avec une fosse linguale fortement concave.



Incisive conoïde ('en grain de riz')

La couronne a une forme conique. Cette anomalie concerne le plus souvent l'incisive latérale supérieure (Q30).

Tubercules : Variations de Surface

1. Tubercule de Carabelli



Localisation: Situé sur la face linguale de la cuspide mésio-linguale des molaires supérieures.

Statut: Considéré comme une variation morphologique normale (Q26). Fréquence élevée (50%).

2. Tubercules paramolaires de Bolk



Localisation: Structures qui se localisent à la face vestibulaire des cuspides MV des molaires supérieures (Q8).

Fréquence: Fréquents au niveau des 2^{ème} et 3^{ème} molaires supérieures (Q8).

3. Dens Evaginatus (Dent évaginée)



Description: Une excroissance (tubercule) d'émail sur la face occlusale, contenant souvent de la pulpe (Q20).

Les Fondations : Anomalies Radiculaires (Nombre & Longueur)


Racines Surnuméraires



Peuvent affecter toutes les dents.

Localisations Fréquentes: La canine inférieure et les molaires inférieures (racine 'entomolaire') (Q21).

Anomalies de Longueur



Gigantisme / Nanisme Radiculaire: Concerne la longueur de la racine, qui est augmentée ou réduite (Q10).

Rhizomicrie: Le terme spécifique pour des racines anormalement courtes (Q32).

Formes Radiculaires : Courbures et Fusions

1. Dilacération (Courbure Radiculaire)



- **Description:** Forte angulation ou courbure de la racine.
- **Cause Possible:** Peut être due à un traumatisme sur la dent temporaire ayant déplacé le germe permanent (Q17).
- **Implication Clinique:** Peut compliquer l'extraction et le traitement endodontique.

2. Racine en 'baïonnette'



- **Description:** Racine présentant une double courbure (en S) (Q25).

3. Coalescence (Synostose)



- **Description:** La fusion des racines d'une même dent multi-radiculée (Q29).


Tissus Radiculaires : Cément, Émail & Union

Hypercémentose



Description: Une apposition excessive de cément sur la racine (Q18). Donne souvent une forme en 'massue' à l'apex.

Perles d'émail (Enamélomes)



Description: Des nodules sphériques d'émail (Q9).

Localisation Préférentielle: Au niveau de la bifurcation ou trifurcation des racines des molaires (Q19).


Concrescence



Description: L'union secondaire de racines de dents différentes, par une prolifération anormale de leur cément (Q7).

Compter les Dents : Agénésie & Dents Surnuméraires

Agénésie (Anodontie partielle)




- **Définition:** L'absence d'une ou plusieurs dents par manque de formation du germe (Q11).
- **Dents les plus touchées:** Les incisives latérales supérieures et les secondes prémolaires inférieures (Q12).
- **Anodontie Totale:** L'absence de toutes les dents, souvent associée à une dysplasie ectodermique (Q23).

Dents Surnuméraires



- **Classification:** Peuvent être eumorphes (forme normale) ou hétéromorphes (forme anormale) (Q14).
- **Exemple Type:** Le **Mésiodens** est une dent surnuméraire située entre les deux incisives centrales supérieures (Q13).


Mauvais Endroit : Ectopie & Transposition



Ectopie dentaire

Définition: L'éruption de la dent dans une position anormale, hors de sa place habituelle sur l'arcade (Q28).

- **Exemple:** Canine en position vestibulaire haute.



Transposition dentaire

Définition: L'échange de position entre deux dents adjacentes sur l'arcade (Q27).

- **Cas le plus fréquent:** Concerne souvent la canine et la première prémolaire.

Défauts de Structure d'Origine Acquise

Dent de Turner (Hypoplasie de Turner)



Description: Une hypoplasie localisée de l'émail d'une dent permanente, causée par une infection de la dent temporaire sus-jacente (Q24).

Fluorose dentaire



Cause: Une hypoplasie ou hypominéralisation de l'émail due à une ingestion excessive de fluor (Q31).

Apparence: Se manifeste par des taches blanches crayeuses ou brunâtres (Q31).

Formes Rares et Syndromiques

Globulodontie




Description: Se caractérise par des dents de forme sphérique ou globuleuse (Q33).

Dents affectées: Concerne souvent les canines et molaires (Q33).

Association: Souvent liée à un syndrome (Otodental).


Dentomes



Définition: Terme général pour des excroissances coronaires de forme et de volume variable (Q5).

Composition: Composés d'émail et de dentine (Q5).

La Maîtrise de la Morphologie Dentaire : Une Synthèse



La connaissance de l'anatomie dentaire normale de chaque type de dent est essentielle pour pouvoir diagnostiquer tout ce qui sort de la normale.

Bonne préparation pour vos examens.