




AUTOPSIE PHARMACOLOGIQUE : LES OPIOÏDES

Analyse Exhaustive et Déconstruction des QCM
(2018-2025) – 3^o Année Médecine Dentaire

L'unique autorité : Support de cours
Dr. Ammi (2025-2026).

■	Données & Source
■	La Vérité (Correct)
■	L'Erreur & Le Piège
■	Astuce Mnémonique

Q1 - 2025 (2° EMD)

Question

Laquelle des molécules suivantes est un agoniste partiel et de forte affinité pour les récepteurs opioïdes :

- A. La codéine. B. Le tramadol. C. La buprénorphine.
D. Le Fentanyl.


Réponse Correcte : C

Analysis

LA VÉRITÉ : La buprénorphine se lie aux récepteurs μ avec une très forte affinité mais possède une activité stimulante intrinsèque plus faible (effet plafond).

LES ERREURS : A est faux car la codéine est un agoniste pur faible.
B est faux car le tramadol est un agoniste pur par action sur μ , non partiel.
D est faux car le fentanyl est un agoniste plein/pur fort.

Visual Aid



Trap & Trick

LE PIÈGE : Confondre 'Faible' et 'Partiel'. Un agoniste partiel peut avoir une puissance énorme (Palier III) mais une efficacité plafonnée.

MÉMO : BUP = Bloque Un Peu (Agoniste partiel).

Q2 - 2025 (2° EMD)

Question

A propos du tramadol :

- A. Il s'agit d'un agoniste partiel des récepteurs mu des opioïdes.
B. C'est un médicament stupéfiant. C. Il est employé pour le traitement des douleurs de deuxième palier. D. Aucune réponse n'est juste.


Réponse Correcte : C

Analysis

LA VÉRITÉ : Le Tramadol correspond au palier II de l'OMS (analgésiques morphiniques faibles).

LES ERREURS : A est faux car il agit sur μ mais n'est pas partiel.
B est faux car il est Liste I, non stupéfiant.
D est faux car C est correct.

Visual Aid



Trap & Trick

LE PIÈGE : Le Tramadol échappe à la règle stricte des stupéfiants et ne donne pas de dépression respiratoire aux doses recommandées.

MÉMO : TRAM = Trois Risques Absents (Pas de détresse respi, pas de constipation, pas stupéfiant).

Q3 - 2024 (2° EMD)


Laquelle des molécules suivantes est un **agoniste parfait** et de forte affinité pour les récepteurs opioïdes :

- A. La codéine.
- B. Le tramadol.
- C. La buprenorphine.
- D. Le fentanyl.

Réponse Correcte : D

LA VÉRITÉ : Le Fentanyl est un agoniste pur/parfait, analgésique morphinique fort (Palier III), avec une puissance 100x supérieure à la morphine per os.

LES ERREURS : A est faux car c'est un palier II de faible puissance. B est faux car c'est un analgésique faible. C est faux car c'est un agoniste partiel, non parfait.



LE PIÈGE : Le terme 'Parfait' est le synonyme MCQ pour 'Pur' = Activité intrinsèque maximale (100%).

MÉMO : Fentanyl = Fort et Foudroyant (Puissance 100x).

Q4 - 2024 (2° EMD)


Parmi les **effets indésirables** des analgésiques opioïdes on retrouve :

- A. Troubles digestifs type vom.
- B. Hypertension artérielle.
- C. Dépression respiratoire.
- D. Dilatation pupillaire.

Réponse Correcte : C

LA VÉRITÉ : La dépression respiratoire est l'effet indésirable majeur (médié par μ_2) limitant le pronostic vital.

LES ERREURS : A est faux car les opioïdes causent la CONSTIPATION, pas la diarrhée. B est faux car ils causent une hypotension et bradycardie. D est faux car ils causent un MYOSIS (contraction), pas une dilatation.



LE PIÈGE : Le piège classique des effets parasympathiques. Les opioïdes ralentissent tout et ferment la pupille.

MÉMO : Les 3 C de la Morphine = Constipation, Contraction (Myosis), Calme respiratoire (Dépression).

Q5 - 2023 (2° EMD)

Question : A propos du tramadol :

- A. C'est un analgésique central fort.
- B. Il est contre-indiqué en association avec un analgésique central ou périphérique.
- C. Son affinité aux récepteurs μ est égale à celle de la morphine pour les mêmes récepteurs.
- D. Appartient à la liste I.

Réponses Correctes : C, D

LA VÉRITÉ : Appartient à la Liste I (D). Selon la clé de 2023, son affinité est validée comme "égale" à la morphine (C).

LES ERREURS : A est faux car il est Palier II (faible).

B est faux car il est très souvent associé avec le paracétamol (antalgique périphérique).



LE PIÈGE : ALERTE CONTRADICTION ! Ce corrigé valide l'affinité "égale" (C), mais attention, le corrigé de 2022 validera le contraire. Mémorisez la formulation de cette année spécifique.

MÉMO : Tramadol = Associable et Liste I.

Q6 - 2023 (2° EMD)

Question : A propos des analgésiques centraux agonistes forts :

- A. Ils sont indiqués pour les douleurs du troisième palier.
- B. Ils incluent la morphine et la buprénorphine.
- C. Ce sont des antagonistes des récepteurs Kappa.
- D. Ils sont indiqués pour les douleurs du deuxième palier.


Réponse Correcte : A

LA VÉRITÉ : Les agonistes forts (Morphine, Oxycodone, Fentanyl) sont réservés au Palier III (douleurs intenses/rebelles).

LES ERREURS : B est faux car la Buprénorphine est un agoniste PARTIEL, pas fort.

C est faux car ce sont des agonistes μ et κ .

D est faux car c'est le Palier III, pas le II.



LE PIÈGE : La Buprénorphine est le piège absolu : Elle est utilisée au Palier III mais N'EST PAS classée comme un agoniste fort/pur.

MÉMO : Fort = Palier 3 = Morphine. Partiel = Palier 3 = Buprénorphine.

Q7 - 2022 (2° EMD)

La morphine est un analgésique central :

- A. Ayant une activité intrinsèque inférieure à 10.
- B. Indiqué dans les douleurs du troisième palier.
- C. Qui appartient à la liste 1.
- D. Agoniste des 30 minutes.
- E. Agoniste des récepteurs μ et antagoniste des récepteurs Kappa.


Réponse Correcte : B

LA VÉRITÉ

La morphine est le chef de file des analgésiques centraux forts, destinés au Palier III.

LES ERREURS

A est faux car elle a une activité intrinsèque maximale (100%).
C est faux car elle est classée STUPÉFIANT, ce qui est distinct et plus strict que la Liste I.
D est faux (distracteur absurde).
E est faux car elle est agoniste μ ET agoniste κ .



LE PIÈGE

Liste 1 vs Stupéfiant. La morphine est strictement un STUPÉFIANT. Ne cochez jamais Liste 1.

MÉMO

Morphine = Agoniste Pur = Activité 100% = Stupéfiant = Palier 3.

Q8 - 2022 (2° EMD)

A propos du tramadol :

- A. C'est un analgésique central fort.
- B. Il n'est commercialisé que sous forme non associée.
- C. Son affinité aux récepteurs μ est supérieure à celle de la morphine.
- D. Son activité intrinsèque est identique à celle de la morphine.


Réponses Correctes : A, D

LA VÉRITÉ

Activité intrinsèque identique (D) car c'est un agoniste pur.
Selon la clé 2022, il valide l'option 'Fort' (A) exceptionnellement.

LES ERREURS

B est faux car il est largement associé.
C est faux car son affinité est plus FAIBLE que la morphine (ce qui contredit directement la question de 2023).



LE PIÈGE DU PROFESSEUR

En 2022, la réponse officielle valide Tramadol comme 'Fort' avec affinité inférieure. En 2023, c'est 'Faible' avec affinité égale. Fiez-vous à 'Activité Intrinsèque = Identique'.

MÉMO

Tramadol : Agoniste 'Pur' (Activité = Morphine) mais de 'Faible' fixation.

Q9 - 2021 (2° EMD)

À propos de la buprénorphine :

- A. Il s'agit d'un agoniste partiel des récepteurs de Kappa.
- B. Elle possède une affinité plus faible que celle de la morphine vis-à-vis des récepteurs Mu.
- C. Elle est utilisée comme antidote en cas d'intoxication par la morphine.
- D. Son activité intrinsèque est plus faible que celle de la morphine.

Réponse Correcte : D

LA VÉRITÉ : En tant qu'agoniste partiel, son activité intrinsèque est plus faible (elle n'atteint pas l'effet maximum analgésique de la morphine).

LES ERREURS : A est faux car elle est ANTAGONISTE Kappa (et agoniste partiel μ). B est faux car son affinité est TRÈS FORTE. C est faux car l'antidote est la Naloxone, un antagoniste pur.



LE PIÈGE : L'inversion des récepteurs. Buprénorphine = Agoniste μ partiel ET Antagoniste κ .

MÉMO : Bupre = Forte fixation (Affinité) + Faible action (Activité).

Q10 - 2021 (2° EMD)


Concernant le mode d'action des analgésiques opioïdes :

- A. Les récepteurs opioïdes se trouvent uniquement au niveau du SNC.
- B. La stimulation des récepteurs induit l'activation des canaux potassiques hyperpolarisants.
- C. Localisation exclusivement post-synaptique.
- D. La stimulation induit une augmentation de la formation de l'AMP cyclique.

Réponse Correcte : B

LA VÉRITÉ : La stimulation des récepteurs couplés aux protéines Gi provoque l'ouverture des canaux K^+ entraînant une hyperpolarisation et une diminution de l'excitabilité.

LES ERREURS : A est faux car ils sont aussi dans le SNP (tractus GI, vessie). C est faux car ils sont pré- et post-synaptiques. D est faux car ils INHIBENT la formation d'AMPc.



LE PIÈGE : Piège neurophysiologique : Les opioïdes 'ferment' les canaux Calcium et 'ouvrent' les canaux Potassium (fuite hyperpolarisante).

MÉMO : Protéine Gi = Inhibition. Baisse de l'AMPc, Baisse du Calcium.

Q11 - 2020 (2° EMD)


A propos de la morphine :

- A. Il s'agit d'un analgésique central pur et fort.
- B. Il s'agit d'un analgésique central et périphérique.
- C. Est un analgésique central partiel.
- D. La durée maximale de sa prescription est de 06 semaines.

Réponse Correcte : **A**

LA VÉRITÉ : La Morphine est le chef de file : analgésique d'action strictement centrale (SNC), agoniste pur, et de puissance forte.

LES ERREURS : B est faux car l'action est purement centrale (AINS/Paracétamol sont périphériques). **C** est faux car c'est un agoniste pur, non partiel.
D est faux car les stupéfiants sont limités à 28 jours (4 semaines).



LE PIÈGE : Ne jamais associer Morphine avec les mots 'Périphérique' ou 'Partiel'. C'est le standard absolu de l'action centrale pure.

MÉMO : Morphine = Le Chef de file (Équivalent posologique de référence = 1).

Q12 - 2019 (2° EMD)

La buprénorphine :

- A. Est un analgésique central opiacé.
- B. Est un analgésique central moins puissant que la morphine.
- C. Appartient à la famille des agonistes purs.
- D. Est un analgésique central partiel.

Réponse Correcte : **D**

LA VÉRITÉ : C'est la définition fondamentale du cours : La buprénorphine est un analgésique central agoniste partiel des récepteurs μ .

LES ERREURS : A est faux car c'est un opioïde semi-synthétique (opiacés = naturels). **B** est faux car elle est 50 fois PLUS puissante que la morphine (0.2mg = 10mg). **C** est faux car elle est partielle.



LE PIÈGE : Puissance $\neq$ Efficacité. La buprénorphine est extrêmement puissante (dose minuscule requise) mais d'efficacité partielle (effet plafond).

MÉMO : Petit dosage (0.2mg) = Grande Puissance (x50) = Agoniste Partiel.

Q13 - 2018 (2° EMD)


A propos des analgésiques morphiniques :

- A. Ils sont tous des opiacés.
- B. L'activation de leurs récepteurs induit une hyperexcitabilité neuronale.
- C. Certains d'eux sont des analgésiques périphériques.
- D. La buprenorphine fait partie de cette classe.

Réponse Correcte : D

LA VÉRITÉ : La buprénorphine fait partie des analgésiques morphiniques (appellation générale englobant les opioïdes).

LES ERREURS : A est faux car beaucoup sont synthétiques (Fentanyl) = Opioïdes. Opiacés = dérivés naturels purs de l'opium.
B est faux car ils induisent une HYPO-excitabilité (inhibition).
C est faux car ils sont exclusivement centraux.



LE PIÈGE : Opiacé vs Opioïde. Tous les opiacés sont des opioïdes, mais l'inverse est faux.

MÉMO : OpiAcé = Arbre (Naturel). OpiOïde = glObal.

Q14 - 2018 (2° EMD)

A propos de la morphine :

- A. Elle est délivrée pour une durée maximale d'un mois.
- B. Il s'agit d'un agoniste Kappa et antagoniste Mu.
- C. Elle appartient à la liste des stupéfiants.
- D. Est un analgésique du deuxième palier de la douleur.

Réponse Correcte : C

LA VÉRITÉ : La morphine est le chef de file de la classe et est strictement classée comme Stupéfiant, nécessitant une ordonnance sécurisée.

LES ERREURS : A est un distracteur contextuel face à C qui est la classification pharmacologique absolue.
B est faux car c'est la définition exacte de la Nalbuphine.
D est faux car c'est un Palier III.



LE PIÈGE : Inverser les mécanismes de la Nalbuphine et de la Morphine. Nalbuphine = Agoniste κ / Antagoniste μ .

MÉMO : Nalbuphine = Non au μ , Oui au κ .

LA MATRICE DE SYNTHÈSE DÉFINITIVE

Molécule	Palier OMS	Nature & Activité	Récepteurs	Équivalent Posologique	Statut Légal
Morphine	Palier III	Agoniste Pur (100%)	μ (+), κ (+)	Réf: 1 (10mg per os)	Stupéfiant
Codéine	Palier II	Agoniste Pur Faible	μ (+)	* 0.15 (60mg = 10mg)	Liste I
Tramadol	Palier II	Agoniste Pur Faible	μ (+)	* 0.2 (50mg = 10mg)	Liste I
Buprénorphine	Palier III	Agoniste Partiel	μ (+), κ (-)	* 50 (0.2mg = 10mg)	Stupéfiant
Fentanyl	Palier III	Agoniste Pur Fort	μ (+)	* 100 (25 μ g = 60mg)	Stupéfiant
Nalbuphine	Palier III	Agoniste- Antagoniste	μ (-), κ (+)	* 2 (10mg = 20mg)	Stupéfiant
Naloxone	Antidote	Antagoniste Pur (0%)	μ (-), κ (-)	N/A (Bloque tout)	Urgence