Dr N. FERRAD

Année 2023/2024

STRICTES

BACTÉRIES ANAÉROBIES STRICTES

Enseignement de Microbiologie – 2ème année de Chirurgie Dentaire

Instructeur: Dr N. FERRAD
Année Universitaire: 2023/2024

Dentist Web

Protocole d'Étude & Sommaire

1. Fondements & Taxonomie
(Qui sont-elles ?)

2. Écologie & Physiopathologie
(Où vivent-elles et comment attaquent-elles ?)

3. Diagnostic Bactériologique
(Comment les isoler ?)

4. Stratégie Antimicrobienne
(Comment les éliminer ?)

CRITICAL MEMORIZATION KEY

- Yellow Highlight Concept testé dans les examens précédents (indiqué avec [Ref: Q#]).
  À mémoriser en priorité absolue.
- Green Highlight **Prédiction stratégique** pour le prochain examen (indiqué avec [Predicted]).
  Forte probabilité d'évaluation.

Dentist Web

Profil Métabolique des Anaérobies Strictes



- **Métabolisme énergétique** : Dépourvues des enzymes du métabolisme respiratoire (cytochrome, catalase, peroxydase). Production d'énergie uniquement par fermentation.
- **Toxicité absolue de l'oxygène** [Ref: Q5] : Ne peuvent pas se développer en présence d'O2. Nécessitent une atmosphère totalement dépourvue d'oxygène.
- **Origine endogène** [Ref: Q4, Q5] : En pathologie bucco-dentaire et oro-pharyngée, la grande majorité de ces bactéries font partie de la flore buccale normale.

Dentist Web

Classification Générale des Anaérobies Strictes

Bacilles à Gram positif sporulés	Bacilles à Gram positif non sporulés	Bacilles à Gram négatif	Cocci à Gram positif	Cocci à Gram négatif
Clostridium • Non impliqués dans les infections bucco-dentaires [Ref: Q8] : *C. perfringens, C. tetani, C. botulinum, C. difficile*	- Actinomyces - Propionibacterium - Lactobacillus - Eubacterium - Bifidobacterium	- Bacteroides (*B. fragilis*) - Fusobacterium - Prevotella - Porphyromonas	Peptostreptococcus [Ref: Q9]	Veillonella (Seul genre dans ce groupe)

Dentist Web

Profil des Anaérobies Odontogènes

Key Drivers of Infection

- **Cocci Gram (+) :** Peptostreptococcus **[Ref: Q9]**. (Espèces les plus souvent isolées).
- **Bacilles Gram (-)** : Bacteroides (Prevotella, Porphyromonas, Fusobacterium).
- **Faible impact :** Cocci Gram (-) et Bacilles Gram (+) (À l'exception d'Eubacterium).

Espèces Spécifiques Fréquemment Impliquées

- ✓ *Prevotella intermedia*
- ✓ *Porphyromonas gingivalis* (Abcès dentaire)
- ✓ *Tannerella forsythensis* (Gram négatif, maladies parodontales)
- ✓ *Eubacterium species*
- ✓ *Fusobacterium nucleatum*
- ✓ *Peptostreptococcus micros*

Dentist Web

Cartographie Écologique (Habitats Naturels)



Flore Buccale Exclusive : Eubacterium (Bacille G+), Tannerella forsythia (Bacille G-).

Bouche, Voies Génitales, Voies Respi. Sup. : Fusobacterium (Bacille G-).

Bouche, Intestin, Tractus Urogénital : Porphyromonas & Prevotella (Bacilles G-).

Bouche, Nasopharynx, Intestin, Voies Génitales : Peptostreptococcus (Cocci G+).

Bouche, Tube Digestif, Vagin : Veillonella (Cocci G-).

Dentist Web

Physiopathologie : Les 3 Stades de l'Infection

Durée : 0–3 j	Durée : 2–5 j	Durée : 4–10 j
Malaise : Léger	Malaise : Diffus	Malaise : Localisé
Palpation : Souple, élastique	Palpation : Ferme, induration	Palpation : Fuyant au doigt, douleur
Pus : Aucun	Pus : Aucun	Pus : Présent
Peau : Normale	Peau : Rouge	Peau : Rouge en périphérie
Gravité : Minimale	Gravité : Plus élevée	Gravité : Moindre
Espèces : Aérobies	Espèces : Mixtes	Espèces : **Anaérobies**

Mécanisme de propagation : Extension directe depuis la région périapicale. Le profil dépend de l'attache du muscle adjacent et de l'apex de la dent.

Dentist Web

Détection des Infections Graves & Référence

Action requise : Détection immédiate et orientation rapide vers un spécialiste en chirurgie buccale et maxillo-faciale.

Signes cliniques d'alerte (Critères de gravité absolue) [Predicted - Highly specific clinical criteria prime for multiple-choice questions]:

- **Fièvre (Température > 38°C)**
- **Stridor**
- **Odynophagie**
- **Évolution rapide**
- **Atteinte de sièges multiples et d'espaces anatomiques secondaires**

Dentist Web

Protocole de Prélèvement Bactériologique

1. Interdiction : Éviter l'emploi d'écouvillons.

2. Aspiration : Prélever le pus à l'aide d'une aiguille et d'une seringue stériles [Ref: Q6].

3. Purge : Aussitôt, chasser l'air de la seringue [Ref: Q6] et **fermer hermétiquement.**

4. Transport immédiat : Acheminer rapidement avec fiche de renseignements. Ensemencer sans délai.

5. Milieu de Transport : Si délai, utiliser un milieu anaérobie pour protéger de l'O2, de la dessiccation et maintenir les proportions des espèces [Ref: Q6, Q11].



Dentist Web

Culture & Identification en Laboratoire

Culture Conditions

- Milieux : Géloses au sang, fraîchement préparées. Désoxygénées au préalable et enrichies en substances réductrices [Ref: Q11].
- Atmosphère : Générateur d'atmosphère anaérobie (jarre ou sacs fermés hermétiquement) [Ref: Q6].
- Incubation Supérieure (Règle Absolue) : Strictement à 35°C pendant 02 à 05 jours (ou plus) [Predicted - Ignore external 37°C exam data; strictly memorize the 35°C PDF metric].



Culture Conditions

- Milieux : Géloses au sang, fraîchement préparées. Désoxygénées au préalabie et réductrices [Ref: Q11].
- Atmosphère : Générateur d'atmosphère anaérobie (jarre ou sacs fermés
- Incubation Supérieure (Règle Absolue) : Strictement à 35⍰ pendant (ou Q6) [Predicted - Ignore external 37°C exam data; strictly memolrize the 35°C PDF metric].

Identification

- Examen direct (Frottis/Gram pour orientation). État frais (mobilité, (mobilité, spores).
- Mise en évidence du caractère anaérobie strict.
- Galeries biochimiques (fermentation sucres, enzymes).

Dentist Web

Prise en Charge Clinique & Sensibilité Générale

Règles Cliniques Incontournables

- **Source de l'infection** : Traitement immédiat obligatoire. Une antibiothérapie seule est inacceptable (aggravation).
- **Support patient** : Optimiser l'état de santé, évaluer le bilan hydrique et nutritionnel.
- **Infection bénigne vestibulaire** : Pas d'antibiothérapie post-extraction.

Profil de Sensibilité Global
- **Pénicilline G** : Active, mais inactive sur *B. fragilis* (producteur de β-lactamase).
- **β-lactamines + inhibiteurs / Carbapénèmes** : Bonne activité globale.
- **Aminosides** (Gentamicine, Amikacine) : Inactifs vis-à-vis de TOUS les anaérobies [Ref: Q9].
- **Fluoroquinolones & Nitro-imidazoles** : Actives (antibiogramme requis pour nitro-imidazoles).

Dentist Web

Pharmacologie Odontogène : Lignes de Défense (1/2)



Pénicillines (1ère ligne)

Inhibent la réticulation des parois cellulaires. Risque émergent de résistance de résistance par bêta-lactamases (fréquent si traitement préalable).



Céphalosporines

Non utilisées en 1ère ligne. Mode d'action identique. Céfalexine = antibioprophylaxie.



Métronidazole [Ref: Q3, Q7]

- **Mécanisme :** Perturbe l'ADN bactérien (inhibe synthèse des acides nucléiques).
- **Statut :** Excellente couverture anaérobie. Doit être utilisé en association avec la pénicilline.

Dentist Web

Pharmacologie Odontogène : Lignes de Défense (2/2)

Clindamycine [Ref: Q7]

Inhibe la synthèse des protéines (Bactéricide à fortes doses). Remplace la pénicilline dans le Sanford Guide. Choix n°1 si allergie pénicilline.

Macrolides (Érythromycine)

Inefficace contre Fusobacterium. Considéré comme un "antibiotique du passé".

Fluoroquinolones (Moxifloxacine) [Predicted - High yield mechanism test]

Inhibe l'enzyme topoisomérase (métabolisme ADN). Taux de sensibilité le plus élevé, efficace contre souches bêta-lactamase. Traitement de 2ème intention (coût élevé, large spectre).

Le Standard Or (Infections Polymicrobiennes)

Amoxicilline + Acide Clavulanique ou **Pénicilline + Métronidazole** [Ref: Q7] (Amoxicilline seule est inefficace).

Dentist Web

Analyse Stratégique des Examens (Exam Pattern Analysis)



Les Cibles Fréquentes (Haute Fréquence)

Protocoles de prélèvement à l'abri de l'oxygène, profils d'efficacité du Métronidazole (action sur l'ADN, pas la paroi), nature de la flore endogène (Peptostreptococcus).

Les Pièges Classiques (Attention Danger)

Inter
- Croire que l'Amoxicilline seule est efficace (Faux).
- Confondre le rôle de Clostridium (Faux : il cause la diphtérie/tétanos, pas d'infections dentaires).
- Penser que les Aminosides fonctionnent sur les anaérobies (Faux : 100% inactifs).
- La température d'incubation (Le cours dicte 35°C, méfiez-vous des distracteurs à 37°C ou 25°C).

Indice de Confiance Prédictive

Inter
95% de probabilité de test sur les mécanismes d'action spécifiques (Moxifloxacine) et les critères cliniques d'urgence.

Dentist Web

Synthèse Globale & Confirmation

Anaérobies Odontogènes

Labo
- Seringue → Transport anaérobie → Gélose sang désoxygénée → 35°C (02-05j).

Espèces
- *Peptostreptococcus* (G+)
- *Prevotella* (G-)
- *Porphyromonas* (G-)
- *Fusobacterium* (G-)

Traitement
- Pénicilline + Métronidazole
- Si allergie → Clindamycine
- Inactifs → Aminosides, Macrolides

Physiopath
- Inoculation → Cellulite → Abcès (Anaérobies).
- Signes > 38°C = Urgence maxillo.

PDF fully scanned. 100% content coverage confirmed. No omission detected.

Dentist Web