

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения
МУКАЛТИН-ЛекТ.

Торговое наименование: Мукалтин-ЛекТ

Источник получения препарата: Алтея лекарственного травы экстракт
сухой

Лекарственная форма:

Таблетки

Состав:

1 таблетка содержит:

Активное вещество: Мукалтин (Алтея лекарственного травы экстракт сухой)
экстракт сухой с содержанием суммы полисахаридов в пересчете на глюкозу
18 % - 50 мг.

Вспомогательные вещества: кислота винная - 160 мг; натрия гидрокарбонат
- 87 мг; кальция стеарат - 3 мг.

Описание

Таблетки круглой формы плоскоцилиндрические с фаской и риской с одной
стороны, от светло-серого до коричневатого-серого цвета, с вкраплениями
более темных или светлых частиц.

Фармакотерапевтическая группа

Отхаркивающее средство растительного происхождения.

Код АТХ R05CA10

Фармакологические свойства

Мукалтин представляет собой смесь полисахаридов из травы алтея
лекарственного, обладает отхаркивающими свойствами. Благодаря
рефлекторной стимуляции усиливает активность мерцательного эпителия и

перистальтику дыхательных бронхиол в сочетании с усилением секреции бронхиальных желез.

Показания для применения

Острые и хронические заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем с образованием трудноотделяемой мокроты повышенной вязкости (в т.ч. трахеобронхит, обструктивный бронхит, бронхоэктазы, пневмония) – в составе комплексной терапии.

Противопоказания для применения

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; детский возраст до 12 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно по рекомендации врача.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 12 лет внутрь по 1-2 таблетки 2-3 раза в день перед едой. Курс лечения в среднем 7-14 дней.

Побочные действия

Аллергические реакции, диспепсические явления.

Симптомы передозировки, меры по оказанию помощи при передозировке

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Мукалтин можно назначать одновременно с другими препаратами, применяемыми при лечении бронхолегочных заболеваний.

Мукалтин не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другие противокашлевые лекарственные средства, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты.

Особые указания

Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности,

требуемыми повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Таблетки.

По 10 таблеток в контурную безъячейковую упаковку из бумаги с полимерным покрытием или в гибкую упаковку из многослойных комбинированных материалов «Буфлен».

По 3, 5 или 10 контурных безъячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

По 600 контурных безъячейковых упаковок с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую упаковку.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре от 8 до 15°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта врача.

Производитель/ Претензии от покупателей принимает предприятие - производитель:

ОАО «Тюменский химико-фармацевтический завод»

Россия, 625005, г. Тюмень, ул. Береговая, 24.

Тел./факс: (3452) 46-14-86

Генеральный директор ОАО

«Тюменский химико-фармацевтический завод»



Н.Е. Морев