



ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ФУРАЦИЛИН-ЛекТ

Регистрационный номер: ЛП-001734

Торговое наименование: Фурацилин-ЛекТ

Международное непатентованное наименование: нитрофурал

Химическое наименование: 5-Нитрофурфурола семикарбазон

Лекарственная форма:

Таблетки для приготовления раствора для местного и наружного применения.

Состав:

1 таблетка содержит:

Активное вещество: нитрофурал – 20 мг.

Вспомогательное вещество: натрия хлорид – 800 мг.

Описание

Таблетки желтого или зеленовато-желтого цвета с неравномерной окраской поверхности, плоскоцилиндрической формы.

Фармакотерапевтическая группа

Противомикробное средство - нитрофуран.

Код АТХ D08AF01

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Противомикробное средство, производное нитрофурана. Бактериальные флавопротеины, восстанавливая 5-нитрогруппу, образуют высокореактивные аминопроизводные, способные вызывать конформационные изменения белков (в т.ч. рибосомальных) и др. макромолекул, приводя к гибели бактерий. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных

бактерий (в т.ч. *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Escherichia coli*, *Clostridium perfringens*). Устойчивость развивается медленно и не достигает высокой степени.

Фармакокинетика

При местном и наружном применении всасывание незначительное. Проникает через гистогематические барьеры и равномерно распределяется в жидкостях и тканях. Основной путь метаболизма - восстановление нитрогруппы. Выводится почками и частично с желчью.

Показания к применению

Наружно: гнойные раны, пролежни, ожоги II-III степени, мелкие повреждения кожи (в том числе ссадины, царапины, трещины, порезы).

Местно: блефарит, конъюнктивит; остеомиелит, эмпиема придаточных пазух носа и плевры, острый тонзиллит, стоматит, гингивит.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к нитрофуралу, производным нитрофурана и/или другим компонентам препарата, кровотечение, аллергодерматозы, выраженные нарушения функции почек.

Меры предосторожности при применении

Перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом!

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Данных о возможном негативном влиянии препарата на здоровье беременной женщины или ребенка – нет. Однако при беременности и в период грудного вскармливания применяют только после консультации с врачом, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

Способ применения и дозы

Местно, наружно. Для приготовления раствора 1 таблетку (20 мг) растворяют в 100 мл кипяченной или дистиллированной воды. Для более быстрого растворения рекомендуется кипящая или горячая вода. Затем раствор охлаждают до комнатной температуры.

Наружно - орошают раны и накладывают влажные повязки.

Местно: эмпиема придаточных пазух носа (в том числе при гайморите) - промывание полости; остеомиелит после операции - промывание полости с последующим наложением влажной повязки, эмпиема плевры - после удаления гноя проводят промывание плевральной полости и вводят 20-100 мл водного раствора. Блефарит, конъюнктивит - инстилляцией водного раствора в конъюнктивальный мешок. Острый тонзиллит, стоматит, гингивит - полоскание рта и горла по 100 мл 2-3 раза в день.

Продолжительность лечения — по показаниям в зависимости от характера и локализации пораженного участка.

Побочное действие

Аллергические реакции, дерматит, зуд кожи. Если любые из указанных побочных эффектов усугубляются, или отмечаются любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует немедленно сообщить об этом врачу.

Передозировка

Данных нет.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не изучалось.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Исследования влияния препарата на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами не проводились. Однако возможность того, что препарат имеет отрицательное влияние на данные функции, маловероятна.

Форма выпуска

Таблетки для приготовления раствора для местного и наружного применения 20 мг.

По 10 таблеток в контурной безъячейковой упаковке из бумаги с полимерным покрытием.

1, 2 контурные безъячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона коробочного.

Допускается помещать контурные безъячейковые упаковки вместе с соответствующим количеством инструкций по применению непосредственно в групповую упаковку.

Условия хранения

Хранить в сухом защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускается без рецепта врача.

Производитель

ОАО «Тюменский химико-фармацевтический завод», Россия

625005, г. Тюмень, ул. Береговая, д. 24

Тел/факс: (3452) 46-14-86

Организация, принимающая претензии от покупателей

ОАО «Тюменский химико-фармацевтический завод», Россия

625005, г. Тюмень, ул. Береговая, д. 24

Тел/факс: (3452) 46-14-86

Представитель

«Тюменский химико-фармацевтический завод»



А.И. Забелин

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП 001734- 15 08 17
СОГЛАСОВАНО

Прошито и пронумеровано и скреплено
печатью 4 листа(ов).
Должность, Генеральный директор
ФИО Кузнецов А.А.

(подпись)

М.П.

«06»

август

2017 года №3

