

# Oefeningen Numerieke Wiskunde

## Oefenzitting 9:

Iteratieve methoden voor het oplossen van stelsels lineaire vergelijkingen

### 1 Theorie

Beschouw het lineair stelsel

$$AX = B, \quad (1)$$

met  $A$  een  $n \times n$ -matrix en  $B$  en  $X$  kolomvectoren. Bij de methodes van Jacobi en Gauss-Seidel wordt iteratief een rij van vectoren  $X^{(0)}, X^{(1)}, X^{(2)}, \dots$  opgesteld, die hopelijk convergeert naar  $X$ .

De  $i$ -de vergelijking van het stelsel (1) is

$$a_{i,1}x_1 + \dots + a_{i,i-1}x_{i-1} + a_{i,i}x_i + a_{i,i+1}x_{i+1} + \dots + a_{i,n}x_n = b_i. \quad (2)$$

Lossen we deze vergelijking op naar  $x_i$ , dan krijgen we

$$x_i = \frac{b_i - \sum_{j \neq i} a_{i,j}x_j}{a_{i,i}} \quad (3)$$

Bij de methode van **Jacobi** berekenen we  $x_i^{(k+1)}$  door in het rechterlid van (3) de onbekende  $x_j$  te vervangen door de gekende  $x_j^{(k)}$  van de vorige stap

$$x_i^{(k+1)} = \frac{b_i - \sum_{j \neq i} a_{i,j}x_j^{(k)}}{a_{i,i}} \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (4)$$

De methode van **Gauss-Seidel** benut het feit dat men reeds beschikt over  $x_j^{(k+1)}$  met  $j < i$  op het moment dat men  $x_i^{(k+1)}$  wil berekenen

$$x_i^{(k+1)} = \frac{b_i - \sum_{j < i} a_{i,j}x_j^{(k+1)} - \sum_{j > i} a_{i,j}x_j^{(k)}}{a_{i,i}} \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (5)$$


We kunnen (4) en (5) in matrix notatie schrijven als respectievelijk

$$Dx^{(k+1)} = b - (L + U)x^{(k)},$$

en

$$Dx^{(k+1)} = b - Lx^{(k+1)} - Ux^{(k)},$$

waarbij we  $A$  schrijven als  $A = U + D + L$ . De matrix  $A$  wordt hierbij opgedeeld in zijn diagonaal  $D$  en de overblijvende benedendriehoek  $L$  en de bovendriehoek  $U$ .



Figuur 1: Jacobi en Gauss-Seidel, Probleem 4

## 2 Oefeningen

**Probleem 1.** Beschouw het stelsel

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 &= 1 \\ -x_1 + 2x_2 &= 2 \end{cases}$$

Illustreer voor dit stelsel grafisch de methodes van Jacobi en Gauss-Seidel met de startvector

$$X^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Teken hiervoor de twee rechten van het stelsel en bepaal grafisch de iteratiepunten  $X^{(1)}, X^{(2)}, \dots$ . Convergeren de methodes? Welke is de snelste? Wat gebeurt er indien beide vergelijkingen verwisseld worden?

**Probleem 2.** Stel  $E^{(k)} = X^{(k)} - X$  de foutenvector in de  $k$ -de stap, bewijs dan dat

$$E^{(k)} = GE^{(k-1)}, \quad \text{met} \quad \begin{cases} G = -D^{-1}(U + L) & \text{voor Jacobi} \\ G = -(L + D)^{-1}U & \text{voor Gauss-Seidel} \end{cases}$$

**Probleem 3.** De spectraalradius van een matrix  $A$  wordt gedefinieerd als  $\rho(A) = \max_i |\lambda_i(A)|$ , d.w.z. de spectraalradius is de modulus van de grootste eigenwaarde. Voor de convergentie van de methodes van Jacobi en Gauss-Seidel bestaan de volgende voorwaarden:

- $\|G\| < 1$  (voldoende voorwaarde voor convergentie),
- $\rho(G) < 1$  (nodige en voldoende voorwaarde voor convergentie).

Ga de convergentie van Jacobi en Gauss-Seidel na voor het stelsel uit Probleem 1 door  $\|G\|_\infty$  en  $\rho(G)$  te berekenen.

**Probleem 4.** Beschouw het stelsel

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 100 \\ 101 \end{bmatrix}.$$

Bereken opnieuw  $\|G\|_\infty$  en  $\rho(G)$  voor beide methodes. Wat besluit je over de convergentie? In Figuur 1 wordt de relatieve fout getoond voor beide methodes. Wat zijn de convergentiefactoren? Wat valt er op?