

“3º Testinho” - Solucionário - GAAL

18 de Junho de 2019

Em todas as questões abaixo deixe sempre explícito o seu raciocínio, não apenas a resposta correta.


Questão 1. Para cada equação abaixo, diga que tipo de cônica ele representa e faça um esboço dessa cônica.

a) $x = 9y^2$;

b) $4x^2 + 9y^2 = 36$;

c) $x^2 - \frac{y^2}{16} = -1$.

SOLUÇÃO:



onde a equação (c) é uma hipérbole, a equação (b) é uma elipse e a equação (a) é uma parábola.

Questão 2. Diga qual das equações abaixo descreve uma cônica rotacionada e qual descreve uma cônica transladada. Em seguida, apresente a matriz de rotação para a cônica rotacionada e o vetor de translação para a cônica transladada.

a) $9x^2 - 4xy + 6y^2 = 30$;

b) $4x^2 - 9y^2 - 8x - 36y = 76$.

SOLUÇÃO: A equação (a) descreve uma cônica rotacionada, devido à presença do termo xy . Ela pode ser reescrita como

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 9 & -2 \\ -2 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 30 \quad (*)$$

A matriz $\begin{pmatrix} 9 & -2 \\ -2 & 6 \end{pmatrix}$ possui como autovalores as soluções da equação

$$\det \begin{pmatrix} 9 - \lambda & -2 \\ -2 & 6 - \lambda \end{pmatrix} = 0$$

que se traduz em $(9 - \lambda)(6 - \lambda) - 4 = 0$, ou seja, $\lambda^2 - 15\lambda + 50 = 0$. Ou seja, os autovalores da matriz são da forma

$$\lambda = \frac{15 \pm \sqrt{225 - 200}}{2} = \frac{15 \pm 5}{2}$$

ou seja, $\lambda = 10$ e $\lambda = 5$ são os nossos autovalores.

Como os autovetores são as soluções não-triviais do sistema

$$\begin{pmatrix} 9 - \lambda & -2 \\ -2 & 6 - \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0,$$

podemos calcular os autovetores substituindo os autovalores obtidos acima, por exemplo $\lambda = 5$:

$$\begin{pmatrix} 9 - 5 & -2 \\ -2 & 6 - 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

ou seja, queremos achar as soluções do sistema

$$\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0.$$

Note, contudo, que as linhas da matriz são múltiplas uma da outra, e, portanto, qualquer uma delas nos dá todas as soluções: $W_1 = \{-2x + y = 0\}$, ou, visto de outra forma, $W_1 = \{y = 2x\}$. Escolhendo $v = (1, 2) \in W_1$, vemos que $\|v\| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$ e, portanto, podemos escolher o autovetor unitário $v_1 = (1/\sqrt{5}, 2/\sqrt{5})$ associado ao autovalor 5.

Como os autoespaços de uma matriz simétrica são ortogonais, podemos tomar $v_2 = (-2/\sqrt{5}, 1/\sqrt{5})$ e obter a matriz de rotação

$$P = (v_1 \ v_2) = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por fim, reescrevendo a equação (*) usando a matriz de autovalores e a matriz de rotação obtemos

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} P \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 10 \end{pmatrix} P^t \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 30$$

ou seja,

$$\begin{pmatrix} x' & y' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = 30,$$

donde $5x'^2 + 10y'^2 = 30$ (fazendo $(x', y') = P^t(x, y)$) e vemos que a cônica descrita por (a) está apenas rotacionada pela matriz de rotação P .

A equação (b), por sua vez, não possui o termo xy e, portanto, não está rotacionada. Para descobrirmos a translação, temos que completar quadrados:

$$\begin{aligned} 4x^2 - 9y^2 - 8x - 36y &= 76 \\ 4(x^2 - 2x) - 9(y^2 - 4y) &= 76 && \text{agrupando os termos com } x \text{ e } y \\ 4((x - 1)^2 - 1) - 9((y - 2)^2 - 4) &= 76 && \text{completando os quadrados} \\ 4(x - 1)^2 - 4 - 9(y - 2)^2 + 36 &= 76 && \text{distribuindo 4 e 9} \\ 4x'^2 - 9y'^2 &= 36 && \text{substituindo } (x', y') = (x - 1, y - 2) \end{aligned}$$

e vemos que o vetor translação é exatamente $T = (1, 2)$.

Questão 3. Dada a equação

$$13x^2 + 10xy - 22x + 13y^2 + 58y + 37 = 0$$

faça o que se pede:

- a) Reescreva equação acima em forma matricial.
- b) Encontre os autovalores e autovetores associados à parte de grau 2 da equação acima.
- c) Identifique a matriz de rotação associada a essa equação.
- d) Faça a mudança de coordenadas que diagonaliza a forma matricial obtida no item (a).
- e) Identifique a translação associada a essa equação.
- f) Faça uma translação de forma que a equação obtida no item (d) esteja na forma padrão.
- g) Identifique qual a cônica descrita pela equação.
- h) Faça um esboço dessa cônica.

SOLUÇÃO: Começamos re-escrevendo a equação na forma

$$\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 13 & 5 \\ 5 & 13 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + (-22 \ 58) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + 37 = 0. \quad (*)$$

Vamos agora diagonalizar a matriz $A = \begin{pmatrix} 13 & 5 \\ 5 & 13 \end{pmatrix}$. Para isso, vamos calcular os autovalores como sendo as soluções da equação

$$\det \begin{pmatrix} 13 - \lambda & 5 \\ 5 & 13 - \lambda \end{pmatrix} = 0,$$

ou seja, $(13 - \lambda)^2 - 25 = 0$, que podemos ainda re-escrever como

$$\lambda^2 - 26\lambda + 169 - 25 = \lambda^2 - 26\lambda + 144 = 0.$$

Sabemos, ainda, que as soluções dessa equação são da forma

$$\lambda = \frac{26 \pm \sqrt{26^2 - 4 \cdot 144}}{2} = \frac{26 \pm \sqrt{676 - 576}}{2} = \frac{26 \pm 10}{2},$$

ou seja, $\lambda_1 = 18$ e $\lambda_2 = 8$.

Com isso, podemos calcular os autoespaços W_1 e W_2 como sendo as soluções não-triviais da equação $(A - \lambda I)X = 0$ para cada valor de λ . Para λ_1 temos:

$$\begin{pmatrix} 13 - 18 & 5 \\ 5 & 13 - 18 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0,$$

ou seja,

$$\begin{pmatrix} -5 & 5 \\ 5 & -5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

que admite solução da forma $W_1 = \{-5x + 5y = 0\}$ ou seja, $W_1 = \{x = y\}$. Assim, podemos pegar o vetor $v_1 = (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}) \in W_1$ e ver que $\|v_1\| = \sqrt{(1/\sqrt{2})^2 + (1/\sqrt{2})^2} = \sqrt{1/2 + 1/2} = \sqrt{1} = 1$, ou seja, v_1 é um autovetor normal da matriz A associado ao autovalor 18.

Como A é simétrica, sabemos que $W_2 = W_1^\perp$ e, portanto, podemos simplesmente tomar $v_2 = (-1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$.

Claramente $\|v_2\| = 1$ (já que $\|v_2\| = \|v_1\|$) e $v_1 \perp v_2$ (por construção). Segue que $A = PDP^t$ onde $P = (v_1 \ v_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ e $D = \begin{pmatrix} 18 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$.

Com isso, vamos reescrever (*):

$$(x \ y) P D P^t \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + (-22 \ 58) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + 37 = 0$$

e, fazendo a mudança de coordenadas $(x \ y) P = (x' \ y')$ temos que $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = P^t \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ e, portanto, multiplicando à esquerda por P ambos os lados da equação acima, obtemos $P \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. Assim, obtemos

$$(x' \ y') D \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + (-22 \ 58) P \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + 37 = 0.$$

Antes de avançar, vamos calcular $(-22 \ 58) P$:

$$(-22 \ 58) P = (-22 \ 58) \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} (36 \ 80)$$

e escrever, finalmente,

$$(x' \ y') \begin{pmatrix} 18 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + 1/\sqrt{2} (36 \ 80) \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + 37 = 0. \quad (**)$$

Agora, obtemos a equação $18x'^2 + 8y'^2 + 36/\sqrt{2}x' + 80/\sqrt{2}y' + 37 = 0$ que podemos completar quadrados:

$$\begin{aligned} 18x'^2 + 8y'^2 + 36/\sqrt{2}x' + 80/\sqrt{2}y' + 37 &= 0 \\ (18x'^2 + 36/\sqrt{2}x') + (8y'^2 + 80/\sqrt{2}y') + 37 &= 0 && \text{agrupando } x' \text{ e } y' \\ 18(x'^2 + 2/\sqrt{2}x') + 8(y'^2 + 10/\sqrt{2}y') + 37 &= 0 && \text{colocando 18 e 8 em evidência} \\ 18((x' + 1/\sqrt{2})^2 - 1/2) + 8((y' + 5/\sqrt{2})^2 - 25/2) &= 0 && \text{completando os quadrados} \\ 18(x' + 1/\sqrt{2})^2 - 9 + 8(y' + 5/\sqrt{2})^2 - 100 + 37 &= 0 && \text{distribuindo 18 e 8} \\ 18x''^2 - 9 + 8y''^2 - 100 + 37 &= 0 && \text{fazendo } \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x' + 1/\sqrt{2} \\ y' + 5/\sqrt{2} \end{pmatrix} \\ 18x''^2 + 8y''^2 &= 72 && \text{fazendo as operações com números restantes} \end{aligned}$$

o que nos diz que fazendo a mudança de coordenadas $\begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x' + 1/\sqrt{2} \\ y' + 5/\sqrt{2} \end{pmatrix}$ podemos re-escrever (**) como

$$18x''^2 + 8y''^2 = 72. \quad (***)$$

Finalmente, dividindo ambos os lados por 72 obtemos

$$\frac{x''^2}{4} + \frac{y''^2}{9} = 1$$

e, portanto, concluímos que a equação (*) descreve uma elipse de semi-eixos 2 e 3.

Para esboçar a cônica, precisamos achar o quanto ela está rodada e transladada. Achar a rotação é fácil: Basta notar que $P = R_{45^\circ}$.

Para descobrir a translação, note que já sabemos o quanto o eixo (x'', y'') está transladado em relação ao eixo (x', y') : exatamente $(-1/\sqrt{2}, -5/\sqrt{2})$. Mas sabemos que $(x', y') = P^t(x, y)$, ou seja, a translação pode ser calculada como $P(-1/\sqrt{2}, -5/\sqrt{2})$:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ -5 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

o que nos dá uma translação de $T = (2, -3)$, e podemos esboçar nossa cônica:

