


LUMI⁰IS

KO'Z KLINIKASI



**Bizning manzil: Samarqand shahar
Rudakiy ko'chasi 217**



 **+998 99 598 10 10**

Chala tug'ilgan chaqaloqlar retinopatiyasi nima? Chaqaloqni Oftalmologga qachon tekshirtirish kerak?

ChTChR – chala tug'ilgan chaqaloqlarda ko'zning to'r pardasida avaskulyar (qon tomirlarsiz) zona bo'lishi hisobiga, qon tomirlarining anormal rivojlanishi (ya'ni, yangi qon tomirlar va fibrovaskulyar to'qima o'sishi) natijasida to'r pardaning ko'chishiga olib keladigan va uning natijasida ko'z nogironligi kelib chiqadigan og'ir kasallik hisoblanadi.

Normada homilada **12-16 haftalardan** boshlab ko'z to'r pardasida qon tomirlar rivojlana boshlaydi va **bu jarayon 38-40 haftagacha** davom etadi.

Ko'zning to'r pardasida qon tomir normal fiziologik shakllanish jarayonining buzilishi, to'r pardada qon tomirlarining burmalanishi, tomirli va tomirsiz qismlar o'rtasida **demarkatsion chiziqda** yangi qon tomirlar shakllanishiga olib keladi. Bu esa o'z navbatida ko'z to'r pardasining ko'z oldingi segmenti (gavhar orqa yuzasi) ga qarab fibrovaskulyar to'qimi o'sishi va shu hisobdan to'r parda tortilishi va ko'chishiga olib kelishi mumkin.

Bu kasallik muddatiga yetmay tug'ilgan chaqaloqlarda ko'p uchraydigan asoratlardan biri hisoblanadi. Kasallik asosan tug'ilgandan keyin **5-15 haftalar orasida** (shu davrda chaqaloq ko'z shifokori nazoratida turishi kerak) rivojlanishi mumkin, va shu davrlar orasida chaqaloq ko'z tubini okulist ko'rishi shart.

Kasallik 5 ta bosqichda kechadi. Bemorga tezkor davolanish va profilaktik chora tadbirlar o'z vaqtida olib borilmasa, unda bir umrlik qaytmas og'ir ko'z nogironligiga olib kelishi mumkin.
Skrining 4-5 oy davom etadi.


Neovaskulyarizatsiyaga sababchi faktor **VEGF** (Vascular endothelial growth factor-endothelial qon tomir o'sish omili) gipoksiyaga uchragan to'r parda to'qimasi tomonidan ishlab chiqariladi.

Kasallik xavf guruhiga kiruvchi omillar:

- Og'irligi **2000g** dan kam tug'ilgan;
- Homila muddati **35 xaftadan** kichik;
- Homiladorlikda homilaning rivojlanishdan orqada qolishi;
- Chaqaloqning uzoq muddat kislorod qabul qilishi;
- Ko'p homiladorlik.

Davolash: Bemor ko'rish qobiliyatini saqlashning asosiy zvenosi - kasallik boshlang'ich fazalarida **anti-VEGF terapiya** (intravitreal ineksiya-neovaskulyarizatsiyani to'xtatish) o'tkazish hisoblanadi.

Sog'lom ko'z
to'r pardasi



ChTChR ko'z
to'r pardasi

**Siz farzandizgizni yorug' dunyoni ko'rishiga befarq bo'lmang,
zero u ko'rishga hamma qatori haqlidir!!!**