



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS 2020



Modul Pembelajaran SMA

BIOLOGI





MUTASI PADA MAHLUK HIDUP BIOLOGI KELAS XII

PENYUSUN Drs. MUNAWIR SMA NEGERI 8 BEKASI

DAFTAR ISI

PE	NYUSUN	2
DA	AFTAR ISI	3
GL	OSARIUM	4
PE	TA KONSEP	5
PE	NDAHULUAN	6
A.	Identitas Modul	6
B.	Kompetensi Dasar	6
C.	Deskripsi Singkat Materi	6
D.	Petunjuk Penggunaan Modul	6
E.	Materi Pembelajaran	7
KE	GIATAN PEMBELAJARAN 1	8
Μl	UTASI DAN JENIS-JENIS MUTASI	8
A.	Tujuan Pembelajaran	8
B.	Uraian Materi	8
C.	Rangkuman	155
D.	Penugasan Mandiri	15
E.	Latihan Soal	155
F.	Penilaian Diri	188
KE	EGIATAN PEMBELAJARAN 2	19
PE	NYEBAB MUTASI	19
A.	Tujuan Pembelajaran	19
B.	Uraian Materi	19
C.	Rangkuman	27
D.	Latihan Soal	28
E.	Penilaian Diri	311
EV	ALUASI	322
DA	AFTAR PUSTAKA	35

GLOSARIUM

Gen : Satuan informasi genetik yang terdiri atas suatu urutan

nukleotida spesifik dalam DNA(atau RNA, pada beberapa

Virus)

Kromosom : Pembawa sifat menurun yang terdapat dalam inti sel,

perkembangan dari kromatin, dan akan tanpak pada saat sel

akan membelah.

Mutasi : Peristiwa perubahan bahan genetik (DNA) dari suatu

organisme yang bersifat menurun


Nukleotida : Suatu satuan monomer yang terdiri dari satu gula, satu basa

nitrogen dan satu fosfat

Replikasi : Kemampuan DNA membentuk DNA baru yang sama persis

dengan DNA asal.

PETA KONSEP



PENDAHULUAN

A. Identitas Modul

Mata Pelajaran : BIOLOGI Kelas : XII Alokasi Waktu : 4 IP

Judul Modul : MUTASI PADA MAHLUK HIDUP

B. Kompetensi Dasar

3.8 Menganalisis peristiwa mutasi pada makhluk hidup.

4.8 Menyajikan data hasil eksplorasi peristiwa mutasi yang menyebabkan variasi dan kelainan sifat pada makhluk Hidup.

c. Deskripsi Singkat Materi

Salam Biologi, tetap semangat dalam belajar ya, selalu menjadi bagian dari generasi emas bangsa Indonesia . Masih ingatkah kalian dengan materi Keanekaragaman Makhluk Hidup ? Ya benar, keanekaragaman itu disebabkan oleh adanya variasi pada makhluk hidup baik pada tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Mutasi merupakan salah satu penyebab terjadi variasi makhluk hidup. Dalam modul ini kalian akan mempelajari tentang "Mutasi Gen"Pada modul ini kalian akan mempelajari pengertian Mutasi, jenis Mutasi timgkat Gen, dan perbedaan urutan asam amino pada dengan hemoglobin penderita siklemia akibat mutasi gen. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dalam modul ini kami berharap kalian mampu menguasai kompetensi sesuai dengan yang diharapkan. Manfaat terbesar dari kegaitan pembelajaran modul kali ini, kalian akan lebih mensyukuri atas rahmat yang telah diberikan Allah swt dengan menjaga apa yang telah dianugerahkan agar senantiasa terpelihara dengan baik.

D. Petunjuk Penggunaan Modul

Modul ini berisi kegiatan-kegiatan belajar yang disajikan dalam bentuk paparan yang memuat materi, latihan, rangkuman, dan penilaian diri.

Pada bagian Uraian Materi merupakan paparan sejumlah pengetahuan yang akan membekali kalian untuk menguasai kompetensi yang dikemas dalam satu satuan aktivitas belajar dalam rangka mempermudah kalian menguasai kompetensi yang diharapkan. Di bagian Latihan kalian akan melakukan kegiatan atau tugas yang bertujuan untuk memperkuat penguasaan kompetensi yang diharapkan. Sementara itu di bagian rangkuman , kalian akan mendapatkan informasi mengenai garis besar materi pada kegiatan belajar yang baru saja kalian pelajari.

Untuk mengetahui sejauh mana kalian telah menguasai materi dan keterampilan yang kalian pelajari, kalian akan melakukan kegiatan Penilain Diri. Pada bagian akhir modul ini disajikan Tes Akhir yang dapat kalian gunakan untuk menguji kemampuan kalian dalam menguasai kompetensi yang diharapkan apakah sudah tercapai atau

belum. Sikap jujur sangat diharapkan ketika kalian melakukan kegiatan ini dari awal sampai akhir.

E. Materi Pembelajaran

Modul ini terbagi menjadi **2** kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat uraian materi, contoh soal, soal latihan dan soal evaluasi.

Materi pokok yang dibahas dalam modul ini terdiri dari:

Pertama: Pengertian dan jenis jenis mutasi.

Kedua : Penyebab mutasi

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1 MUTASI DAN JENIS-JENIS MUTASI

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan dapat:

- 1. Menjelaskan berbagai macam mutasi dan penyebabnya.
- 2. Menganalisis peristiwa mutasi pada kromosom dan gen.

B. Uraian Materi

Mutasi didefinisikan sebagai suatu perubahan yang bersifat mendadak dan bersifat menurun sebagai akibat penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan. Dalam teori evolusi, proses mutasi merupakan "bahan bakuâ€② yang menyebabkan terjadinya variasi-variasi gen dari makhluk hidup. Adanya variasi-variasi genetik dari makhluk hidup menyebabkan bentuk makhluk hidup tidak tetap dari waktu ke waktu.

Mutasi pertama kali dikemukakan oleh **Seth Wright** (1870) yang melihat adanya kelainan pada kaki domba yang lebih pendek dari kaki domba lainnya, kelainan ini diturunkan kepada keturunannya. Selanjutnya, **Hugo de Vries** (1901) dalam bukunya "The Mutation Theoryâ€② mengenalkan istilah Mutasi. Dilanjutkan oleh **Thomas Hunt Morgan** (1910) dalam penelitiannya menemukan adanya lalat buah (*Drosophilla melanogaster*) yang bermata putih dan bermata merah. Kemudian, Herman Joseph Muller berhasil melakukan mutasi buatan dengan menggunakan sinar X. Proses terjadinya mutasi dikenal dengan istilah mutagenesis, sedangkan organisme yang mengalami perubahan tersebut dikenal dengan istilah mutan. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya mutasi disebutkan **mutagen**. Makhluk hidup yang mengalami mutasi disebut **mutan**.

Syarat terjadinya mutasi adalah:

- 1. Adanya perubahan pada materi genetik
- 2. Perubahan tersebut bersifat dapat atau tidak dapat diperbaiki
- 3. Hasil perubahan tersebut diwariskan secara genetik pada keturunan berikutnya.

Mutasi terjadi pada frekuensi rendah di alam, biasanya lebih rendah daripada 1:10.000 individu. Mutasi di alam dapat terjadi akibat zat pembangkit mutasi (**mutagen**, termasuk karsinogen), radiasi surya maupun radioaktif, serta loncatan energi listrik seperti petir. Individu yang memperliatkan perubahan sifat (fenotipe) akibat mutasi disebut **mutan**. Dalam kajian genetik, mutan biasa dibandingkan dengan individu yang tidak mengalami perubahan sifat (individu *tipe liar* atau "wild type"). Karakter mutan antara lain:

- Gen yang mengalami mutasi pada suatu individu, biasanya adalah gen resesif, sehingga dalam keadaan homozigot karakter perubahannya belum dapat dilihat.
- Gen yang mengalami mutasi umumnya bersifat lethal, sehingga jumlah makhluk hidup yang mengalami mutasi tampak sedikit.
- Individu yang mengalami mutasi biasanya mati sebelum dilahirkan atau sebelum dewasa.

Berdasarkan sel yang bermutasi ada 2 jenis mutasi yaitu:

1. Mutasi somatik

Mutasi somatic adalah mutasi yang terjadi pada sel somatik, yaitu sel tubuh seperti sel kulit. Mutasi ini tidak akan diwariskan pada keturunannya. Mutasi somatis adalah mutasi yang terjadi pada sel soma . bila perubahan sel somatis demikian besar, sel-sel dapat mati. Dan, kalau dapat bertahan hidup memiliki kelainan atau tak berfungsi secara normal. Bila sel somatis tidak tidak meliputi daerah yang luas, yang kurang penting, tidak membahayakan. Tetapi bila meliputi daerah yang luas atau alat yang amat penting dapat membahayakan bahkan dapat mematikan.

Bila perubahan sel itu terjadi ketiak sel somatis sedang giat membelah seperti dalam embrio dapat mengakibatkan karakter abnormal waktu lahir, tetapi tidak diturunkan kepada generasi berikutnya. makin muda jaringan yang mengalami perubahan genetis makin luas akibat abnormalan yang ditimbulkannya sebliknya makin dewasa jaringan itu ketika mengalami keabnormalan dan dapt ditolerir. Dalam bidang pertanian mutasi vegetatif banyak dipakai untuk meninggikan produksi dan mutu, seperti terhadap apel . anggur dan jeruk. Dibuat perubahan induksi pada suatu cabang pohon dewasa (misalnya dengan colchicine). Lalu cabang distek atau dicangkok , dan dibiakkan secara vegetatif pula. Sedangkan secara alamiah perubahan vegetatif pada tumbuhan dapat menimbulkan beraneka warna (belang) pada endosperm (biji), daun dan mahkota bunga. Misalnya pada ercis dan bunga pukul 4 (Mirabilis jalapa)


2. Mutasi Gametik/Germinal

Mutasi germinal adalah mutasi yang terjadi pada sel gamet, yaitu sel organ reproduksi yang meliputi sperma dan ovum pada manusia. Karena terjadinya di sel gamet, maka akan diwariskan kepada keturunannya. Hal ini terjadi terdapat pada mahkluk hidup bersel banyak dan bukan yang bersel satu. Atau strukturnya yang lebih sederhana. Bila perubahan berlangsung pada gamet. maka akibat yang ditimbulkan begitu hebat dan gametpun segera mati. Selain itu terkaang menyebabkan gamet tidak mampu melakukan pembuahan dengan wajar. Oleh karena itu tak diteruskan pada keturunananya. Tetapi bila perubahan tidak begitu hebat dan gamet dapat melakukan pembuahan, terjadi generasi baru yang menerima perubahan bahan genetik tersebut.

Bila gonad terkena langsung radiasi atau diberi bahan kimia seperti gas murtad, maka kemungkinan besar mengalami perubahan genetis pada gamet, namun kalau radiasi terjadi pad bagian tubuh yang lain, bukan langsung ke gonad, suatu saat gonad menerima akibat radiasi secara tidak langsung itu. Bila radiasi menimbulkan ionisasi berantai pada jaringan dan akhirnya mencapai inti sel gamet. Makin dekat bagian tubuh yang kena radiasi ke gonad, makin besar kemungkinan gamet menerima perubahan genetis . sebaliknya semakin jauh bagian tubuh yang kena radiasi dari gonad ,makin kecil kemungkinan gamet menerima perubahan genetik itu.


Berdasarkan tempat mutasi bermutasi ada 2 jenis mutasi yaitu:

• Mutasi Kecil (point mutation) adalah perubahan yang terjadi pada susunan molekul gen (DNA) sedangkan lokus gennya tetap Mutasi jenis ini menimbulkan alela. Mutasi ini biasa disebut mutasi gen.



Gambar 1. Mutasi Gen sumber: https://www.edubio.info

 Mutasi besar (gross mutation) adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan susunan kromosom. Istilah khusus untuk mutasi kromosom adalah aberasi. Mutasi ini biasa disebut mutasi kromosom atau aberasi.



Gambar 2. Mutasi Kromosom sumber: www.edubio.info

Mutasi kromosom ini mengakibatkan perubahan sejumlah basa yang berdampingan pada rantai DNA atau perubahan runtunan nukleotida dalam suatu ruas gen sehingga akibat yang ditimbulkan pada fenotip individu menjadi lebih nyata. Mutasi kromosom sering terjadi karena kesalahan meiosis. Mutasi kromosom dibedakan menjadi dua yaitu, perubahan jumlah kromosom dan perubahan struktur kromosom.

Perubahan jumlah kromosom dapat dibedakan menjadi aneuploidi (penambahan atau pengurangan satu atau beberapa kromosom) dan euploidi (penambahan atau pengurangan set kromosom).

a) Euploidi

Euploidi adalah perubahan pada set kromosom pada tingkat ploidi. Individu normal (wild type) memiliki genom 2n (diploid). Namun mutasi dapat mengakibatkan terjadinya perubahan pada tingkat ploidi sehingga menjadi 3n (triploid), 4n (tetraploid), dan banyak n (poliploid). Banyak tumbuhan budiaya yang telah dimutasikan sehingga menghasilkan tumbuhan poliploid yang memiliki sifat unggul. Namun penambahan set kromosom pada hewan dan manusia biasanya akan menimbulkan kematian sebelum lahir karena metabolisme yang tidak seimbang.


Tabel perubahan genom pada euploidi

Euploidi	Formula Kromosom	Perangkat Kromosom
Monoploid	n	ABC
Diploid	2n	AA BB CC
Triploid	3n	AAA BBB CCC
Tetraploid	4n	AAAA BBBB CCCC
Pentaploid	5n	AAAAA BBBBB CCCCC
dst 6n		AAAAAA BBBBBB CCCCCC

b) Aneuploidi

Aneuploidi merupakan mutasi kromosom yang tidak melibatkan perubahan pada seluruh genom, tetapi terjadi hanya pada salah satu kromosom dari genom. Aneuploidi terjadi karena beberapa hal, diantaranya:

- *Anafase Lag*, yaitu peristiwa tidak melekatnya kromatid pada gelendong pada proses anaphase meiosis I.
- Nondisjunction, yaitu peristiwa gagal berpisahnya kromosom homolog pada proses anafase dari meiosis I atau II . Pada peristiwa gagal berpisah, terdapat pasangan kromosom homolog dan pasangan kromatid yang melekat satu sama lain, tidak berpisah. Akibatnya terdapat gamet abnormal dengan kromosom berlebih dan kurang.



Gambar 3. Mutasi Kromosom sumber: www.edubio.info

Aneuploidi pada manusia dapat terjadi pada sel telur diantaranya:

- *Digini* adalah dua inti sel telur yang tetap terlindung satu plasma dan selanjutnya dibuahi satu sperma, yang sering terjadi karena kegagalan sel kutub (polosit) memisah.
- *Diandri* adalah satu sel telur yang dibuahi satu sperma, yang sering pada terlambatnya pembuahan. Seseorang yang mengalami aneuploidi umumnya berumur pendek, di samping itu pada sel-sel soma yang mengalami kanker juga dapat terjadi peristiw aneuploidi.


Bentuk-bentuk peristiwa aneuploid berakhiran dengan somi, sehingga aneuploid disebut juga dengan *aneusomi*. Jumlah kromosom aneuploidi antara lain sebagai berikut:

- 1. Monosomik (2n-1); yaitu mutasi karena kekurangan satu kromosom.
- 2. Nullisomik (2n-2); yaitu mutasi karena kekurangan dua kromosom.
- 3. Trisomik (2n + 1); yaitu mutasi karena kelebihan satu kromosom.
- 4. Tetrasomik (2n + 2); yaitu mutasi karena kelebihan dua kromosom..

Aneuploidi pada manusia dapat menyebabkan beberapa kelainan antara lain:

1) Sindrom Klinefelter

kariotipe (22 AA+XXY) ditemukan oleh H. F. Klinefelter, mengalami trisomik pada kromosom gonosom. Penderita Sindrom Klinefelter berjenis kelamin laki-laki, namun testisnya tidak berkembang (testicular disgenesis) sehingga tidak bisa menghasilkan sperma (aspermia) dan mandul (gynaecomastis) serta payudaranya tumbuh.




Gambar 4. Mutasi Kromosom pada sindrom Klinefelter sumber: www.edubio.info

2) Sindrom Patau

Dengan kariotipe (45A+XX/XY), ditemukan oleh K. Patau pada tahun 1960. Sindrom ini disebabkan trisomik pada kromosom autosomnya mengalami kelainan pada kromosom nomor 13, 14, atau 15. Penderita Sindrom patau memiliki mata serius, kerusakan pada otak dan peredaran darah serta langit-langit mulut yang terbelah, Bayi


yang mengalami Sindrom Patau jarang bertahan hidup lebih dari satu tahun.



Gambar 5. Mutasi Kromosom pada sindrom Patau sumber: www.edubio.info

3) Sindrom Turner,

Dengan kariotipe (22AA+X0) ditemukan oleh H. H. Turner pada tahun 1938. Jumlah kromosomnya 45 dan kehilangan 1 kromosom kelamin. Penderita Sindrom Turner berjenis kelamin wanita. Meskipun penderitanya memiliki jenis kelamin wanita, ia tidak memiliki ovarium yang sempurna, steril (mandul), ciri seksualnya tidak berkembang, dan cenderung lebih pendek arena terdapat kekurangan pada kromosom nomor 23.



Gambar 6. Mutasi Kromosom pada sindrom Turner sumber: www.edubio.info


4) Sindrom Jacobs

Kariotipe (22AA+XYY), trisomik pada kromosom gonosom. Penderita sindrom ini umumnya berwajah kriminal, suka menusuknusuk mata dengan benda tajam, seperti pensil,dll dan juga sering berbuat kriminal. Penelitian di luar negeri mengatakan bahwa sebagian besar orang-orang yang masuk penjara adalah orang-orang yang menderita Sindrom Jacobs.

5) Sindrom Edward,

Kariotipe (45A+XX/XY), trisomik pada autosom. Autosom mengalami kelainan pada kromosom nomor 18. Sindrom ini


ditemukan oleh I . H . Edwards tahun 1960 . Penderita sindrom ini mempunyai tengkorak lonjong, bahu lebar pendek, telinga agak ke bawah dan tidak wajar.



Gambar 7. Mutasi Kromosom pada sindrom Edward sumber: www.edubio.info

6) Sindrom down

Dengan mempunyai karotipe 2n+1 (45A+XX atau 45A+XY) . susunan kromosonya mengalami trisomi pada autosom , yaitu kromosom nomor 21 . Pengaruhnya menyebabkan pertumbuhan mental terhambat dan berkurangnya ketahanan terhadap infeksi . Ciri-ciri penderita ini bermata sipit, kaki pendek, dan berjalan lambat.



Gambar 8. Mutasi Kromosom pada sindrom Down sumber: www.edubio.info

C. Rangkuman

- Mutasi adalah perubahan struktur materi genetik yang dapat diturunkan kepada generasi berikutnya jika terjadi pada sel gamet dan tidak diturunkan jika terjadi pada sel tubuh.
- 2. Berdasarkan tingkatan terjadinya, mutasi dibedakan menjadi dua, yaitu Mutasi gen dan Mutasi kromosom
- 3. Mutasi gen dapat dibagi menjadi dua kategori umum bedasarkan mekanisme perubahan susunan basa nukleotida yaitu subtitusi pasangan basa dan penambahan atau pengurangan pasangan basa. Salah satu contoh mutasi gen yang terjadi pada manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan fungsi akibat terbentuknya protein baru, yaitu kelainan sickle cell anemia. Gen penderita kelainan ini mengalami pergantian satu jenis basa dan menghasilkan ksalahan dalam susunan rantai polipeptida asam amino pada molekul hemoglobin.
- 4. Mutasi besar (*gross mutation*) adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan susunan kromosom. Mutasi ini biasa disebut mutasi kromosom atau aberasi, yang terdiri dari delesi, duplikasi, inversi, dan traslokasi.
- 5. Mutasi kromosom sering terjadi karena kesalahan meiosis. Mutasi kromosom dibedakan menjadi dua yaitu, perubahan jumlah kromosom dan perubahan struktur kromosom. Perubahan jumlah kromosom dapat dibedakan menjadi aneuploidi (penambahan atau pengurangan satu atau beberapa kromosom) dan euploidi (penambahan atau pengurangan set kromosom).

D. Penugasan Mandiri

Kerjakan semua soal di bawah ini di kertas, kemudian cocokan dengan alternatif penyelesaiannya!


- 1. Apa yang dimaksud dengan mutasi!
- 2. Jelaskan perbedaan mutan dan mutagen?
- 3. Apa yang dimaksud dengan mutasi gen?
- 4. Tuliskan 3 pengaruh yang ditimbulkan akibat subtitusi basa nukleotida pada untai DNA!
- 5. Jenis mutasi kromosom pada gambar berikut ini adalah!



E. Latihan Soal

- 1. Kita sering mendengar istilah Mutagenesis yang dimaksud dengan hal ini adalah
 - A. mutasi yang terjadi pada bentuk kromosom
 - B. peristiwa terjadinya mutasi
 - C. perubahan pada basa nitrogen
 - D. Faktor yang menyebabkan mutasi
 - E. mutasi yang terjadi pada fenotipe

- 2. Salah satu keuntungan mutasi yang dilakukan pada tumbuhan adalah dihasilkannya semangka tanpa biji. Jika dilihat dari kelestarian tumbuhan tersebut dapat merugikan, karena
 - A. tidak dapat melakukan pembelahan sel
 - B. tidak ada kromosom yang terbentuk
 - C. gagalnya proses nondisjunction
 - D. tidak dapat meneruskan keturunan sebab tidak ada sel-sel generatif
 - E. tidak adanya sel-sel vegetative
- 3. Berikut yang bukan merupakan faktor-faktor penyebab terjadinya mutasi kromosom adalah ...
 - A. depurisasi
 - B. delesi
 - C. duplikasi
 - D. translokasi
 - E. inversi
- 4. Semangka tanpa biji merupakan hasil mutasi. Hasil mutasi ini menghasilkan keturunan
 - A. tetrapoliploidi
 - B. autopoliploidi
 - C. diploidi
 - D. triploidi
 - E. poliploid
- 5. Perhatikan gambar berikut.



Gambar yang ditunjukkan X tersebut menunjukkan mutasi kromosom abrasi jenis

....

- A. inversi
- B. translokasi
- C. duplikasi
- D. katenasi
- E. delesi

Kunci jawaban dan pedoman penilaian

NO.	KUNCI	SKOR			
1.	В	Mutasi adalah perubahan struktur materi genetis pada tingkat gen maupun kromosom, yang diwariskan kepada generasi perikutnya (keturunannya). Mutagen adalah sejumlah zat penyebab terjadinya mutasi. Mutagenesis adalah proses terjadinya peristiwa mutasi. Mutan adalah organisme yang mengalami perubahan genetik akibat mutasi			
2.	D	Buah semangka tanpa biji merupakan salah satu hasil peristiwa mutasi yang memanfaatkan kolkisin sebagai mutagen. Dengan adanya kolkisin, pembentukan benang-benang spindel dari mikrotubulus pada fase anafase pembelahan mitosis atau meiosis akan terhambat. Akibatnya, gerakan kromatid ke kutub-kutub sel terhambat dan membentuk poliploidi. Poliploidi ini dimanfaatkan untuk memproduksi buahbuahan tanpa biji tetapi tidak dapat meneruskan keturunan			
3.	A	Mutasi kromosom adalah mutasi materi genetik yang dapat menyebabkan susunan kromosom berubah Perubahan susunan kromosom Perubahan kromosom dapat disebabkan oleh: Translokasi Translokasi, Duplikasi, Delesi, Duplikasi dan Inversi			
4.	Е	Buah semangka tanpa biji merupakan salah satu hasil peristiwa mutasi. Dengan adanya kolkisin, pembentukan benang-benang spindel dari mikrotubulus pada fase anafase pembelahan mitosis atau meiosis akan terhambat. Akibatnya, gerakan kromatid ke kutub-kutub sel terhambat dan membentuk poliploidi.			
5.	D	 Beberapa jenis aberasi kromosom, antara lain: Delesi yaitu hilangnya beberapa bagian dari lengan kromosom Inversi adalah mutasi yang terjadi selama meiosis kromosom terpilih dan terjadinya kiasma, maka terjadi perubahan letak atau kedudukan gen-gen. Duplikasi, yaitu terjadinya penambahan bagian lengan kromosom dari bagian kromosom itu sendiri Katenasi, yaitu perubahan kromosom akibat pasangan kromosom homolog kedua ujungnya saling melekat satu sama lain sehingga membentuk lingkaran Translokasi, yaitu perubahan kromosom yang berupa penambahan bagian lengan kromosom dari kromosom lain yang bukan homolog 			

Pedoman Penskoran

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$Nilai = \frac{\textit{Jumlah Skor Perolehan}}{\textit{Jumlah Skor Maksimum}} \times 100 \%$$

Konversi tingkat penguasaan:

90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

F. Penilaian Diri

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur dan bertanggungjawab!

No.	No. Pertanyaan			
01.	Apakah Anda telah dapat menjelaskan definisi mutasi dengan benar?	° Ya	C Tidak	
02.	Apakah Anda telah dapat menjelaskan macammacam mutasi berdasarkan tempat ternjadinya?			
03.	Apakah Anda dapat menganalisis macam mutasi tingkat gen dengan benar?			
04.	Apakah Anda telah dapat menganalisis mutasi berdasarkan sel yang bermutasi?	C Ya	C Tidak	
05.	Apakah Anda telah dapat menjelaskan akibat mutasi pada manusiai?	C Ya	C Tidak	

Bila ada jawaban "Tidak", maka segera lakukan review pembelajaran, terutama pada bagian yang masih "Tidak".

Apabila semua jawaban "YA" maka anda bisa melanjutkan

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2 PENYEBAB MUTASI

A. Tujuan Pembelajaran


Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya mutasi.

B. Uraian Materi

1. Perubahan struktur kromosom

Mutasi karena perubahan struktur kromosom berlangsung secara spontan, dan dapat juga dilakukan secara eksperimental dengan induksi bahan kimia atau radiasi. Perubahan ini umumnya dapat dilihat pada sel selama mitosis atau miosis. Beberapa hal yang menyebabkan perubahan struktur kromosom adalah sebagai berikut:


a. Delesi kromosom



Gambar 9. Delesi kromosom sumber: www. edubio.info


Delesi adalah mutasi akibat hilangnya dua atau lebih nukleotida yang berdampingan. Apabila rangkaian basa yang hilang merupakan suatu ruas yang lebih kecil dari panjang gen, maka gen tersebut akan bermutasi, tetapi bila rangkaian nukleotida yang hilang lebih besar dari ruas suatu gen, maka gen tersebut akan hilang dari kromosom.

Delesi dapat dibedakan menjadi beberapa macam antara lain sebagai berikut:
1) Delesi terminal, yaitu delesi yang kehilangan ujung segmen kromosom.




Gambar 10. Delesi terminal sumber: www. edubio.info

2) Delesi intertitial/interkalar, yaitu delesi yang kehilangan bagian tengah kromosom.




Gambar 11. Delesi interkalar Sumber: : www. edubio.info

3) Delesi cincin, yaitu delesi yang kehilangan segmen kromosom sehingga berbentuk lingkaran seperti cincin.




Gambar 12. Delesi cincin Sumber: : www. edubio.info

4) Delesi loop, yaitu delesi cincin yang membentuk lengkungan pada kromosom lainnya. Hal ini terjadi pada waktu meiosis, sehingga memungkinkan adanya kromosom lain (homolognya) yang tetap normal.



Gambar 13. Delesi loop Sumber: : www. edubio.info

Satu contoh delesi yang terkenal pada manusia adalah yang menimbulkan sindrom *Cri-du-chat*. Delesi peyebab timbulnya sindrom itu bersifat heterozigot. Delesi terjadi pada lengan pendek kromosom 5B. Teriakan para bayi pengidap sindrom ini terdengar seperti bunyi meong kucing. Sindrom itu juga ditandai dengan ukuran kepala yang kecil, abnormalitas pertumbuhan yang parah, serta adanya keterbelakangan mental. Para penderita biasanya meninggal pada masa bayi atau awal masa kanak-kanak sekaipun ada juga yang tetap hidup hingga dewasa.




Gambar 14. Sindrom *Cri-du-chat* karena delesi kromosom Sumber: : www. edubio.info

b. Duplikasi kromosom

Duplikasi adalah mutasi yang terjadi karena penambahan ruas kromosom atau gen dengan ruas yang telah ada sebelumnya. Sehingga, terjadi pengulangan ruas-ruas DNA dengan runtunan basa yang sama yang mengakibatkan kromosom mutan lebih panjang.

Contoh perubahan fenotip akibat proses duplikasi adalah gen bar pada Drosophila melanogaster. Penambahan gen pada kromosom lalat buah ini mengakibatkan peningkatan enzim tertentu yang menyebabkan ketidakseimbangan metabolisme.

.




Gambar 15. Duplikasi kromosom sumber: www. edubio.info

c. Inversi kromosom.

Inversi adalah perubahan urutan letak gen dalam suatu kromosom . Misalnya pada satu ruas kromosom terdapat urutan ruas ABCDEF, setelah inversi diperoleh ruas AEDCBF. Jadi, terjadi pemutaran ruas BCDE.

Inversi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: inversi parasentrik dan inversi perisentrik. *Inversi parasentris*, yaitu bila sentromer berada di luar ruas yang terbalik, sedangan *inversi perisentris*, yaitu bila sentromer terdapat dalam segmen yang berputar.




Gambar 16. Inversi kromosom sumber: www. edubio.info

d. Translokasi kromosom

Translokasi adalah mutasi yang terjadi akibat perpindahan ruas DNA (segmen kromosom) ke tempat yang baru, baik dalam satu kromosom atau antarkromosom yang berbeda.

Translokasi dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yakni sebagai berikut:

1) Translokasi tunggal, jika kromosom yang patah pada satu tempat, kemudian bagian yang patah tersebut bersambungan dengan kromosom lain yang bukan homolognya.



Gambar 16. Translokasi tunggal sumber: www.edubio


2) Translokasi perpindahan, terjadi jika kromosom patah di dua tempat dan patahannya bersambungan dengan kromosom lain yang bukan homolognya.



Gambar 17. Translokasi perpondahan sumber: www.edubio

3) Translokasi resiprok

Terjadi jika dua buah kromosom yang bukan homolognya patah pada tempat tertentu, kemudian patahan tersebut saling tertukar.



Gambar 18. Translokasi resiprok sumber: www.edubio


Translokasi resiprok dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:.

- Translokasi resiprok homozigot, yaitu translokasi homozigot ialah translokasi yang mengalami pertukaran segmen dua kromosom homolog dengan segmen dua kromosom non homolog.
- Translokasi resiprok heterozigot, yaitu translokasi heterozigot ialah translokasi yang hanya mengalami pertukaran satu segmen kromosom ke satu segmen kromosom nonhomolognya.
- Translokasi Robertson, yaitu translokasi Robertson ialah translokasi yang terjadi karena penggabungan dua romosom akrosentrik menjadi satu kromosom metasentrik. Peristiwa semacam ini dapat disebut juga fusion (penggabungan).

e. Isokromosom.

Isokromosom ialah mutasi kromosom yang terjadi pada waktu menduplikasikan diri, pembelahan sentromernya mengalami perubahan arah pembelahan sehingga terbentuklah dua kromosom yang masing-masing berlengan identik (sama). Dilihat dari pembelahan sentromer maka isokromosom disebut juga fision, jadi peristiwanya berlawanan dengan


translokasi Robertson (fusion) yang mengalami penggabungan.



Gambar 19. Isokromosom sumber: www.edubio

f. Katenasi

Katenasi adalah mutasi kromosom yang terjadi pada dua kromosom non homolog yang pada waktu membelah menjadi empat kromosom, saling bertemu ujung-ujungnya sehingga membentuk lingkaran.



Gambar 20. Katenasi sumber: www.edubio

2. Mutagen

Mutasi gen disebut juga **mutasi titik** (point mutation). Mutasi ini terjadi karena adanya perubahan struktur gen (DNA), akibatnya asam amino yang dikodekan berubah sehingga terbentuk protein yang salah.


Kejadian mutasi gen sangat jarang terlihat, hal ini disebabkan mutasi yang terjadi pada suatu gen tidak dapat menunjukan penampakannya, karena jumlah gen yang terdapat dalam satu individu banyak sekali yang bermutasi bersifat letal, sehingga gejala mutasi tidak dapat diamati sebab individu segera mati sebelum dewasa. Gen yang bermutasi umumnya bersifat resesif, sehingga selama dalam keadaan hetreozigot tidak akan terlihat.

Penyebab beberapa penyebab mutasi gen, antara lain:

- Delesi: hilangnya satu atau beberapa basa nitrogen.
- Addisi: penambahan satu atau beberapa basa nitrogen (sering disebut juga insersi).
- Substitusi: pertukaran pasangan basa nitrogen.


Jenis – jenis mutasi gen :

• Mutasi salah arti (missens mutation), yaitu perubahan suatu kode genetik umumnya pada posisi 1 dan 2 pada kodon) sehingga menyebabkan asam amino terkait (pada polipeptida) berubah. perubahan pada asam amino dapat menghasilkan fenotip mutan apabila asam amino yang berubah merupakan asam amino esensial bagi protein tersebut. jenis mutasi ini dapat disebabkan oleh peristiwa transisi dan transversi.




Gambar 21. Mutasi salah arti sumber: www.edubio

• Mutasi diam (silent mutation), yaitu perubahan suatu pasangan basa dalam gen (pada posisi 3 kodon) yang menimbulkan perubahan satu kode genetic tetapi tidak mengakibatkan perubahan atau pergantian asam amino yang dikode. mutasi diam biasanya disebabkan karena terjadinya mutasi transisi dan tranversi.



Gambar 21. Mutasi diam sumber: www.edubio

 Mutasi tanpa arti (nonsense mutation), yaitu perubahan kodon asam amino tertentu menjadi kodon stop . hampir semua mutasi tanpa arti mengarah pada inaktifnya suatu protein sehingga menghasilkan fenotip mutan . mutasi ini dapat terjadi baik oleh tranversi, delesi maupun insersi.



Gambar 22. Mutasi tanpa arti sumber: www.edubio

3. Faktor Penyebab Mutasi

Zat atau sesuatu yang menyebabkan mutasi disebut dengan mutagen. Macammacam penyebab mutasi dapat di bedakan sebagai berikut:

- 1) Mutasi alami (mutasi spontan)
 - Mutasi spontan adalah perubahan yang terjadi secara alamiah atau dengan sendirinya. Diduga faktor penyebabnya adalah panas, radiasi sinar kosmis, batuan radioaktif, sinar ultraviolet matahari, radiasi dan ionisasi internal mikroorganisme serta kesalahan DNA dalam metabolisme.
- 2) Mutasi buatan

Mutasi buatan adalah mutasi yang disebabkan oleh usaha manusia, antara lain dengan :

- a. Pemakaian bahan radioaktif untuk diagnosis, terapi, deteksi suatu penyakit, sterilisasi dan pengawetan makanan.
- b. Penggunaan senjata nuklir.
- c. Penggunaan roket dan televise.

Mutagen merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya mutasi. Mutagen dibagi menjadi 3, yaitu:

- Mutagen bahan kimia, contohnya adalah kolkisin dan zat digitonin. Kolkisin adalah zat yang dapat menghalangi terbentuknya benang-benang spindel pada proses anafase dan dapat menghambat pembelahan sel pada anafase.
- Mutagen bahan fisika, contohnya sinar ultraviolet, sinar radioaktif, dan sinar gamma. Sinar ultraviolet dapat menyebabkan kanker kulit.
- Mutagen bahan biologi, diduga virus dan bakeri dapat menyebabkan terjadinya mutasi. Bagian virus yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi adalah DNA-nya.

4. Pemanfaatan Mutasi

Pemanfaatan mutasi dibedakan menjadi dua yaitu pemanfaatan yang menguntungan dan pemanfaatan yang merugikan. Beberapa contoh pemanfaatan mutasi yang menguntungkan antara lain:

1) Terapi sel-sel tumor Aplikasi radiasi sinar mengion (dikenal sebagai radioterapi , seperti penyinaran dengan sinar X) dan kemoterapi untuk menghambat

perkembangan sel-sel tumor dan kanker.

2) Pemuliaan

- Radiasi sinar mengion, seperti sinar gamma dari Co-60, atau terhadap beberapa kemikalia, seperti EMS dan DS, digunakan untuk mengubah susunan basa nitrogen pada DNA atau untuk menyebabkan mutasi segmental dan harapannya sel yang akan mengalami mutasi akan menguntungkan. Cara pemuliaan kebanyakan dilakukan terhadap tanaman hortikultura, seperti tanaman sayuran dan tanaman hias (ornamental).
- 3) Zat kimia seperti digitonin igundan kolkisin dakan untuk mendapatkan benih yang bersifat unggul seperti gandum, tomat, dan kol poliploidi.
- 4) Tanaman Poliploidi dianggap menguntungkan karena memiliki buah besar, tidak berbiji, dan produktivitasnya tinggi.



Gambar 23. Pemuliaan tanaman sumber: Slideshare.com

Dampak mutasi yang merugikan antara lain:

- 1) Terjadi mutasi gen menyebabkan beberapa kelainan pada manusia antara lain sindrom turner, sindrom down, albino.
- 2) Penggunaan sinar radioaktif pada proses mutasi dapat meneyebabkan tumbuhnya sel kanker dan cacat bawaan pada janin dalam rahim.
- 3) Pemberian insektisida yang tidak sesuai dosisnya dapat mengakibatkan mutasi pada hama sehingga akan mengalami peledakan hama dalam jumlah besar untuk merusak tanaman.

C. Rangkuman

1. Penyebab mutasi kromoson karena perubahan struktur kromosom berlangsung secara spontan, dan dapat juga dilakukan secara eksperimental dengan induksi bahan kimia atau radiasi. Perubahan ini umumnya dapat dilihat pada sel selama mitosis atau miosis. Beberapa penyebabnya antara lain: delesi kromosom, duplikasi kromosom, inversi kromosom, traanslokasi kromosom, isokromosom dan katenasi.

- 2. Penyebab mutasi gen terjadi karena adanya perubahan struktur gen (DNA), akibatnya asam amino yang dikodekan berubah sehingga terbentuk protein yang salah. Penyebabnya antara lain: delesi, addisi, dan subtitusi.
- 3. Mutasi terjadi karena faktor alami maupun buatan, sedangkan penyebab mutasi (mutagen) terdiri dari mutagen kimia, mutagen fisik, dan mutagen biologi.
- 4. Pemanfaatan mutasi dibedakan menjadi dua yaitu pemanfaatan yang menguntungan dan pemanfaatan yang merugikan. Beberapa contoh pemanfaatan mutasi yang menguntungkan misalnya: terapi sel tumor, pemuliaan tanaman, dan tanaman poliploidi.

D. Latihan Soal

- 1. Mutasi gen dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut, yaitu
 - A. depurinasi, translokasi, inversi
 - B. dimer timin, depurinasi, inversi
 - C. deaminasi, depurinasi, inversi
 - D. translokasi, delesi, duplikasi
 - E. depurinasi, deaminasi, dimer timin
- 2. Apabila kita melihat seseorang yang berkariotipe 47 XXY atau 44A+XXY maka hal ini mengalami kelainan yang disebut
 - A. sindrom Jacobs
 - B. sindrom Patau
 - C. sindrom Turner
 - D. sindrom Klinefelter
 - E. sindrom Edwards
- 3. Berikut yang dapat dikelompokkan dalam mutagen fisika, adalah
 - A. DDT, sinar, sinar
 - B. fumigant, DDT, gliserol
 - C. gliserol, formaldehida, pestisida
 - D. fumigant, formaldehida, sinar
 - E. sinar kosmis, sinar gamma, ultraviolet
- 4. Apabila kita melihat seseorang yang memiliki ciri ciri seperti pada gambar terjadi karena kelebihan satu kromosom, tepatnya pada kromosom nomor



- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 21
- E. 22

- 5. Pada umumnya orang lebih menyukai mengkonsumsi semangka tanpa biji dibandingkan semangka berbiji. Semangka tanpa biji merupakan contoh mutasi karena jumlah kromosomnya lebih dari dua genom. Berdasarkan haltersebut, mutasi adalah....
 - A. berubahan komposisi set kromosom
 - B. perubahan autosom dan gonosom
 - C. perubahan kromosom di dalam gen
 - D. perubahan ukuran kromosom
 - E. perubahan gen dalam kromosom

Kunci jawaban dan pedoman penilaian

NO.	KUNCI	SKOR
1.	E	 Penyebab beberapa penyebab mutasi gen, antara lain: Delesi: hilangnya satu atau beberapa basa nitrogen. Addisi: penambahan satu atau beberapa basa nitrogen (sering disebut juga insersi). Substitusi: pertukaran pasangan basa nitrogen.
2.	D	Sindrom Klinefelter adalah kelainan genetik yang disebabkan oleh adanya salinan kromosom X tambahan. Sindrom klinefelter disebabkan oleh adanya salinan kromosom seks X tambahan. Kondisi ini terjadi pada laki-laki, terjadi secara acak, dan tidak diturunkan. Laki-laki yang mengalami sindrom Klinifelter klasik akan memiliki kromosom 47 XXY
3.	Е	Mutagen Fisika, mutagen yang disebabkan oleh radiaksi peng - ion dan bukan peng - ion, contoh: sinar gamma, sinar X, dan sinar UV sebagai mutagen. susunan gen makhluk hidup dapat berubah jika terpapar pancaran sinar gamma, sinar X, dan sinar UV. mutasi yang terjadi adalah perubahan susunan materi genetik dalam skala kromosom.
4.	D	Down syndrome atau trisomi 21 disebabkan adanya penambahan kromosom pada pasangan kromosom ke 21. Gejala down syndrome antara lain berat badan lahir rendah, ukuran kepala kecil, kepala bagian belakang datar, sudut mata luar naik ke atas, kelainan bentuk telinga dan hidung, dan beberapa lainnya. Selain menyebabkan kelainan fisik, down syndrome juga menyebabkan gangguan perkembangan penderitanya. Umumnya penderita down syndrome memiliki intelligence quotient (IQ) yang lebih rendah.
5.	A	Aneuploidi terjadi karena hilangnya atau bertambahnya perangkat kromosom (<i>genom</i>) makhluk hidup normal, umumnya bersifat <i>diploid</i> (mempunyai dua perangkat kromosom atau dua genom).Pada <i>aneuploid</i> dikenal individu monoploidi (mempunyai satu perangkat kromosom) dan <i>poliploid</i> (mempunyai banyak perangkat kromosom)

Pedoman Penskoran

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

 $Nilai = \frac{\textit{Jumlah Skor Perolehan}}{\textit{Jumlah Skor Maksimum}} \times 100 \%$

Konversi tingkat penguasaan:

90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar selanjutnya. Bagus! Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

F. Penilaian Diri

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jujur dan bertanggungjawab!

No.	Pertanyaan	Jawaban	
1.	Apakah Anda telah dapat menjelaskan berbagai penyebab mutasi kromosom?	° Ya	O Tidak
2.	Apakah Anda telah dapat menjelaskan berbagai penyebab mutasi gen?	C Ya	C Tidak
3.	Apakah Anda telah dapat menjelaskan akibat mutasi pada manusiai?	C Ya	C Tidak

Bila ada jawaban "Tidak", maka segera lakukan review pembelajaran, terutama pada bagian yang masih "Tidak".


Apabila semua jawaban "YA" maka anda bisa melanjutkan

EVALUASI

- 1. Berdasarkan mutasi genetiknya, mutasi gen merupakan proses perubahan yang terjadi pada tempat-tempat berikut, *kecuali*....
 - A. Lokusnya
 - B. Susunan molekul DNA
 - C. Rantai sense dan anti sensenya
 - D. Basa purin dan pirimidinnya
 - E. Basa nukleotida DNA
- 2. Pernyataan berikut yang tidak benar mengenai mutasi adalah....
 - A. Mutasi hanya terjadi pada kromosom kelamin
 - B. Mutasi terjadi pada tingkat gen dan kromosom
 - C. Mutasi dapat memberikan dampak merugikan dan menguntungkan
 - D. Beberapa kelainan akibat mutasi tidak diwariskan pada keturunannya
 - E. Selalu terjadi perubahan materi genetik(DNA) pada individu yang mengalami mutasi.
- 3. Perhatikan beberapa kodon berikut.
 - 1) UGC
 - 2) UGA
 - 3) UAG
 - 4) UAA
 - 5) AUG

Perubahan genetik pada gen dapat mengakibatkan translasi protein terhenti jika terbentuk triplet nomor....


- A. 1), 2), dan 3)
- B. 1), 2), dan 3)
- C. 1), 3), dan 5)
- D. 2), 3), dan 4)
- E. 2), 4), dan 5)
- 4. Transisi sebagai mutasi pergantian basa terjadi apabila....
 - A. Basa guanin berpasangan dengan sitosin
 - B. Basa guanin berpasangan dengan guanin yang lain
 - C. Basa adenin berpasangan dengan guanine
 - D. Basa kimia berpasangan dengan guanine
 - E. Basa urasil berpasangan dengan timin
- 5. Perhatikan diagram berikut ini!



Mutasi yang terjadi pada potongan DNA tersebut adalah....

- A. Transisi
- B. Insersi
- C. Inversi
- D. Transversi
- E. Translokasi

6. Perhatikan diagram berikut ini!



Mutasi yang terjadi pada sepotong DNA tersebut adalah...

- A. Transisi
- B. Insersi
- C. Inversi
- D. Transversi
- E. Translokasi
- 7. Kandungan dalam suatu produk makanan kaleng terdiri atas : daging sapi, terigu, protein, garam, gula, bumbu, MSG, tokoferon, glisikol, dan natrium nitrit. Dari zat-zat tersebut yang berpotensi sebagai mutagen adalah
 - A. MSG, gula, dan garam
 - B. garam, gula dan bumbu
 - C. protein, garam, dan terigu
 - D. MSG, tokoferol, dan bumbu
 - E. MSG, glisikol, dan Natrium nitrit
- 8. Semangka tanpa biji(3n) dapat terbentuk karena pengaruhâ....
 - A. senyawa kolkisin yang menyebabkan hasil penggandaan tidak memisah
 - B. senyawa kolkisin yang menyebabkan kromosom tidak melakukan penggandaan
 - C. sinar X yang memengaruhi pembentukan mikrospora
 - D. sinar X yang memengaruhi pembentukan ovum
 - E. sinar X yang menghambat pembelahan mitosis
- 9. Para pekerja yang bekerja di dalam ruang rontgen, pada beberapa bagian tubuhnya harus ditutup dengan pengaman. Hal ini dilakukan karena sinar rontgen dapat....
 - A. menimbulkan efek bersifat letal
 - B. merusak jaringan tubuh
 - C. menyebabkan terjadinya gagal berpisah
 - D. menyebabkan mutasi gen sel-sel kelamin
 - E. mengakibatkan tidak berfungsinya salah satu organ tubuh
 - 10. Mutasi sel somatik merupakan mutasi
 - A. sebagai akibat gagal berpisah
 - B. terjadi dalam sel gamet
 - C. dapat diwariskan kepada generasi berikutnya
 - D. hanya diwariskan pada anak sel yang dihasilkan oleh mitosis
 - E. sebagai akibat pindah silang

Kunci Jawaban valuasi dn pedoman penilaian

NO.	KUNCI	SKOR	NO.	KUNCI	SKOR
1.	В	10		В	10
2.	A	10		Е	10
3.	D	10		A	10
4.	В	10		D	10
5.	A	10		D	10

Nilai =
$$\frac{Jumlah\ Skor\ Perolehan}{50}$$
 x 100 %

DAFTAR PUSTAKA

- Pratiwi. DA, dkk. 2014. Biologi Untuk SMA Jilid 3. Jakarta: Erlangga
- Rachmawati, Faidah. 2009. *Buku Biologi SMA/MA Kelas XII BSE*. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional
- Irnaningtyas. 2014. *Biologi untuk SMA/MA Kelas XII* Kelompok peminatan *Matematika dan Imu Alam*. Jakarta: Erlangga
- Nurhayati, Nunung dan Resty Wijayanti. 2017. *Biologi SMA/MA Kelas XII*. Bandung: Yrama Widya
- Omegawati, W.O. dkk. 2018. *Biologi SMA/MA Kelas XII Peminatan Matematika dan Ilmu-ilmu Alam*. Klaten: Intan Pariwara.
- http://hanifanan.blogspot.com/2013/08/mutasi-biologi-kelas-xii.html