




# 第四节、换元积分法




一、第一类换元积分法



二、第二类换元积分法



三、倒代换



四、小结、思考题



五、作业

# 一、第一类换元积分法

问题  $\int \cos 2x dx \stackrel{?}{=} \sin 2x + C,$

解决方法 利用复合函数，设置中间变量.

过程 令  $t = 2x \Rightarrow dx = \frac{1}{2}dt,$

$$\int \cos 2x dx = \frac{1}{2} \int \cos t dt = \frac{1}{2} \sin t + C = \frac{1}{2} \sin 2x + C.$$

分析:

在一般情况下:

设  $F'(u) = f(u)$ , 则  $\int f(u)du = F(u) + C$ .

设  $F'(u) = f(u)$ ,  $u = \varphi(x)$  可导, 则有

$$dF[\varphi(x)] = f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx$$

$$\therefore \int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx = F[\varphi(x)] + C = F(u) + C \Big|_{u=\varphi(x)}$$

$$= \int f(u)du \Big|_{u=\varphi(x)}$$

$$\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx \xrightleftharpoons[\text{第二类换元法}]{\text{第一类换元法}} \int f(u)du$$

**定理1.** 设  $f(u)$  有原函数,  $u = \varphi(x)$  可导, 则有换元公式

$$\int f[\varphi(x)] \underline{\varphi'(x)dx} = \int f(u) du \Big|_{u = \varphi(x)}$$

即 
$$\int f[\varphi(x)] \varphi'(x) dx = \int f(\varphi(x)) d\varphi(x)$$

(也称配元法, 凑微分法)

**注**

使用此公式的关键在于将

$$\int g(x) dx \text{ 化为 } \int f[\varphi(x)] \varphi'(x) dx.$$

观察重点不同, 所得结论不同.

例1. 求  $\int (ax + b)^m dx$  ( $m \neq -1$ ).

解: 令  $u = ax + b$ , 则  $du = a dx$ , 故

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \int u^m \frac{1}{a} du = \frac{1}{a} \cdot \frac{1}{m+1} u^{m+1} + C \\ &= \frac{1}{a(m+1)} (ax + b)^{m+1} + C\end{aligned}$$

注: 当  $m = -1$  时

$$\int \frac{dx}{ax + b} = \frac{1}{a} \ln|ax + b| + C$$

例2 求  $\int \sin 2x dx$ .

解法1 
$$\begin{aligned}\int \sin 2x dx &= \frac{1}{2} \int \sin 2x d(2x) \\ &= -\frac{1}{2} \cos 2x + C;\end{aligned}$$

解法2 
$$\begin{aligned}\int \sin 2x dx &= 2 \int \sin x \cos x dx \\ &= 2 \int \sin x d(\sin x) = (\sin x)^2 + C;\end{aligned}$$

解法3 
$$\begin{aligned}\int \sin 2x dx &= 2 \int \sin x \cos x dx \\ &= -2 \int \cos x d(\cos x) = -(\cos x)^2 + C.\end{aligned}$$

一般常用的第一类换元积分法有如下几种形式:

$$(1) \int f(ax+b)dx = \frac{1}{a} \int f(ax+b) d(ax+b) \\ = \frac{1}{a} \left[ \int f(u)du \right]_{u=ax+b}$$

例3 求  $\int \frac{1}{3+2x} dx$ .

$$\text{解} \quad \int \frac{1}{3+2x} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{3+2x} \cdot (3+2x)' dx \\ = \frac{1}{2} \int \frac{1}{u} du = \frac{1}{2} \ln|u| + C = \frac{1}{2} \ln|3+2x| + C.$$

例4. 求  $\int \frac{dx}{x^2 - a^2}$ .

解:

$$\therefore \frac{1}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \frac{(x+a) - (x-a)}{(x-a)(x+a)} = \frac{1}{2a} \left( \frac{1}{x-a} - \frac{1}{x+a} \right)$$

$$\therefore \text{原式} = \frac{1}{2a} \left[ \int \frac{dx}{x-a} - \int \frac{dx}{x+a} \right]$$

$$= \frac{1}{2a} \left[ \int \frac{d(\textcolor{blue}{x-a})}{x-a} - \int \frac{d(\textcolor{blue}{x+a})}{x+a} \right]$$

$$= \frac{1}{2a} \left[ \ln|x-a| - \ln|x+a| \right] + C = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C$$



例5 求  $\int \frac{x}{(1+x)^3} dx$ .

解 
$$\begin{aligned}\int \frac{x}{(1+x)^3} dx &= \int \frac{x+1-1}{(1+x)^3} dx \\&= \int \left[ \frac{1}{(1+x)^2} - \frac{1}{(1+x)^3} \right] d(1+x) \\&= -\frac{1}{1+x} + \frac{1}{2(1+x)^2} + C.\end{aligned}$$

一般常用的第一类换元积分法有如下几种形式:

$$(1) \int f(ax+b)dx = \frac{1}{a} \int f(ax+b) d(ax+b)$$

$$(2) \int f(x^n)x^{n-1}dx = \frac{1}{n} \int f(x^n) dx^n$$

例6 求  $\int \frac{x}{4+x^2} dx$

解 
$$\begin{aligned} \int \frac{x}{4+x^2} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2)}{4+x^2} = \frac{1}{2} \int \frac{d(4+x^2)}{4+x^2} \\ &= \frac{1}{2} \ln(4+x^2) + C \end{aligned}$$

例7. 求  $\int \frac{x^3}{(x^2 + a^2)^{3/2}} dx$ .

解: 原式  $= \frac{1}{2} \int \frac{x^2 dx^2}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{1}{2} \int \frac{(x^2 + a^2) - a^2}{(x^2 + a^2)^{3/2}} dx^2$

$$= \frac{1}{2} \int (x^2 + a^2)^{-1/2} d(x^2 + a^2)$$
$$- \frac{a^2}{2} \int (x^2 + a^2)^{-3/2} d(x^2 + a^2)$$
$$= \sqrt{x^2 + a^2} + \frac{a^2}{\sqrt{x^2 + a^2}} + C$$

一般常用的第一类换元积分法有如下几种形式:

$$(1) \int f(ax+b)dx = \frac{1}{a} \int f(ax+b) d(ax+b)$$

$$(2) \int f(x^n)x^{n-1}dx = \frac{1}{n} \int f(x^n) dx^n$$

$$(3) \int f(\sqrt{x})\frac{1}{\sqrt{x}}dx = 2 \int f(\sqrt{x}) d\sqrt{x}$$

例8. 求  $\int \frac{e^{3\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$ .

$$\begin{aligned} \text{解: 原式} &= 2 \int e^{3\sqrt{x}} d\sqrt{x} = \frac{2}{3} \int e^{3\sqrt{x}} d(3\sqrt{x}) \\ &= \frac{2}{3} e^{3\sqrt{x}} + C \end{aligned}$$

一般常用的第一类换元积分法有如下几种形式:

$$(4) \int f(\sin x) \cos x dx = \int f(\sin x) d\sin x$$

$$(5) \int f(\cos x) \sin x dx = - \int f(\cos x) d\cos x$$

$$(6) \int f(\tan x) \sec^2 x dx = \int f(\tan x) d\tan x$$

例9. 求  $\int \tan x dx$ .

$$\begin{aligned} \text{解: } \int \tan x dx &= \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = - \int \frac{d\cos x}{\cos x} \\ &= -\ln |\cos x| + C \end{aligned}$$

类似

$$\begin{aligned}\int \cot x dx &= \int \frac{\cos x dx}{\sin x} = \int \frac{d \sin x}{\sin x} \\ &= \ln |\sin x| + C\end{aligned}$$

例10. 求  $\int \sec^6 x dx$ .

$$\begin{aligned}\text{解: 原式} &= \int \sec^4 x \cdot \sec^2 x dx \\ &= \int (\tan^2 x + 1)^2 d \tan x \\ &= \int (\tan^4 x + 2 \tan^2 x + 1) d \tan x \\ &= \frac{1}{5} \tan^5 x + \frac{2}{3} \tan^3 x + \tan x + C\end{aligned}$$

例11. 求  $\int \sec x dx$  .

解法1

$$\begin{aligned}\int \sec x dx &= \int \frac{\cos x}{\cos^2 x} dx = \int \frac{d \sin x}{1 - \sin^2 x} \\&= \int \frac{1}{2} \left( \frac{1}{1 + \sin x} + \frac{1}{1 - \sin x} \right) d \sin x \\&= \frac{1}{2} [\ln |1 + \sin x| - \ln |1 - \sin x|] + C \\&= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1 + \sin x}{1 - \sin x} \right| + C\end{aligned}$$

**解法 2**

$$\begin{aligned}
 \int \sec x dx &= \int \frac{\sec x(\sec x + \tan x)}{\sec x + \tan x} dx \\
 &= \int \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x} dx \\
 &= \int \frac{d(\sec x + \tan x)}{\sec x + \tan x} \\
 &= \ln |\sec x + \tan x| + C
 \end{aligned}$$

同样可证

$$\int \csc x dx = \ln |\csc x - \cot x| + C$$

或

$$\int \csc x dx = \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C$$



**例12 . 求  $\int \cos^4 x \, dx$  .**

**解:**  $\because \cos^4 x = (\cos^2 x)^2 = \left(\frac{1 + \cos 2x}{2}\right)^2$

$$= \frac{1}{4}(1 + 2\cos 2x + \cos^2 2x)$$

$$= \frac{1}{4}\left(1 + 2\cos 2x + \frac{1 + \cos 4x}{2}\right)$$

$$= \frac{1}{4}\left(\frac{3}{2} + 2\cos 2x + \frac{1}{2}\cos 4x\right)$$

$$\begin{aligned}\therefore \int \cos^4 x \, dx &= \frac{1}{4} \int \left(\frac{3}{2} + 2\cos 2x + \frac{1}{2}\cos 4x\right) dx \\ &= \frac{1}{4} \left[ \frac{3}{2} \int dx + \int \cos 2x \, d(2x) + \frac{1}{8} \int \cos 4x \, d(4x) \right] \\ &= \frac{3}{8}x + \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{32}\sin 4x + C\end{aligned}$$

**例13.** 求  $\int \sin^2 x \cos^2 3x dx$  .

**解:**  $\because \sin^2 x \cos^2 3x = [\frac{1}{2}(\sin 4x - \sin 2x)]^2$

$$= \frac{1}{4} \sin^2 4x - \frac{1}{4} \cdot 2 \sin 4x \sin 2x + \frac{1}{4} \sin^2 2x$$
$$= \frac{1}{8}(1 - \cos 8x) - \sin^2 2x \cos 2x + \frac{1}{8}(1 - \cos 4x)$$

$$\therefore \text{原式} = \frac{1}{4} \int dx - \frac{1}{64} \int \cos 8x d(8x)$$
$$- \frac{1}{2} \int \sin^2 2x d(\sin 2x) - \frac{1}{32} \int \cos 4x d(4x)$$
$$= \frac{1}{4} x - \frac{1}{64} \sin 8x - \frac{1}{6} \sin^3 2x - \frac{1}{32} \sin 4x + C$$

$$(7) \int f\left(\arctan \frac{x}{a}\right) \frac{1}{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{a} \int f\left(\arctan \frac{x}{a}\right) d\arctan \frac{x}{a}$$

例14. 求  $\int \frac{dx}{a^2 + x^2}$ .

解:  $\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a^2} \int \frac{dx}{1 + \left(\frac{x}{a}\right)^2}$

↓ 令  $u = \frac{x}{a}$ , 则  $du = \frac{1}{a} dx$

$$= \frac{1}{a} \int \frac{du}{1 + u^2} = \frac{1}{a} \arctan u + C$$

$$= \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + C$$

想到公式

$$\int \frac{du}{1 + u^2} = \arctan u + C$$

例15 求  $\int \frac{1}{x^2 - 8x + 25} dx$ .

解  $\int \frac{1}{x^2 - 8x + 25} dx = \int \frac{1}{(x-4)^2 + 9} dx$

$$= \frac{1}{3^2} \int \frac{1}{\left(\frac{x-4}{3}\right)^2 + 1} dx = \frac{1}{3} \int \frac{1}{\left(\frac{x-4}{3}\right)^2 + 1} d\left(\frac{x-4}{3}\right)$$

$$= \frac{1}{3} \arctan \frac{x-4}{3} + C.$$

$$(8) \int f(\arcsin x) \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int f(\arcsin x) d\arcsin x$$

例16. 求  $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} (a > 0)$ .

解: 
$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \int \frac{dx}{a\sqrt{1 - (\frac{x}{a})^2}} = \int \frac{d(\frac{x}{a})}{\sqrt{1 - (\frac{x}{a})^2}}$$
$$= \arcsin \frac{x}{a} + C$$

想到公式

$$\int \frac{du}{\sqrt{1-u^2}} = \arcsin u + C$$

$$(8) \int f(\arcsin x) \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int f(\arcsin x) d\arcsin x$$

例17. 求  $\int \frac{dx}{(\arcsin x)^2 \sqrt{1-x^2}} (a > 0).$

解: 原式  $= \int \frac{d\arcsin x}{(\arcsin x)^2}$

$$= -\frac{1}{\arcsin x} + C$$

$$(9) \int f(e^x) e^x dx = \int f(e^x) de^x$$

例18 求  $\int \frac{dx}{1+e^x}$  .

解

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{1+e^x} &= \int \frac{(1+e^x) - e^x}{1+e^x} dx = \int dx - \int \frac{d(1+e^x)}{1+e^x} \\ &= x - \ln(1+e^x) + C \end{aligned}$$

例19 求  $\int (1 - \frac{1}{x^2}) e^{x + \frac{1}{x}} dx$ .

解  $\because \left( x + \frac{1}{x} \right)' = 1 - \frac{1}{x^2},$

$$\therefore \int (1 - \frac{1}{x^2}) e^{x + \frac{1}{x}} dx$$

$$= \int e^{x + \frac{1}{x}} d\left(x + \frac{1}{x}\right) = e^{x + \frac{1}{x}} + C.$$



$$(10) \int f(\ln x) \frac{1}{x} dx = \int f(\ln x) d\ln x$$

例20. 求  $\int \frac{dx}{x(1+2\ln x)}$ .

解: 原式  $= \int \frac{d\ln x}{1+2\ln x} = \frac{1}{2} \int \frac{d(1+2\ln x)}{1+2\ln x}$

$$= \frac{1}{2} \ln|1+2\ln x| + C$$

例21. 求

$$\int \frac{x+1}{x(1+xe^x)} dx.$$

解: 原式 =  $\int \frac{(x+1)e^x}{xe^x(1+xe^x)} dx = \int \left( \frac{1}{xe^x} - \frac{1}{1+xe^x} \right) d(xe^x)$

$$= \ln |xe^x| - \ln |1+xe^x| + C$$
$$= x + \ln |x| - \ln |1+xe^x| + C$$

---

分析:  $\frac{1}{xe^x(1+xe^x)} = \frac{1+xe^x - xe^x}{xe^x(1+xe^x)} = \frac{1}{xe^x} - \frac{1}{1+xe^x}$

$$(x+1)e^x dx = xe^x dx + e^x dx = d(xe^x)$$

## 二、第二类换元积分法

第一类换元法解决的问题

$$\int \underset{\text{难求}}{f[\varphi(x)]\varphi'(x)}dx = \int \underset{\text{易求}}{f(u)}du \Big|_{u=\varphi(x)}$$

若所求积分  $\int f(u)du$  难求,

$$\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx \text{ 易求,}$$

则得第二类换元积分法 .

$$\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx \xrightleftharpoons[\text{第二类换元法}]{\text{第一类换元法}} \int f(u)du \Big|_{u=\varphi(x)}$$

**定理2.** 设  $x = \psi(t)$  是单调可导函数, 且  $\psi'(t) \neq 0$ ,  $f[\psi(t)]\psi'(t)$  具有原函数, 则有换元公式

$$\int f(x)dx = \int f[\psi(t)]\psi'(t)dt \Big|_{t=\psi^{-1}(x)}$$

其中  $t = \psi^{-1}(x)$  是  $x = \psi(t)$  的反函数

**证:** 设  $f[\psi(t)]\psi'(t)$  的原函数  $\Phi(t)$ , 令

$$F(x) = \Phi[\psi^{-1}(x)] \quad \boxed{\Phi'(t) = f[\psi(t)]\psi'(t)}$$

则 
$$F'(x) = \frac{d\Phi}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = f[\psi(t)]\psi'(t) \cdot \frac{1}{\psi'(t)} = f(x)$$

$$\begin{aligned} \therefore \int f(x)dx &= F(x) + C = \Phi[\psi^{-1}(x)] + C \\ &= \int f[\psi(t)]\psi'(t)dt \Big|_{t=\psi^{-1}(x)} \end{aligned}$$

**例22.** 求  $\int \sqrt{a^2 - x^2} \, dx \quad (a > 0).$

**解:** 令  $x = a \sin t, \quad t \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}),$  则

$$\sqrt{a^2 - x^2} = \sqrt{a^2 - a^2 \sin^2 t} = a \cos t$$


$$dx = a \cos t \, dt$$

$$\therefore \text{原式} = \int a \cos t \cdot a \cos t \, dt = a^2 \int \cos^2 t \, dt$$

$$= a^2 \left( \frac{t}{2} + \frac{\sin 2t}{4} \right) + C$$

$$\sin 2t = 2 \sin t \cos t = 2 \cdot \frac{x}{a} \cdot \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a}$$

$$= \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{1}{2} x \sqrt{a^2 - x^2} + C$$



**例23.** 求  $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} \quad (a > 0).$

**解:** 令  $x = a \tan t, t \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ , 则

$$\sqrt{x^2 + a^2} = \sqrt{a^2 \tan^2 t + a^2} = a \sec t$$


$$dx = a \sec^2 t dt$$

$$\therefore \text{原式} = \int \frac{a \sec^2 t}{a \sec t} dt = \int \sec t dt$$

$$= \ln |\sec t + \tan t| + C_1$$

$$= \ln \left[ \frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{a} + \frac{x}{a} \right] + C_1$$

$$= \ln [x + \sqrt{x^2 + a^2}] + C \quad (C = C_1 - \ln a)$$



**例24.** 求  $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} \quad (a > 0).$

**解:** 当  $x > a$  时, 令  $x = a \sec t, t \in (0, \frac{\pi}{2})$ , 则

$$\sqrt{x^2 - a^2} = \sqrt{a^2 \sec^2 t - a^2} = a \tan t$$


$$dx = a \sec t \tan t dt$$

$$\therefore \text{原式} = \int \frac{a \sec t \tan t}{a \tan t} dt = \int \sec t dt$$

$$= \ln |\sec t + \tan t| + C_1$$

$$= \ln \left| \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a} + \frac{x}{a} \right| + C_1$$

$$= \ln |x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C \quad (C = C_1 - \ln a)$$



当  $x < -a$  时, 令  $x = -u$ , 则  $u > a$ , 于是

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} &= -\int \frac{du}{\sqrt{u^2 - a^2}} = -\ln \left| u + \sqrt{u^2 - a^2} \right| + C_1 \\&= -\ln \left| -x + \sqrt{x^2 - a^2} \right| + C_1 \\&= -\ln \left| \frac{a^2}{-x - \sqrt{x^2 - a^2}} \right| + C_1 \\&= \ln \left| x + \sqrt{x^2 - a^2} \right| + C \quad (C = C_1 - 2\ln a)\end{aligned}$$

---

$$x > a \text{ 时, } \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 - a^2} \right| + C$$





被积函数含有  $\sqrt{x^2 + a^2}$  或  $\sqrt{x^2 - a^2}$  时,除采用三角代换外,还可利用公式

$$\operatorname{ch}^2 t - \operatorname{sh}^2 t = 1$$

采用双曲代换

$$x = a \operatorname{sh} t \quad \text{或} \quad x = a \operatorname{ch} t$$

消去根式, 所得结果一致.

## 小结:

### 1. 第二类换元法常见类型:

$$(1) \int f(x, \sqrt[n]{ax+b}) dx, \quad \text{令 } t = \sqrt[n]{ax+b}$$

$$(2) \int f(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}) dx, \quad \text{令 } t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$$

$$(3) \int f(x, \sqrt{a^2 - x^2}) dx, \quad \text{令 } x = a \sin t \quad \text{或} \quad x = a \cos t$$

$$(4) \int f(x, \sqrt{a^2 + x^2}) dx, \quad \text{令 } x = a \tan t \quad \text{或} \quad x = a \operatorname{sh} t$$

$$(5) \int f(x, \sqrt{x^2 - a^2}) dx, \quad \text{令 } x = a \sec t \quad \text{或} \quad x = a \operatorname{ch} t$$

$$(6) \int f(a^x) dx, \text{ 令 } t = a^x$$

## 2. 常用基本积分公式的补充

$$(16) \int \tan x dx = -\ln|\cos x| + C$$

$$(17) \int \cot x dx = \ln|\sin x| + C$$

$$(18) \int \sec x dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$$

$$(19) \int \csc x dx = \ln|\csc x - \cot x| + C$$

$$(20) \quad \int \frac{1}{a^2 + x^2} \mathrm{d} x = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$$

$$(21) \quad \int \frac{1}{x^2 - a^2} \mathrm{d} x = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x - a}{x + a} \right| + C$$

$$(22) \quad \int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} \mathrm{d} x = \arcsin \frac{x}{a} + C$$

$$(23) \quad \int \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} \mathrm{d} x = \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) + C$$

$$(24) \quad \int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} \mathrm{d} x = \ln \left| x + \sqrt{x^2 - a^2} \right| + C$$

例26. 求  $\int \frac{dx}{x^2 + 2x + 3}$ .

解: 原式  $= \int \frac{1}{(x+1)^2 + (\sqrt{2})^2} d(x+1)$   
 $= \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{x+1}{\sqrt{2}} + C$

例27. 求  $I = \int \frac{dx}{\sqrt{4x^2 + 9}}$ .

解:  $I = \frac{1}{2} \int \frac{d(2x)}{\sqrt{(2x)^2 + 3^2}} = \frac{1}{2} \ln \left| 2x + \sqrt{4x^2 + 9} \right| + C$

例28. 求  $\int \frac{dx}{\sqrt{1+x-x^2}}$ .

解: 原式  $= \int \frac{d(x - \frac{1}{2})}{\sqrt{(\frac{\sqrt{5}}{2})^2 - (x - \frac{1}{2})^2}} = \arcsin \frac{2x-1}{\sqrt{5}} + C$

例29. 求  $\int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x}-1}}$ .

解: 原式  $= -\int \frac{de^{-x}}{\sqrt{1-e^{-2x}}} = -\arcsin e^{-x} + C$

### 三、倒代换

例30. 求  $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 + a^2}}$ .

解: 令  $x = \frac{1}{t}$ , 得

$$\begin{aligned} \text{原式} &= -\int \frac{t}{\sqrt{a^2 t^2 + 1}} dt = -\frac{1}{2a^2} \int \frac{d(a^2 t^2 + 1)}{\sqrt{a^2 t^2 + 1}} \\ &= -\frac{1}{a^2} \sqrt{a^2 t^2 + 1} + C = -\frac{\sqrt{x^2 + a^2}}{a^2 x} + C \end{aligned}$$

例. 求  $\int \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{x^4} dx$  .

解: 令  $x = \frac{1}{t}$  , 则  $dx = \frac{-1}{t^2} dt$

$$\text{原式} = \int \frac{\sqrt{a^2 - \frac{1}{t^2}}}{\frac{1}{t^4}} \cdot \frac{-1}{t^2} dt = - \int (a^2 t^2 - 1)^{\frac{1}{2}} |t| dt$$

当  $x > 0$  时,

$$\begin{aligned} \text{原式} &= - \frac{1}{2a^2} \int (a^2 t^2 - 1)^{\frac{1}{2}} d(a^2 t^2 - 1) \\ &= - \frac{(a^2 t^2 - 1)^{\frac{3}{2}}}{3a^2} + C = - \frac{(a^2 - x^2)^{\frac{3}{2}}}{3a^2 x^3} + C \end{aligned}$$

当  $x < 0$  时, 类似可得同样结果 .



例31. 求  $\int \frac{dx}{(x+1)^3 \sqrt{x^2+2x}}$ .

解: 原式 =  $\int \frac{dx}{(x+1)^3 \sqrt{(x+1)^2 - 1}}$  令  $x+1 = \frac{1}{t}$

$$= \int \frac{t^3}{\sqrt{\frac{1}{t^2} - 1}} \left(-\frac{1}{t^2}\right) dt = - \int \frac{t^2}{\sqrt{1-t^2}} dt$$

$$= \int \frac{(1-t^2)-1}{\sqrt{1-t^2}} dt = \boxed{\int \sqrt{1-t^2} dt} - \int \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt$$

$$= \frac{1}{2} t \sqrt{1-t^2} + \frac{1}{2} \arcsin t - \arcsin t + C$$

$$= \frac{1}{2} \frac{\sqrt{x^2+2x}}{(x+1)^2} - \frac{1}{2} \arcsin \frac{1}{x+1} + C$$

## 四、小结、思考题

### 思考与练习

1. 下列积分应如何换元才能使积分简便？

$$(1) \int \frac{x^5}{\sqrt{1+x^2}} dx$$

$$\text{令 } t = \sqrt{1+x^2}$$

$$(2) \int \frac{dx}{\sqrt{1+e^x}}$$

$$\text{令 } t = \sqrt{1+e^x}$$

$$(3) \int \frac{dx}{x(x^7+2)} \quad \text{令 } t = \frac{1}{x}$$

2. 已知  $\int x^5 f(x) dx = \sqrt{x^2 - 1} + C$ , 求  $\int f(x) dx$ .

解: 两边求导, 得  $x^5 f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}}$ , 则

$$\begin{aligned}\int f(x) dx &= \int \frac{dx}{x^4 \sqrt{x^2 - 1}} \quad (\text{令 } t = \frac{1}{x}) \\&= \int \frac{-t^3 dt}{\sqrt{1 - t^2}} = \frac{1}{2} \int \frac{(1 - t^2) - 1}{\sqrt{1 - t^2}} dt \\&= \frac{-1}{2} \int (1 - t^2)^{\frac{1}{2}} d(1 - t^2) + \frac{1}{2} \int (1 - t^2)^{-\frac{1}{2}} d(1 - t^2) \\&= \frac{-1}{3} (1 - t^2)^{\frac{3}{2}} + (1 - t^2)^{\frac{1}{2}} + C = \dots\end{aligned}$$

(代回原变量)

**例题 1.** 求下列积分:

$$\begin{aligned} 1) \int x^2 \frac{1}{\sqrt{x^3+1}} dx &= \frac{1}{3} \int \frac{1}{\sqrt{x^3+1}} d(x^3+1) \\ &= \frac{2}{3} \sqrt{x^3+1} + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \int \frac{2x+3}{\sqrt{1+2x-x^2}} dx &= \int \frac{-(2-2x)+5}{\sqrt{1+2x-x^2}} dx \\ &= -\int \frac{d(1+2x-x^2)}{\sqrt{1+2x-x^2}} + 5 \int \frac{d(x-1)}{\sqrt{2-(x-1)^2}} \\ &= -2\sqrt{1+2x-x^2} + 5 \arcsin \frac{x-1}{\sqrt{2}} + C \end{aligned}$$

2. 求不定积分  $\int \frac{2\sin x \cos x \sqrt{1 + \sin^2 x}}{2 + \sin^2 x} dx$ .

解：利用凑微分法，得

$$\text{原式} = \int \frac{\sqrt{1 + \sin^2 x}}{2 + \sin^2 x} d(1 + \sin^2 x)$$

$$\downarrow \quad \text{令 } t = \sqrt{1 + \sin^2 x}$$

$$= \int \frac{2t^2}{1 + t^2} dt = 2 \int \left(1 - \frac{1}{1 + t^2}\right) dt$$

$$= 2t - 2\arctan t + C$$

$$= 2\left[\sqrt{1 + \sin^2 x} - \arctan \sqrt{1 + \sin^2 x}\right] + C$$

3. 求不定积分  $\int \frac{1}{(1+x^2)\sqrt{1-x^2}} dx$ .

解: 令  $x = \sin t$ ,  $1+x^2 = 1+\sin^2 t$ ,  $dx = \cos t dt$

原式  $\int \frac{\cos t}{(1+\sin^2 t)\cos t} dt = \int \frac{1}{1+\sin^2 t} dt$

分子分母同除以  $\cos^2 t$

$$\begin{aligned} &= \int \frac{\sec^2 t}{\sec^2 t + \tan^2 t} dt = \int \frac{1}{1+2\tan^2 t} d\tan t \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{1}{1+(\sqrt{2}\tan t)^2} d\sqrt{2}\tan t \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan(\sqrt{2}\tan t) + C = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{\sqrt{2}x}{\sqrt{1-x^2}} + C \end{aligned}$$

## 五、作业

### 习题

4-4: 7 (1-20双数题, 21-26)