



# 数学建模 (Mathematic Modeling)

国防科技大学

## 第六讲



## 第六讲

- ▶ 主要内容：介绍层次分析法和合作对策模型。



# 层次分析法 (Analytic Hierarchy Process, AHP)



# 层次分析法 (Analytic Hierarchy Process, AHP)


数学用于研究自然与社会现象的方法主要有：



## 层次分析法 (Analytic Hierarchy Process, AHP)

数学用于研究自然与社会现象的方法主要有：

- ▶ 机理分析——用经典的数学工具分析现象的因果关系；
- ▶ 统计分析——以随机数学为工具，通过大量观测数据寻求统计规律。



## 层次分析法 (Analytic Hierarchy Process, AHP)

数学用于研究自然与社会现象的方法主要有：

- ▶ 机理分析——用经典的数学工具分析现象的因果关系；
- ▶ 统计分析——以随机数学为工具，通过大量观测数据寻求统计规律。

近年来发展起来的第三种方法称为系统分析，层次分析是系统分析的工具之一，它是美国运筹学教授 Saaty 于 70 年代初期提出来的。它把人的思维过程层次化、数量化，并用数学方法为分析、决策、预报或控制提供定量的依据。这是一种定性与定量相结合的方法。

例 1 （渡河方案）三个方案：桥梁、隧道、渡船，用效益、代价作为选择方案的标准。



步骤：



步骤：

① 将问题条理化、层次化，构造出一个有层次的结构模型。层次分为三层：目标层、准则层和方案层。



## 步骤：

① 将问题条理化、层次化，构造出一个有层次的结构模型。层次分为三层：目标层、准则层和方案层。

② 比较同一层次元素对上一层次同一目标的影响，从而确定它们在目标中所占的比重。采用两两比较的方法，求出它们对于同一个目标的重要性的比例标度，标度等级为  $1, 2, \dots, 9, 1/2, 1/3, \dots, 1/9$ 。得到两两比较判断矩阵。

1——9 标度的含义为：

1—两个元素同等重要

3—前者稍重要

5—前者明显重要

7—前者强烈重要

9—前者极端重要

2, 4, 6, 8 为上述判断的中间值。

③ 在单一准则下计算元素相对排序权重，以及判断矩阵一致性检验。



③ 在单一准则下计算元素相对排序权重，以及判断矩阵一致性检验。

④ 计算方案层中各元素对于目标层的总排序权重，从而确定首选方案。

## 成对比较法，正互反阵和一致阵



## 成对比较法, 正互反阵和一致阵

设要比较的  $n$  个因素  $y = \{y_1, \dots, y_n\}$  对目标  $Z$  的影响, 确定它们在  $Z$  中的比重。每次取两个因素  $y_i$  和  $y_j$ , 用  $a_{ij}$  表示  $y_i$  与  $y_j$  对  $Z$  的影响之比:

$$a_{ij} > 0, \quad a_{ji} = \frac{1}{a_{ij}} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n) \quad (1)$$


$A = (a_{ij})$  称为成对比较阵或判断矩阵。满足 (1) 的矩阵称为正互反阵。成对比较阵是正互反阵。



考虑旅游问题。设有三个地点供选择，他考虑五个因素：费用  $y_1$ ，景色  $y_2$ ，居住  $y_3$ ，饮食  $y_4$ ，交通  $y_5$ 。



考虑旅游问题。设有三个地点供选择，他考虑五个因素：费用  $y_1$ ，景色  $y_2$ ，居住  $y_3$ ，饮食  $y_4$ ，交通  $y_5$ 。



经推敲，得成对比较阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 7 & 5 & 5 \\ 1/2 & 1 & 4 & 3 & 3 \\ 1/7 & 1/4 & 1 & 1/2 & 1/3 \\ 1/5 & 1/3 & 2 & 1 & 1 \\ 1/5 & 1/3 & 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

经推敲，得成对比较阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 7 & 5 & 5 \\ 1/2 & 1 & 4 & 3 & 3 \\ 1/7 & 1/4 & 1 & 1/2 & 1/3 \\ 1/5 & 1/3 & 2 & 1 & 1 \\ 1/5 & 1/3 & 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

如果此人对  $y_1, y_2, y_3$  三因素的成对比较是绝对一致的，则应该有

$$a_{12} \cdot a_{23} = a_{13}$$

但实际上， $a_{12} \cdot a_{23} = 2 \cdot 4 = 8 \neq 7 = a_{13}$ ，这说明他对这三个因素的成对比较不一致。

引入一致阵的概念。



引入一致阵的概念。

如果一个正互反阵  $A$  满足

$$a_{ij} \cdot a_{jk} = a_{ik} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n) \quad (2)$$

则称  $A$  为一致阵。

引理 正互反阵的最大特征值是正实数，它对应正的特征向量。



定理 1  $n$  阶正互反阵是一致阵  $\Leftrightarrow \lambda_{\max} = n$ .





定理 1  $n$  阶正互反阵是一致阵  $\Leftrightarrow \lambda_{\max} = n$ .

证明  $\Rightarrow$ ) 设  $A$  是一致阵, 由一致性

$$a_{ij} = a_{i1} \cdot a_{1j} = \frac{a_{1j}}{a_{1i}}$$

故第  $i$  行为  $\frac{a_{11}}{a_{1i}} \frac{a_{12}}{a_{1i}} \dots \frac{a_{1n}}{a_{1i}}$  ( $i = 2, 3, \dots, n$ ). 与第一行成比例,  $r_k A = 1 \Rightarrow A$  只有一个特征根非零, 设为  $\lambda_1$ .

则  $n = \text{tr}A = \sum_{i=1}^n \lambda_i = \lambda_1$ . 必要性得证。

$\Leftarrow$ ) 设  $A$  的最大特征值  $\lambda_{\max} = n$ , 相应的特征向量为  $\omega = (\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n)'$ . 由引理  $\omega > 0$ .  
由于

$$\lambda_{\max} \cdot \omega = A\omega \Rightarrow \lambda_{\max} \omega_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} \omega_j \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \lambda_{\max} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \omega_i^{-1} \sum_{j=1}^n a_{ij} \omega_j \\
 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} \frac{\omega_j}{\omega_i} \\
 &= \frac{1}{n} \left[ \sum_{i \neq j} a_{ij} \frac{\omega_j}{\omega_i} + n \right] \\
 &= \frac{1}{n} \left[ \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n \left( a_{ij} \frac{\omega_j}{\omega_i} + a_{ji} \frac{\omega_i}{\omega_j} \right) + n \right] \\
 &\geq \frac{1}{n} \left[ \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n 2 + n \right] = \frac{1}{n} \cdot n^2 = n = \lambda_{\max}
 \end{aligned}$$

所以

$$a_{ij} \frac{\omega_j}{\omega_i} + \frac{1}{a_{ij}} \frac{\omega_i}{\omega_j} = 2$$

$$\Rightarrow a_{ij} \frac{\omega_j}{\omega_i} = 1 \Rightarrow a_{ij} = \frac{\omega_i}{\omega_j}$$

$$\Rightarrow a_{ik} = \frac{\omega_i}{\omega_k} = \frac{\omega_i}{\omega_j} \frac{\omega_j}{\omega_k} = a_{ij} \cdot a_{jk}$$

$\therefore A$  是一致阵

## 权向量和一致性指标



## 权向量和一致性指标

当  $A$  是一致阵时,  $\lambda_m = n, a_{ij} = \frac{\omega_i}{\omega_j}$ . 设  $\omega = (\omega_i)$  是  $\lambda_m$  的标准化特征向量, 则  $\sum \omega_i = 1$ , 它表示了  $y_1, y_2, \dots, y_n$  在  $Z$  中的比重, 称为权向量。例如:

## 权向量和一致性指标

当  $A$  是一致阵时,  $\lambda_m = n, a_{ij} = \frac{\omega_i}{\omega_j}$ . 设  $\omega = (\omega_i)$  是  $\lambda_m$  的标准化特征向量, 则  $\sum \omega_i = 1$ , 它表示了  $y_1, y_2, \dots, y_n$  在  $Z$  中的比重, 称为权向量。例如:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 1/2 & 1 & 3 \\ 1/6 & 1/3 & 1 \end{pmatrix}$$

是一致阵,  $\lambda_m = 3, \omega = (0.6, 0.3, 0.1)'$ .

更多的情况下  $A$  不是一致的，这时仍称  $\lambda_m$  的标准化特征向量  $\omega$  为权向量，如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 1/2 & 1 & 4 \\ 1/6 & 1/4 & 1 \end{pmatrix}$$

$\lambda_m = 3.01$ .  $A$  不一致。  $\omega = (0.588, 0.322, 0.09)'$ .



$\lambda_m$  比  $n$  大得越多， $A$  不一致的程度就越严重，用  $\omega$  表示  $\{y_1, \dots, y_n\}$  在  $Z$  中所占比重时的偏差越大。



$\lambda_m$  比  $n$  大得越多， $A$  不一致的程度就越严重，用  $\omega$  表示  $\{y_1, \dots, y_n\}$  在  $Z$  中所占比重时的偏差越大。

衡量不一致程度的数量指标叫做一致性指标。Saaty 将它定义为

$$CI = \frac{\lambda_m - n}{n - 1} \quad (3)$$

$\lambda_m$  比  $n$  大得越多， $A$  不一致的程度就越严重，用  $\omega$  表示  $\{y_1, \dots, y_n\}$  在  $Z$  中所占比重时的偏差越大。

衡量不一致程度的数量指标叫做一致性指标。Saaty 将它定义为

$$CI = \frac{\lambda_m - n}{n - 1} \quad (3)$$

对于一致阵，一致性指标  $CI = 0$ 。

$CI$  越大， $A$  的不一致程度越严重。

为了找出衡量一致性指标  $CI$  的标准, Saaty 提出一种方法。对于固定的  $n$ , 随机地构造正互反阵  $\tilde{A}$ , 其中  $\tilde{a}_{ij}(i < j)$  随机地从  $1/9, \dots, 1/2, 1, 2, \dots, 9$  当中取出一数, 由于其随机性, 可以认为这样的  $\tilde{A}$  是最不一致的, 用充分大的子样得到  $\tilde{A}$  的最大特征值的平均值  $\tilde{\lambda}_m$ , 定义随机性指标为

$$CR = \frac{\tilde{\lambda}_m - n}{n - 1} \quad (4)$$

$n$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$CR$	0	0	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49	1.51

表: 随机性指标  $CR$  值

当

$$CI \leq 0.1CR$$

(5)

时，认为  $A$  的不一致性仍可接受。

下面介绍计算  $\lambda_m$  和  $\omega$  的一种近似方法。

将  $A$  的各个列向量平均后，再标准化，即为  $\hat{\omega}$ ，

$$\hat{\lambda}_m = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{(A\hat{\omega})_i}{\hat{\omega}_i}$$

例如：  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 6 \\ 1/2 & 1 & 4 \\ 1/6 & 1/4 & 1 \end{pmatrix}$

$$A \xrightarrow{\text{各行求和}} \begin{pmatrix} 9 \\ 5.5 \\ 1.42 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{平均}} \begin{pmatrix} 3 \\ 1.83 \\ 0.47 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{标准化}} \begin{pmatrix} 0.57 \\ 0.35 \\ 0.08 \end{pmatrix} = \hat{\omega}$$

$$A\hat{\omega} = (1.75, 0.955, 0.26)'$$

$$\hat{\lambda}_m = \frac{1}{3} \left( \frac{1.75}{0.57} + \frac{0.955}{0.35} + \frac{0.26}{0.08} \right) = 3.016 \quad \lambda_m = 3.016$$

$$CI = \frac{\hat{\lambda}_m - n}{n - 1} = \frac{3.016 - 3}{2} = 0.008 < 0.1 \times 0.58$$

∴ 认为  $A$  的不一致性是可以接受的。



## 层次分析模型



## 层次分析模型

旅游问题:

$$A \xrightarrow{\text{各行求和}} \begin{pmatrix} 20 \\ 11.5 \\ 2.23 \\ 4.53 \\ 5.53 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{平均}} \begin{pmatrix} 4 \\ 2.3 \\ 0.45 \\ 0.91 \\ 1.11 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{标准化}} \begin{pmatrix} 0.46 \\ 0.26 \\ 0.05 \\ 0.10 \\ 0.13 \end{pmatrix} = \hat{\omega}$$


$$\text{即 } \omega_2(y) = (0.46, 0.26, 0.05, 0.10, 0.13)'$$

$$A\omega_2(y) = (2.48, 1.38, 0.27, 0.51, 0.56)'$$

$$\lambda_m = \frac{1}{5} \left( \frac{2.48}{0.46} + \frac{1.38}{0.26} + \frac{0.27}{0.05} + \frac{0.51}{0.10} + \frac{0.56}{0.13} \right) = 5.1$$

$$CI = \frac{5.1 - 5}{4} = \frac{0.1}{4} = 0.025, \quad CR_5 = 1.12, \quad \frac{CI}{CR} < 0.1$$

故  $A$  的不一致性可以接受。 $\omega_2(y)$  可以代表 5 个因素在  $Z$  中分别所占的比重，即准则层关于目标层的比重已确定。下面还要确定方案层关于准则层的比重。



故  $A$  的不一致性可以接受。 $\omega_2(y)$  可以代表 5 个因素在  $Z$  中分别所占的比重，即准则层关于目标层的比重已确定。下面还要确定方案层关于准则层的比重。


设  $x = \{x_1, x_2, x_3\}$  对  $y_i$  的成对比较阵为：

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{3} & \frac{1}{8} \\ 3 & 1 & \frac{1}{3} \\ 8 & 3 & 1 \end{pmatrix} \quad B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ \frac{1}{2} & 1 & 2 \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \quad B_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 3 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 1 \end{pmatrix}$$

$$B_4 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ \frac{1}{3} & 1 & 1 \\ \frac{1}{4} & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad B_5 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \frac{1}{4} \\ 1 & 1 & \frac{1}{4} \\ 4 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

$i$	1	2	3	4	5
$\omega_{y_i}(x_1)$	0.082	0.595	0.429	0.633	0.166
$\omega_{y_i}(x_2)$	0.236	0.277	0.429	0.193	0.166
$\omega_{y_i}(x_3)$	0.682	0.129	0.142	0.175	0.668
$\lambda_m^{(i)}$	3.002	3.005	3	3.009	3
$CI^{(i)}$	0.001	0.003	0	0.005	0

由于  $n = 3$  时,  $CR = 0.58$ , 故  $CI^{(i)}/CR < 0.1$   
( $i = 1, 2, \dots, 5$ ), 所以  $B_1 \sim B_5$  的不一致性都可以接受。



由于  $n = 3$  时,  $CR = 0.58$ , 故  $CI^{(i)}/CR < 0.1$   
( $i = 1, 2, \dots, 5$ ), 所以  $B_1 \sim B_5$  的不一致性都可以接受。

最终目的是要得到  $x_1, x_2, x_3$  在  $Z$  中所占的比重。

$$\omega_2(x) = \{\omega_2(x_1), \omega_2(x_2), \omega_2(x_3)\}$$

$$\begin{aligned}\omega_2(x_1) &= \omega_y(x_1)' \cdot \omega_2(y) \\ &= 0.082 \times 0.46 + 0.595 \times 0.26 + \\ &\quad 0.429 \times 0.05 + 0.633 \times 0.1 + 0.166 \times 0.13 \\ &= 0.299\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\omega_2(x_2) &= \omega_y(x_2)' \cdot \omega_2(y) \\ &= (0.236, 0.277, 0.429, 0.193, 0.166) \cdot \\ &\quad (0.46, 0.26, 0.05, 0.10, 0.13)' \\ &= 0.245 \\ \omega_2(x_3) &= \omega_y(x_3)' \cdot \omega_2(y) = 0.456 \\ \therefore \omega_2(x) &= \{0.299, 0.245, 0.456\}'\end{aligned}$$

$x_3$  为第一选择。



一般地, 设已知

$$\omega_2(y) = (\omega_2(y_1), \dots, \omega_2(y_n))'$$

$$\omega_{y_i}(x) = (\omega_{y_i}(x_1), \dots, \omega_{y_i}(x_m))'$$

则

$$\begin{aligned}\omega_2(x_j) &= \omega_y(x_j) \cdot \omega_2(y) \\ &= (\omega_{y_1}(x_j), \dots, \omega_{y_n}(x_j)) \cdot \\ &\quad (\omega_2(y_1), \dots, \omega_2(y_n))'\end{aligned}$$

最终  $\omega_2(x) = (\omega_2(x_1), \dots, \omega_2(x_n))'$ .


# 合作对策模型



## 合作对策模型

### 三城镇的污水处理方案

沿河有三镇，污水需处理后才能排入河中，三镇或者单独建厂，或者联合建厂，用管道将污水集中处理。 $Q$  表示污水量（吨/秒）， $L$  表示管道长度（公里），按照经验公式，污水处理厂的建厂费用为  $C_T = 730 Q^{0.712}$ ，铺设管道的费用为  $C_P = 6.6 Q^{0.51} L$ 。已知三镇的污水量分别为  $Q_1 = 5$ ,  $Q_2 = 3$ ,  $Q_3 = 5$ 。试从节约总投资的角度为三镇制定污水处理方案。



## Shapley 公理

Shapley 公理 设  $v$  是定义在  $I = \{1, 2, \dots, n\}$  上的特征函数,  $\phi = (\varphi_1(v), \dots, \varphi_n(v))$  是合作对策。

公理 1 设  $\pi$  是  $I$  的一个排列, 对于  $I$  的任一子集  $S = \{i_1, i_2, \dots, i_s\}$ ,  $\pi S = \{\pi(i_1), \dots, \pi(i_s)\}$ , 若再定义一个特征函数  $v'(S) = v(\pi S)$ , 则对于每一个  $\{i\} \in I$ ,


$$\varphi_i(v') = \varphi_{\pi(i)}(v)$$

## 公理 2

$$\sum_{i=1}^n \varphi_i(v) = v(I)$$

即各人分配之和等于合作获利。

公理 3 如果对于所有包含  $\{i\}$  的子集  $S$ ，都有  $v(S - \{i\}) = v(S)$ ，则  $\varphi_i(v) = 0$ .



公理 3 如果对于所有包含  $\{i\}$  的子集  $S$ ，都有  $v(S - \{i\}) = v(S)$ ，则  $\varphi_i(v) = 0$ 。

公理 3 表示，如果  $\{i\}$  对于每一个合作都没有贡献，他不应从全体的合作获利中得到报酬。



公理 4 若  $v'$  也是定义在  $I$  的特征函数, 且  $\omega = v + v'$ ,  
则  $\phi(\omega) = \phi(v) + \phi(v')$

公理 4 若  $v'$  也是定义在  $I$  的特征函数, 且  $\omega = v + v'$ ,  
则  $\phi(\omega) = \phi(v) + \phi(v')$

公理 4 表示, 当  $n$  个人同时进行两项合作时, 合作获利应为两合作获利之和。