

# COMP111 - Exercise 6 Answers

Ben Weston

November 19, 2020

1. (a) This statement is false as not all of the statements are subsets of  $p_3$ :

$p_1$	$p_2$	$p_3$	$(p_1 \Rightarrow p_2)$	$(p_2 \Rightarrow p_3)$
0	0	0	1	1
0	0	1	1	1
0	1	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

3. (d)  $S = \{HHHH, HHHT, HHTH, HHTT, HTHH, HTHT, HTTH, HTTT, THHH, THHT, THTH, THTT, TTHH, TTHT, TTTH, TTTT\}$  where  $P(x) = \frac{1}{16}$  for all  $x \in S$ .  
 $P(T \geq 3|S')$  where  $S' = \{HTHH, HTHT, HTTH, HTTT, THHH, THHT, THTH, THTT, TTHH, TTHT, TTTH, TTTT\}$

Therefore the probability is  $\frac{\frac{5}{16}}{\frac{12}{16}} = \frac{5}{12}$

- (e) No, as there are only four coins, two of which are high. In order for three coins to come up tails then at least one must be a low coin. Therefore if you know that three coins are tails you can conclude that at least one value coin was chosen proving that they are not independent.