

## 2017 年全国硕士研究生入学统一考试数学二试题解析

一、选择题：1~8 小题，每小题 4 分，共 32 分，下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求的，请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上。

(1) 若函数  $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{ax}, & x > 0 \\ b, & x \leq 0 \end{cases}$  在  $x = 0$  处连续，则 ( )

- (A)  $ab = \frac{1}{2}$       (B)  $ab = -\frac{1}{2}$       (C)  $ab = 0$       (D)  $ab = 2$

【答案】A

【解析】 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{ax} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2}x}{ax} = \frac{1}{2a}$ ,  $\because f(x)$  在  $x = 0$  处连续  $\therefore \frac{1}{2a} = b \Rightarrow ab = \frac{1}{2}$ . 选 A.

(2) 设二阶可导函数  $f(x)$  满足  $f(1) = f(-1) = 1, f(0) = -1$  且  $f''(x) > 0$ , 则 ( )

- (A)  $\int_{-1}^1 f(x) dx > 0$       (B)  $\int_{-1}^1 f(x) dx < 0$   
(C)  $\int_{-1}^0 f(x) dx > \int_0^1 f(x) dx$       (D)  $\int_{-1}^0 f(x) dx < \int_0^1 f(x) dx$

【答案】B

【解析】

$f(x)$  为偶函数时满足题设条件，此时  $\int_{-1}^0 f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx$ , 排除 C, D.

取  $f(x) = 2x^2 - 1$  满足条件，则  $\int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^1 (2x^2 - 1) dx = -\frac{2}{3} < 0$ , 选 B.

(3) 设数列  $\{x_n\}$  收敛，则 ( )

- (A) 当  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin x_n = 0$  时， $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$       (B) 当  $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + \sqrt{|x_n|}) = 0$  时， $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$   
(C) 当  $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + x_n^2) = 0$  时， $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$       (D) 当  $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + \sin x_n) = 0$  时， $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$

【答案】D

【解析】特值法：(A) 取  $x_n = \pi$ , 有  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin x_n = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \pi$ , A 错；

取  $x_n = -1$ , 排除 B, C. 所以选 D.

(4) 微分方程的特解可设为

- (A)  $Ae^{2x} + e^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$       (B)  $Axe^{2x} + e^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$   
(C)  $Ae^{2x} + xe^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$       (D)  $Axe^{2x} + e^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$

【答案】A

【解析】特征方程为:  $\lambda^2 - 4\lambda + 8 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = 2 \pm 2i$

$\therefore f(x) = e^{2x}(1 + \cos 2x) = e^{2x} + e^{2x} \cos 2x \therefore y_1^* = Ae^{2x}, y_2^* = xe^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x),$

故特解为:  $y^* = y_1^* + y_2^* = Ae^{2x} + xe^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x),$  选 C.

(5) 设  $f(x, y)$  具有一阶偏导数, 且对任意的  $(x, y)$ , 都有  $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} > 0, \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} < 0$ , 则


(A)  $f(0, 0) > f(1, 1)$  (B)  $f(0, 0) < f(1, 1)$  (C)  $f(0, 1) > f(1, 0)$  (D)  $f(0, 1) < f(1, 0)$

【答案】C

【解析】 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} > 0, \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} < 0 \Rightarrow f(x, y)$  是关于  $x$  的单调递增函数, 是关于  $y$  的单调递减函数,

所以有  $f(0, 1) < f(1, 1) < f(1, 0)$ , 故答案选 D.

(6) 甲乙两人赛跑, 计时开始时, 甲在乙前方 10 (单位: m) 处, 图中实线表示甲的速度曲线  $v = v_1(t)$  (单位: m/s), 虚线表示乙的速度曲线  $v = v_2(t)$ , 三块阴影部分面积的数值依次为 10, 20, 3, 计时开始后乙追上甲的时刻记为  $t_0$  (单位: s), 则 ( )



(A)  $t_0 = 10$  (B)  $15 < t_0 < 20$  (C)  $t_0 = 25$  (D)  $t_0 > 25$

【答案】B

【解析】从 0 到  $t_0$  这段时间内甲乙的位移分别为  $\int_0^{t_0} v_1(t)dt, \int_0^{t_0} v_2(t)dt$ , 则乙要追上甲, 则

$\int_0^{t_0} v_2(t) - v_1(t)dt = 10$ , 当  $t_0 = 25$  时满足, 故选 C.

(7) 设  $A$  为三阶矩阵,  $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$  为可逆矩阵, 使得  $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$ , 则  $A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = ( )$

(A)  $\alpha_1 + \alpha_2$  (B)  $\alpha_2 + 2\alpha_3$  (C)  $\alpha_2 + \alpha_3$  (D)  $\alpha_1 + 2\alpha_2$

【答案】 B

【解析】

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow AP = P \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix} = \alpha_2 + 2\alpha_3,$$

因此 B 正确。

(8) 设矩阵  $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ , 则 ( )

(A)  $A$  与  $C$  相似,  $B$  与  $C$  相似

(B)  $A$  与  $C$  相似,  $B$  与  $C$  不相似

(C)  $A$  与  $C$  不相似,  $B$  与  $C$  相似

(D)  $A$  与  $C$  不相似,  $B$  与  $C$  不相似

【答案】 B

【解析】 由  $|\lambda E - A| = 0$  可知  $A$  的特征值为 2, 2, 1,

因为  $3 - r(2E - A) = 1$ ,  $\therefore A$  可相似对角化, 即  $A \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

由  $|\lambda E - B| = 0$  可知  $B$  特征值为 2, 2, 1.

因为  $3 - r(2E - B) = 2$ ,  $\therefore B$  不可相似对角化, 显然  $C$  可相似对角化,  $\therefore A \sim C$ , 但  $B$  不相似于  $C$ .

二、填空题: 9-14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分, 请将答案写在答题纸指定位置上.

(9) 曲线  $y = x \left( 1 + \arcsin \frac{2}{x} \right)$  的斜渐近线方程为 \_\_\_\_\_

【答案】  $y = x + 2$

【解析】

$$\because \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( 1 + \arcsin \frac{2}{x} \right) = 1, \lim_{x \rightarrow \infty} (y - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} x \arcsin \frac{2}{x} = 2,$$

$$\therefore y = x + 2$$

(10) 设函数  $y = y(x)$  由参数方程  $\begin{cases} x = t + e^t \\ y = \sin t \end{cases}$  确定, 则  $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}$

【答案】  $-\frac{1}{8}$

【解析】

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dt} &= \cos t, \frac{dx}{dt} = 1 + e^t \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{\cos t}{1 + e^t} \\ \Rightarrow \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{\left(\frac{\cos t}{1 + e^t}\right)'}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-\sin t(1 + e^t) - \cos t e^t}{(1 + e^t)^2} \Rightarrow \frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{t=0} = -\frac{1}{8}\end{aligned}$$

(11)  $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}$

【答案】 1

【解析】

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2} dx &= -\int_0^{+\infty} \ln(1+x) d\frac{1}{1+x} \\ &= -\left[ \frac{\ln(1+x)}{1+x} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x)^2} dx \right] \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x)^2} dx = 1.\end{aligned}$$

(12) 设函数  $f(x, y)$  具有一阶连续偏导数, 且  $df(x, y) = ye^y dx + x(1+y)e^y dy$ ,  $f(0, 0) = 0$ , 则  $f(x, y) = \underline{\hspace{2cm}}$

【答案】  $xye^y$

【解析】  $f'_x = ye^y, f'_y = x(1+y)e^y, f(x, y) = \int ye^y dx = xye^y + c(y)$ , 故

$$f'_y = xe^y + xye^y + c'(y) = xe^y + xye^y,$$

因此  $c'(y) = 0$ , 即  $c(y) = C$ , 再由  $f(0, 0) = 0$ , 可得  $f(x, y) = xye^y$ .

【答案】

【解析】

(13)  $\int_0^1 dy \int_y^1 \frac{\tan x}{x} dx = \underline{\hspace{2cm}}$

【答案】  $\ln \cos 1$ .

【解析】 交换积分次序:

$$\int_0^1 dy \int_y^1 \frac{\tan x}{x} dx = \int_0^1 dx \int_0^x \frac{\tan x}{x} dy = \int_0^1 \tan x dx = \ln \cos 1.$$

(14) 设矩阵  $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & a \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix}$  的一个特征向量为  $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ , 则  $a = \underline{\hspace{2cm}}$

【答案】-1

【解析】设  $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ ，由题设知  $A\alpha = \lambda\alpha$ ，故

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & a \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 3+2a \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \\ \lambda \\ 2\lambda \end{pmatrix}$$

故  $a = -1$ 。

三、解答题：15—23 小题，共 94 分。请将解答写在答题纸指定位置上。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

(15) (本题满分 10 分) 求极限  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \sqrt{x-te^t} dt}{\sqrt{x^3}}$

【答案】  $\frac{2}{3}$

【解析】  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sqrt{x-te^t} dt}{\sqrt{x^3}}$ ，令  $x-t=u$ ，则有

$$\int_0^x \sqrt{x-te^t} dt = -\int_x^0 \sqrt{ue^{x+u}} du = \int_0^x \sqrt{ue^{x+u}} du$$

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sqrt{ue^{x+u}} du}{x^{\frac{3}{2}}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \int_0^x \sqrt{ue^u} du}{x^{\frac{3}{2}}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sqrt{ue^u} du}{x^{\frac{3}{2}}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x}e^x}{\frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}} = \frac{2}{3}$$

(16) (本题满分 10 分) 设函数  $f(u, v)$  具有 2 阶连续偏导数， $y = f(e^x, \cos x)$ ，求  $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}$ ， $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0}$

【答案】  $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = f'_1(1, 1)$ ， $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} = f''_{11}(1, 1)$ ，

【解析】

$$y = f(e^x, \cos x) \xrightarrow{x=0} y(0) = f(1, 1)$$

$$\Rightarrow \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = (f'_1 e^x + f'_2 (-\sin x)) \Big|_{x=0} = f'_1(1, 1) \cdot 1 + f'_2(1, 1) \cdot 0 = f'_1(1, 1)$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 y}{dx^2} = f''_{11} e^{2x} + f''_{12} e^x (-\sin x) + f''_{21} e^x (-\sin x) + f''_{22} \sin^2 x + f'_1 e^x - f'_2 \cos x$$

$$\Rightarrow \left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} = f''_{11}(1, 1) + f'_1(1, 1) - f'_2(1, 1)$$

结论:

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = f'_1(1,1)$$

$$\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{x=0} = f''_{11}(1,1) + f'_1(1,1) - f'_2(1,1)$$

(17) (本题满分 10 分) 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln \left( 1 + \frac{k}{n} \right)$

【答案】  $\frac{1}{4}$

【解析】

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln \left( 1 + \frac{k}{n} \right) = \int_0^1 x \ln(1+x) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \ln(1+x) dx^2 = \frac{1}{2} (\ln(1+x) \cdot x^2 \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x^2 - 1 + 1}{1+x} dx) = \frac{1}{4}$$

(18) (本题满分 10 分) 已知函数  $y(x)$  由方程  $x^3 + y^3 - 3x + 3y - 2 = 0$  确定, 求  $y(x)$  的极值

【答案】 极大值为  $y(1) = 1$ , 极小值为  $y(-1) = 0$

【解析】

两边求导得:

$$3x^2 + 3y^2 y' - 3 + 3y' = 0 \quad (1)$$

令  $y' = 0$  得  $x = \pm 1$

$$\text{对 (1) 式两边关于 } x \text{ 求导得} \quad 6x + 6y(y')^2 + 3y^2 y'' + 3y'' = 0 \quad (2)$$

将  $x = \pm 1$  代入原题给的等式中, 得  $\begin{cases} x=1 \\ y=1 \end{cases} \text{ or } \begin{cases} x=-1 \\ y=0 \end{cases}$ ,

将  $x=1, y=1$  代入 (2) 得  $y''(1) = -1 < 0$

将  $x=-1, y=0$  代入 (2) 得  $y''(-1) = 2 > 0$

故  $x=1$  为极大值点,  $y(1) = 1$ ;  $x=-1$  为极小值点,  $y(-1) = 0$

(19) (本题满分 10 分) 设函数  $f(x)$  在区间  $[0,1]$  上具有 2 阶导数, 且  $f(1) > 0, \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0$ , 证明:

(I) 方程  $f(x) = 0$  在区间  $(0,1)$  内至少存在一个实根;

(II) 方程  $f(x)f'(x) + (f'(x))^2 = 0$  在区间  $(0,1)$  内至少存在两个不同实根。

【答案】

【解析】

(I)  $f(x)$  二阶导数,  $f(1) > 0, \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0$

解: 1) 由于  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0$ , 根据极限的保号性得

$\exists \delta > 0, \forall x \in (0, \delta)$  有  $\frac{f(x)}{x} < 0$ , 即  $f(x) < 0$

进而  $\exists x_0 \in (0, \delta)$  有  $f(x_0) < 0$

又由于  $f(x)$  二阶可导, 所以  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上必连续

那么  $f(x)$  在  $[\delta, 1]$  上连续, 由  $f(\delta) < 0, f(1) > 0$  根据零点定理得:

至少存在一点  $\xi \in (\delta, 1)$ , 使  $f(\xi) = 0$ , 即得证

(II) 由 (I) 可知  $f(0) = 0, \exists \xi \in (0, 1)$ , 使  $f(\xi) = 0$ , 令  $F(x) = f(x)f'(x)$ , 则  $f(0) = f(\xi) = 0$

由罗尔定理  $\exists \eta \in (0, \xi)$ , 使  $f'(\eta) = 0$ , 则  $F(0) = F(\eta) = F(\xi) = 0$ ,

对  $F(x)$  在  $(0, \eta), (\eta, \xi)$  分别使用罗尔定理:

$\exists \eta_1 \in (0, \eta), \eta_2 \in (\eta, \xi)$  且  $\eta_1, \eta_2 \in (0, 1), \eta_1 \neq \eta_2$ , 使得  $F'(\eta_1) = F'(\eta_2) = 0$ , 即

$F'(x) = f(x)f''(x) + (f'(x))^2 = 0$  在  $(0, 1)$  至少有两个不同实根。

得证。

(20) (本题满分 11 分) 已知平面区域  $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2y\}$ , 计算二重积分  $\iint_D (x+1)^2 dx dy$ 。

【答案】  $\frac{5\pi}{4}$

【解析】  $\iint_D (x+1)^2 dx dy = \iint_D (x^2 + 1) dx dy = 2 \iint_D x^2 dx dy + \iint_D dx dy = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\sin\theta} r^2 \cos^2 \theta dr + \pi = \frac{5\pi}{4}$

(21) (本题满分 11 分) 设  $y(x)$  是区间  $\left(0, \frac{3}{2}\right)$  内的可导函数, 且  $y(1) = 0$ , 点  $P$  是曲线  $L: y = y(x)$  上任意一点,

$L$  在点  $P$  处的切线与  $y$  轴相交于点  $(0, Y_p)$ , 法线与  $x$  轴相交于点  $(X_p, 0)$ , 若  $X_p = Y_p$ , 求  $L$  上点的坐标  $(x, y)$  满足的方程。

【答案】

【解析】 设  $p(x, y(x))$  的切线为  $Y - y(x) = y'(x)(X - x)$ , 令  $X = 0$  得  $Y_p = y(x) - y'(x)x$ , 法线

$Y - y(x) = -\frac{1}{y'(x)}(X - x)$ , 令  $Y = 0$  得  $X_p = x + y(x)y'(x)$ 。由  $X_p = Y_p$  得  $y - xy'(x) = x + yy'(x)$ , 即

$\left(\frac{y}{x}+1\right)y'(x)=\frac{y}{x}-1$ 。令  $\frac{y}{x}=u$ ，则  $y=ux$ ，按照齐次微分方程的解法不难解出

$$\frac{1}{x}\ln(u^2+1)+\arctan u=-\ln|x|+C,$$

(22) (本题满分 11 分) 设 3 阶矩阵  $A=(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$  有 3 个不同的特征值，且  $\alpha_3=\alpha_1+2\alpha_2$ 。

(I) 证明:  $r(A)=2$

(II) 若  $\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$ ，求方程组  $Ax=\beta$  的通解。

【答案】(I) 略; (II) 通解为  $k\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, k \in R$

【解析】

(I) 证明: 由  $\alpha_3=\alpha_1+2\alpha_2$  可得  $\alpha_1+2\alpha_2-\alpha_3=0$ ，即  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性相关，

因此， $|A|=|\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3|=0$ ，即 A 的特征值必有 0。

又因为 A 有三个不同的特征值，则三个特征值中只有 1 个 0，另外两个非 0。

且由于 A 必可相似对角化，则可设其对角矩阵为  $\Lambda=\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & 0 \end{pmatrix}, \lambda_1 \neq \lambda_2 \neq 0$

$$\therefore r(A)=r(\Lambda)=2$$

(II) 由 (I)  $r(A)=2$ ，知  $3-r(A)=1$ ，即  $Ax=0$  的基础解系只有 1 个解向量，

由  $\alpha_1+2\alpha_2-\alpha_3=0$  可得  $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}=A\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}=0$ ，则  $Ax=0$  的基础解系为  $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ ，

又  $\beta=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$ ，即  $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}=A\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}=\beta$ ，则  $Ax=\beta$  的一个特解为  $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，

综上， $Ax=\beta$  的通解为  $k\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, k \in R$

(23) (本题满分 11 分) 设二次型  $f(x_1, x_2, x_3)=2x_1^2-x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2-8x_1x_3+2x_2x_3$  在正交变换  $X=QY$  下的标

准型  $\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2$ ，求  $a$  的值及一个正交矩阵  $Q$ 。



无水印版由【公众号：小盆考研】免费提供

更多考研数学视频文档资料，【公众号：小盆考研】，回复【数学】免费获取

更多考研押题资料视频，【公众号：小盆考研】免费提供

更多考研数学预测卷，【公众号：小盆考研】，回复【数学预测】免费获取

无水印版由【公众号：小盆考研】免费提供

【答案】  $a=2; Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}, f = \underline{\underline{x=Qy}} - 3y_1^2 + 6y_2^2$

【解析】

$$f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X, \text{ 其中 } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -4 \\ 1 & -1 & 1 \\ -4 & 1 & a \end{pmatrix}$$

由于  $f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X$  经正交变换后，得到的标准形为  $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2$ ,

$$\text{故 } r(A) = 2 \Rightarrow |A| = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 2 & 1 & -4 \\ 1 & -1 & 1 \\ -4 & 1 & a \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow a = 2,$$

将  $a=2$  代入，满足  $r(A)=2$ ，因此  $a=2$  符合题意，此时  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -4 \\ 1 & -1 & 1 \\ -4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ ，则

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 & 4 \\ -1 & \lambda + 1 & -1 \\ 4 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \lambda_1 = -3, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 6,$$

由  $(-3E - A)x = 0$ ，可得 A 的属于特征值 -3 的特征向量为  $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ；

由  $(6E - A)x = 0$ ，可得 A 的属于特征值 6 的特征向量为  $\alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

由  $(0E - A)x = 0$ ，可得 A 的属于特征值 0 的特征向量为  $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

令  $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ ，则  $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -3 & & \\ & 6 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$ ，由于  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  彼此正交，故只需单位化即可：

$$\beta_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1)^T, \beta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1)^T, \beta_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^T, ,$$

$$\text{则 } Q = (\beta_1 \ \beta_2 \ \beta_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}, \quad Q^T A Q = \begin{pmatrix} -3 & & \\ & 6 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$$

$$f(x_1, x_2, x_3) \stackrel{x=Qy}{=} -3y_1^2 + 6y_2^2$$

如果想要了解更多，广大研友们也可加入 2017 考研复试交流群（118146590）和大家一起交流考研心

路历程。也可将自己考研的经验传授给学弟学妹们 2018 考研交流总群（337587371），希望他们在

2018 年金榜题名。