

## 수치해석 | 과제 #4

컴퓨터소프트웨어학부 2018008559 신상원

본과제에 작성된 내용은 아래에 작성한 바와 같이 강의 참고문헌과 도움을 받거나 동료들과 상의는 하였지만 기본적으로는 본인 스스로 해결하고 작성한 것만을 서막합니다. 서막이 거짓임이 밝혀지면 F학점을 받는 것에 동의합니다.  
2022/5/9 신상원 실생원 참고문헌: 교재

### 4.3 - #25.

degree of precision  $n$ :

$$E(x^k) = 0 \text{ for each } k=0,1,\dots,n \text{ \& } E(x^{n+1}) \neq 0$$

$\Leftrightarrow E(P(x)) = 0$  for all polynomials  $P(x)$  of degree  $k=0,1,\dots,n$  but  $E(P(x)) \neq 0$  for some polynomial  $P(x)$  of degree  $n+1$ .

$(\Rightarrow)$  Let  $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$   
최대  $n$ 차 다항식.

$$\begin{aligned} E(P(x)) &= E(a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0) \\ &= a_n E(x^n) + a_{n-1} E(x^{n-1}) + \dots + E(a_0) \\ &= 0 + 0 + 0 + \dots + 0 \\ &= 0 \quad (\because \text{degree of precision } n) \end{aligned}$$

Let  $P_{n+1}(x) = a_{n+1} x^{n+1} + P(x)$ ,  $a_{n+1} \neq 0$ .  
 $n+1$ 차 다항식

$$\begin{aligned} E(P_{n+1}(x)) &= E(a_{n+1} x^{n+1}) + 0 \\ &= a_{n+1} E(x^{n+1}) \neq 0 \end{aligned}$$

$\therefore n$ 차 이하 모든 다항식  $P(x)$  에게

$$E(P(x)) = 0 \text{ 이고}$$

어떤  $n+1$ 차 다항식  $P(x)$  에게서

$$E(P(x)) \neq 0 \text{ 이다.}$$

$(\Leftarrow)$   $n$ 차 이하 다항식에서  $E(P(x)) = 0$   
이므로

$$\therefore E(x^k) = 0 \text{ for each } k=0,1,\dots,n$$

Let  $P_{n+1}(x) = a_{n+1} x^{n+1} + a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$   
 $a_{n+1} \neq 0$  인  $n+1$ 차 다항식 생각.  
가정에 의해  $E(P_{n+1}(x)) \neq 0$ .

이제  $E(x^{n+1})$  을 구해보면.

$$x^{n+1} = \frac{P_{n+1}(x)}{a_{n+1}} - \frac{a_n x^n}{a_{n+1}} - \frac{a_{n-1} x^{n-1}}{a_{n+1}} - \dots - \frac{a_0}{a_{n+1}}$$

$$\begin{aligned} E(x^{n+1}) &= \frac{E(P_{n+1}(x))}{a_{n+1}} - \frac{a_n}{a_{n+1}} E(x^n) - \dots - E\left(\frac{a_0}{a_{n+1}}\right) \\ &= \frac{E(P_{n+1}(x))}{a_{n+1}} - 0 - 0 - \dots = \frac{E(P_{n+1}(x))}{a_{n+1}} \neq 0 \end{aligned}$$

$$\therefore E(x^{n+1}) \neq 0$$

$\therefore$  degree of Precision 은  $n$ olch.

### #26.

error term 이  $K f^{(k)}(\xi)$  이므로  
 $f(x)$  가 3차 다항식 일때까지는  
exact Value 를 가진다.

$$\int_{x_0}^{x_2} x \, dx = a_0 x_0 + a_1 x_1 + a_2 x_2$$

$$\int_{x_0}^{x_2} x^2 \, dx = a_0 x_0^2 + a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2$$

$$\int_{x_0}^{x_2} x^3 \, dx = a_0 x_0^3 + a_1 x_1^3 + a_2 x_2^3$$

$$x_1 = x_0 + h, \quad x_2 = x_0 + 2h.$$

$$\frac{x_2^2 - x_0^2}{2} = a_0 x_0 + a_1 x_1 + a_2 x_2$$

$$\frac{x_0^2 + 4x_0h + 4h^2 - x_0^2}{2} = 2x_0h + 2h^2$$

$$= a_0 x_0 + a_1 x_0 + a_1 h + a_2 x_0 + 2a_2 h$$

$$2hx_0 + 2h^2 = (a_0 + a_1 + a_2)x_0 + (a_1 + 2a_2)h$$

$$\therefore a_0 + a_1 + a_2 = 2h, \quad a_1 + 2a_2 = 2h$$

$$\frac{x_0^3 + 8h^3 + 12x_0h^2 + 6x_0^2h}{3} = a_0 x_0^2 + a_1 (x_0h)^2 + a_2 (x_0 + 2h)^2$$

$$\frac{8}{3}h^3 + 4h^2 x_0 + 2hx_0^2 = (a_0 + a_2)x_0^2$$

$$+ (2ha_1 + 4ha_2)x_0$$

$$+ a_1 h^2 + a_2 4h^2$$

$$\therefore a_1 + 4a_2 = \frac{8}{3}h$$

$$\rightarrow a_0 = \frac{h}{3}, \quad a_1 = \frac{4}{3}h, \quad a_2 = \frac{h}{3}$$

$f(x) = x^4$  일 때  $f^{(4)}(\xi)$ 가 상수 이므로  $K$ 값 결정 가능

$$\int_{x_0}^{x_2} x^4 dx = \frac{x_2^5 - x_0^5}{5} = \frac{(x_0 + 2h)^5 - x_0^5}{5} = a_0 x_0^4 + a_1 (x_0h)^4 + a_2 (x_0 + 2h)^4 + 24K$$

$$\text{상수 } K \text{ 이면 : } \frac{(2h)^5}{5} = \frac{4}{3}h^4 + \frac{h}{3}(2h)^4 + 24K$$


$$\frac{32}{5}h^5 = \frac{4}{3}h^5 + \frac{16}{3}h^5 + 24K$$

$$K = -\frac{1}{90}h^5$$

$$\therefore \int_{x_0}^{x_2} f(x) dx = \frac{h}{3} f(x_0) + \frac{4}{3} h f(x_1) + \frac{h}{3} f(x_2) - \frac{h^5}{90} f^{(4)}(\xi)$$


4.4 #10

by mid point rule



$$f(0) \times 2 = 12, \quad f(0) = 6$$

by composite mid point rule  $n=2$




$$f(-0.5) + f(0.5) = 5$$

$$f(-0.5) = f(0.5) = 1$$

$$f(-0.5) = 2$$

$$f(0.5) = 3$$

by composite Simpson's rule



$$\frac{1}{3}(f(-1) + 4f(0) + f(1)) = 6$$

$$f(-1) + f(1) = -6$$

$$f(-1) = f(1)$$

$$f(-1) = -3 = f(1)$$

$$\therefore f(-1) = -3$$

$$f(-0.5) = 2$$

$$f(0) = 6$$

$$f(0.5) = 3$$

$$f(1) = -3$$



4.5-#11

$$R_{11}=8, R_{22}=\frac{16}{3}, R_{33}=\frac{208}{45}$$

$R_{11}$

$R_{21} R_{22}$

$R_{31} R_{32} R_{33}$

$\frac{1}{h^2} \frac{1}{h^2} \frac{1}{h^2}$

$$R_{22} = R_{21} + \frac{1}{3}(R_{21} - R_{11})$$

$$\frac{16}{3} = \frac{4}{3}R_{21} - \frac{8}{3}, R_{21} = 6$$

$$R_{33} = R_{32} + \frac{1}{15}(R_{32} - R_{22})$$

$$\frac{208}{45} = \frac{16}{15}R_{32} - \frac{16}{45}, R_{32} = \frac{14}{3}$$

$$R_{32} = R_{31} + \frac{1}{3}(R_{31} - R_{21})$$

$$\frac{14}{3} = \frac{4}{3}R_{31} - \frac{6}{3}, R_{31} = 5$$

4.6-#3.

$$(a) \left| \int_1^{1.5} x^2 \ln x dx - 2x \right| < 10^{-3}$$

$$S(1, 1.5) = \frac{1}{3} (f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2))$$

$$h=0.25 = 0.1922453074$$

$$S(1, 1.25) = 0.03931243404$$

$$S(1.25, 1.5) = 0.1528860264$$

$$|S(1, 1.5) - S(1, 1.25) - S(1.25, 1.5)|$$

$$= +1.315304 \times 10^{-5}$$

$$< 15 \varepsilon \text{ 이므로}$$

$$0.168669 \times 10^{-2} \varepsilon \text{ 이고 이는}$$

이미 충분히 작기 때문에 의미한다.

$$\therefore \int_1^{1.5} x^2 \ln x dx \approx S(1, 1.25) + S(1.25, 1.5)$$

$$= 0.1922584604$$

$$(b) \int_0^1 x^2 e^{-x} dx$$

$$S(0, 1) = 0.1624016835$$

$$S(0, \frac{1}{2}) = 0.02886107172$$

$$S(\frac{1}{2}, 1) = 0.1318614041$$

$$|S(0, 1) - S(0, \frac{1}{2}) - S(\frac{1}{2}, 1)| = 1.61920768 \times 10^{-3}$$

$$\rightarrow \left| \int_0^1 x^2 e^{-x} dx - S(0, \frac{1}{2}) - S(\frac{1}{2}, 1) \right| < 1.19491 \times 10^{-4}$$

$$\therefore \int_0^1 x^2 e^{-x} dx \approx S(0, \frac{1}{2}) + S(\frac{1}{2}, 1)$$

$$= 0.1601224758$$

$$(c) \int_0^{0.35} \frac{2}{x^2-4} dx$$

$$S(0, 0.35) = -0.1768215692$$

$$S(0, 0.175) = -0.087712438286$$

$$S(0.175, 0.35) = -0.08909573627$$

$$|S(0, 0.35) - S(0, 0.175) - S(0.175, 0.35)| = 1.45007 \times 10^{-6}$$

$$\rightarrow \left| \int_0^{0.35} \frac{2}{x^2-4} dx - S(0, 0.175) - S(0.175, 0.35) \right| < 9.667 \times 10^{-5}$$

$$\therefore \int_0^{0.35} \frac{2}{x^2-4} dx \approx S(0, 0.175) + S(0.175, 0.35)$$

$$= -0.1768201191$$

$$(d) \int_0^{\frac{\pi}{4}} x^2 \sin x dx$$

$$S(0, \frac{\pi}{4}) = 0.08199566891$$

$$S(0, \frac{\pi}{8}) = 0.005831519116$$

$$S(\frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{4}) = 0.08281162423$$

$$|S(0, \frac{\pi}{4}) - S(0, \frac{\pi}{8}) - S(\frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{4})| = 7.1353 \times 10^{-5}$$

$$\rightarrow \left| \int_0^{\frac{\pi}{4}} x^2 \sin x dx - S(0, \frac{\pi}{8}) - S(\frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{4}) \right| < 4.756 \times 10^{-5}$$

$$\therefore \int_0^{\frac{\pi}{4}} x^2 \sin x \, dx \approx S(0, \frac{\pi}{8}) + S(\frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{4})$$

$$= 0.08870920395$$

4.7 - #11

$$\int_{-1}^1 f(x) \, dx = a f(-1) + b f(1) + c f'(-1) + d f'(1)$$

$f(x)$ 가 모든 함수까지 exact value

$$\int_{-1}^1 x \, dx = \left[ \frac{x^2}{2} \right]_{-1}^1 = 0 = -a + b + c + d$$

$$a = b + c + d \quad \text{--- (1)}$$

$$\int_{-1}^1 x^2 \, dx = \left[ \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 = \frac{2}{3} = a + b - 2c + 2d$$

$$a + b - 2c + 2d = \frac{2}{3} \quad \text{--- (2)}$$

$$\int_{-1}^1 x^3 \, dx = 0 = -a + b + 3c + 3d$$

$$a = b + 3c + 3d \quad \text{--- (3)}$$

$$\int_{-1}^1 1 \, dx = 2 = a + b$$

$$a + b = 2 \quad \text{--- (4)}$$

$$c + d = 0 \quad (\text{1 and 3})$$

$$\frac{4}{3} = 2c - 2d, \quad \frac{2}{3} = c - d \quad (\text{2 and 4})$$

$$c = \frac{1}{3}, \quad d = -\frac{1}{3}$$

$$a = 1, \quad b = 1$$

$$\therefore \int_{-1}^1 f(x) \, dx = f(-1) + f(1) + \frac{1}{3} f'(-1) - \frac{1}{3} f'(1)$$