

Az informatika logikai alapjai

10. feladatsor

1. Igazoljuk az implikációval kapcsolatos „kvantorkiemelés”-es szabályokat.

Tétel

Legyen $L^{(1)} = \langle LC, Var, Con, Term, Form \rangle$ egy **elsőrendű nyelv**, $A, B \in Form$ két formula és $x \in Var$ egy változó.

Ha $x \notin FreeVar(A)$, akkor

1. $A \supset \forall x B \Leftrightarrow \forall x (A \supset B)$
2. $\forall x B \supset A \Leftrightarrow \exists x (B \supset A)$

Ha $x \notin FreeVar(A)$, akkor

1. $A \supset \exists x B \Leftrightarrow \exists x (A \supset B)$
2. $\exists x B \supset A \Leftrightarrow \forall x (B \supset A)$

Definíció

Legyen $L^{(1)} = \langle LC, Var, Con, Term, Form \rangle$ egy tetszőleges **elsőrendű nyelv**.

Az $A \in Form$ formulát **prenex alakúnak nevezzük**, ha az alábbi két feltétel valamelyike teljesül:

1. az A formula kvantormentes, azaz sem a \forall sem a \exists kvantor nem szerepel benne;
2. az A formula $Q_1 x_1 Q_2 x_2 \dots Q_n x_n B$ ($n = 1, 2, \dots$) alakú, ahol
 - a. $B \in Form$ kvantormentes formula;
 - b. $x_1, x_2, \dots, x_n \in Var$ különböző változók;
 - c. $Q_1, Q_2, \dots, Q_n \in \{\forall, \exists\}$ kvantorok.

Megjegyzés

- A definíció értelmében ha az A formula kvantormentes, azaz egyetlen kvantor sem szerepel benne, akkor az A formula prenex alakú.

Például: Prenexformulák: $\neg P(x, x), \forall x \forall y (Q(x, y) \supset \neg P(x))$

Nem prenexformula: $\forall x \forall y Q(x, y) \supset \neg P(x)$

$$1. \neg \exists x A \Leftrightarrow \forall x \neg A$$

$$2. \neg \forall x A \Leftrightarrow \exists x \neg A$$

Ha $x \notin \text{FreeVar}(A)$, akkor

$$1. A \supset \forall x B \Leftrightarrow \forall x (A \supset B)$$

$$2. \forall x B \supset A \Leftrightarrow \exists x (B \supset A)$$

Ha $x \notin \text{FreeVar}(A)$, akkor

$$1. A \supset \exists x B \Leftrightarrow \exists x (A \supset B)$$

$$2. \exists x B \supset A \Leftrightarrow \forall x (B \supset A)$$

Hozzuk a

$$\forall x (\forall y Q(x, y) \supset \neg \exists x P(x)) \supset \forall y Q(x, y)$$

formulát prenex alakúra.

① Változóiban tiszta alakra hozás:

$$\forall v (\forall w Q(v, w) \supset \neg \exists z P(z)) \supset \forall y Q(x, y)$$

② De Morgan törvényeinek alkalmazása:

$$\forall v (\forall w Q(v, w) \supset \forall z \neg P(z)) \supset \forall y Q(x, y)$$

③ Kvantorkiemelés:

$$\forall v \exists w \forall z (\forall y (Q(v, w) \supset \neg P(z)) \supset \forall y Q(x, y))$$

④ Kvantorkiemelés:

$$\exists v \forall w \exists z \forall y ((Q(v, w) \supset \neg P(z)) \supset Q(x, y))$$

Ha $x \notin \text{FreeVar}(A)$, akkor

$$1. A \wedge \forall x B \Leftrightarrow \forall x (A \wedge B)$$

$$2. A \wedge \exists x B \Leftrightarrow \exists x (A \wedge B)$$

Ha $x \notin \text{FreeVar}(A)$, akkor

$$1. A \vee \forall x B \Leftrightarrow \forall x (A \vee B)$$

$$2. A \vee \exists x B \Leftrightarrow \exists x (A \vee B)$$

2.13. FELADAT. Határozzuk meg az alábbi formulák prenex alakját!

a) $\forall x P(x) \supset \neg \exists x P(x) \vee Q(x, c)$

b) $\exists x \forall y Q(x, y) \vee \exists x \forall y Q(x, y)$

h) $\forall x (\exists y Q(x, y) \supset \forall x P(x)) \supset \neg (\forall x P(x) \vee \forall x R(x))$

7.P.5. Logikai törvények-e az alábbi formulák?

(a) $\neg \exists x \neg P(x) \vee \forall x \neg P(x)$

(b) $\exists x P(x) \wedge \neg \forall x P(x)$

(c) $\exists x \forall y Q(x, y) \supset \forall y \exists x Q(x, y)$

(d) $\forall x \exists y Q(x, y) \supset \forall y \exists x Q(x, y)$

(e) $\forall x P(x) \vee \exists x R(x) \supset \forall x (P(x) \vee R(x))$

A c) és az e) formulákat vizsgáljuk meg a szemantikus tablók módszerével.

7.P.17. Ellenőrizzük, hogy helyesek-e az alábbi következtetések!

(d) Premisszák:

Minden hegymászó bátor. Minden hegymászó óvatos.

Konklúzió:

Van, aki bátor, de óvatos.

7.P.17. Ellenőrizzük, hogy helyesek-e az alábbi következtetések!

(e) Premisszák:

A vizsgán volt olyan feladat, amelyiket minden hallgató megoldott.

Konklúzió:

Tehát minden hallgató meg tudott oldani legalább egy feladatot.