

Lezione 36

Saverio Salzo*

30 novembre 2022

1 Teoremi di Cauchy e di de l'Hôpital

In questa sezione ci occupiamo di un metodo che può essere utile per risolvere limiti di forme indeterminate del tipo

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}, \quad \text{con} \quad \begin{cases} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty. \end{cases}$$

Cominciamo con un risultato preliminare.

Teorema 1.1 (di Cauchy). *Siano $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ due funzioni continue in $[a, b]$ e derivabili in $]a, b[$. Supponiamo che, per ogni $x \in]a, b[$: $g'(x) \neq 0$. Allora*

$$g(a) \neq g(b) \quad e \quad \exists c \in]a, b[\quad \text{tale che} \quad \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

Dimostrazione. Osserviamo prima di tutto che $g(a) \neq g(b)$ perché se fosse $g(a) = g(b)$, per il Teorema di Rolle, avrei che esisterebbe $x \in]a, b[$ con $g'(x) = 0$ e questo sarebbe in contrasto con le ipotesi. Notiamo adesso che la tesi è equivalente a provare che

$$(f(b) - f(a))g'(c) - f'(c)(g(b) - g(a)) = 0. \quad (1)$$

Questo suggerisce di definire la funzione $h: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ tale che

$$\forall x \in [a, b]: \quad h(x) = (f(b) - f(a))g(x) - f(x)(g(b) - g(a)).$$

Chiaramente h è continua in $[a, b]$ e derivabile in $]a, b[$ e inoltre

$$\begin{aligned} h(a) &= (f(b) - f(a))g(a) - f(a)(g(b) - g(a)) = f(b)g(a) - f(a)g(b) \\ &= (f(b) - f(a))g(b) - f(b)(g(b) - g(a)) = h(b). \end{aligned}$$

Allora, per il Teorema di Rolle, esiste $c \in]a, b[$ tale che $h'(c) = 0$, da cui segue la (1). \square

*DIAG, Sapienza Università di Roma (saverio.salzo@uniroma1.it).

Teorema 1.2 (di de l'Hôpital, caso 0/0). Sia I un intervallo di \mathbb{R} e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ un punto di accumulazione per I . Poniamo $I_{x_0} = I \setminus \{x_0\}$. Siano $f, g: I_{x_0} \rightarrow \mathbb{R}$ due funzioni derivabili in I_{x_0} e supponiamo che

$$(i) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 \text{ e } \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0.$$

$$(ii) \quad \forall x \in I_{x_0}: g'(x) \neq 0.$$

$$(iii) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Allora, per ogni $x \in I_{x_0}$: $g(x) \neq 0$ e $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = l$.

Dimostrazione. Evidentemente si possono avere due casi $x_0 \in \mathbb{R}$ e $x_0 = \pm\infty$. Consideriamo separatamente questi due casi.

Caso $x_0 \in \mathbb{R}$. In questa situazione, x_0 può essere interno a I oppure un suo estremo (si ricordi che x_0 è di accumulazione per I). Allora, dall'ipotesi (i) segue che f e g si possono prolungare per continuità in x_0 ponendo $f(x_0) = g(x_0) = 0$. Così, possiamo assumere che f e g siano definite e continue in un intervallo I che contiene x_0 e siano derivabili in I_{x_0} . Perciò per il Teorema 1.1 di Cauchy si ha che per ogni $x \in I_{x_0}$

$$\begin{cases} x < x_0 \Rightarrow g(x) \neq g(x_0) & \text{e } \exists c(x) \in]x, x_0[\text{ tale che } \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x_0) - f(x)}{g(x_0) - g(x)} = \frac{f'(c(x))}{g'(c(x))} \\ x_0 < x \Rightarrow g(x_0) \neq g(x) & \text{e } \exists c(x) \in]x_0, x[\text{ tale che } \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} = \frac{f'(c(x))}{g'(c(x))}. \end{cases}$$

Quindi, in ogni caso risulta che per ogni $x \in I_{x_0}$, $g(x) \neq g(x_0)$ e

$$\exists c(x) \in I_{x_0} \text{ con } |c(x) - x_0| \leq |x - x_0| \text{ tale che } \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(c(x))}{g'(c(x))}.$$

Allora si ha $\lim_{x \rightarrow x_0} c(x) = x_0$ e, dato che per ipotesi $\lim_{t \rightarrow x_0} f'(t)/g'(t) = l$, per il teorema sui limiti delle funzioni composte, risulta

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(c(x))}{g'(c(x))} = l.$$

Caso $x_0 = \pm\infty$: Supponiamo per fissare le idee che $x_0 = +\infty$ (se $x_0 = -\infty$, si procede allo stesso modo). Quindi $+\infty$ è l'estremo destro dell'intervallo I e sicuramente esiste $a > 0$ tale che $[a, +\infty[\subset I$. Definiamo allora le funzioni

- $F(t) = f(1/t)$ con $t \in]0, 1/a]$
- $G(t) = g(1/t)$ con $t \in]0, 1/a]$.

Evidentemente, dal teorema sui limiti delle funzioni composte risulta

$$\lim_{t \rightarrow 0} F(t) = \lim_{t \rightarrow 0} f(1/t) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{t \rightarrow 0} G(t) = \lim_{t \rightarrow 0} g(1/t) = \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0.$$

Inoltre F e G sono derivabili in $]0, 1/a]$ e

$$\forall t \in]0, 1/a] : F'(t) = f'(1/t)(-1/t^2) \quad \text{e} \quad G'(t) = g'(1/t)(-1/t^2) \neq 0$$

e quindi, applicando nuovamente il teorema sui limiti delle funzioni composte

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{F'(t)}{G'(t)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f'(1/t)}{g'(1/t)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l.$$

Perciò le funzioni F e G soddisfano le ipotesi della situazione analizzata nel caso precedente e quindi si può concludere che $G(t) \neq 0$ per ogni $t \in]0, 1/a]$ e

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(t)}{G(t)} = l.$$

Ma allora con un'ultima applicazione del teorema sui limiti delle funzioni composte si ha

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(1/x)}{G(1/x)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(t)}{G(t)} = l.$$

Il teorema è completamente dimostrato. □

Diamo ora senza dimostrazione il teorema di de l'Hôpital per la forma indeterminata ∞/∞ (in effetti si chiede soltanto che il denominatore sia un infinito).

Teorema 1.3 (di de l'Hôpital, caso \cdot/∞). *Sia I un intervallo di \mathbb{R} e $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ un punto di accumulazione per I . Poniamo $I_{x_0} = I \setminus \{x_0\}$. Siano $f, g: I_{x_0} \rightarrow \mathbb{R}$ due funzioni derivabili in I_{x_0} e supponiamo che*

(i) $\lim_{x \rightarrow x_0} |g(x)| = +\infty$.

(ii) $\forall x \in I_{x_0} : g'(x) \neq 0$.

(iii) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l \in \overline{\mathbb{R}}$.

Allora, $g(x) \neq 0$ in un intorno di x_0 e $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = l$.

Osservazione 1.4. Se il limite

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

non esiste, allora non si può dire nulla sul limite

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}.$$

Nel seguito, quando applichiamo il teorema di de l'Hôpital scriveremo

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

con una H sopra il segno di uguaglianza (che sta per Hôpital) e ricorda che si tratta di una uguaglianza nelle ipotesi del teorema di de l'Hôpital, che in particolare richiede che il limite a destra esiste. Come controesempio per la situazione discussa sopra possiamo considerare il limite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \operatorname{sen}(1/x)}{x}.$$

Infatti, si tratta di una forma indeterminata del tipo $0/0$ e chiaramente

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \operatorname{sen}(1/x)}{x} = \lim_{x \rightarrow x_0} x \operatorname{sen}(1/x) = 0,$$

ma per il limite del rapporto delle derivate si ha

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \operatorname{sen}(1/x) + x^2 \cos(1/x)(-1/x^2)}{1} = \lim_{x \rightarrow 0} 2x \operatorname{sen}(1/x) - \cos(1/x)$$

e quest'ultimo limite non esiste. Si vede quindi come in questo caso non è vero che

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Un ulteriore controesempio per il caso ∞/∞ è dato dal seguente limite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - \operatorname{sen} x}{2x + \operatorname{sen} x}.$$

Infatti si ha

$$\frac{x - \operatorname{sen} x}{x + \operatorname{sen} x} = \frac{2 - \frac{\operatorname{sen} x}{x}}{2 + \frac{\operatorname{sen} x}{x}} \rightarrow 1 \text{ per } x \rightarrow +\infty.$$

Ma se si calcola il limite delle derivate, si ha

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 - \cos x}{2 + \cos x}$$

e questo limite non esiste (infatti basta considerare le restrizioni agli insiemi $B_1 = \{x \in \mathbb{R} \mid \cos x = 1\}$ e $B_2 = \{x \in \mathbb{R} \mid \cos x = -1\}$ per avere due limiti distinti).

Osservazione 1.5. Il teorema sui limiti della derivata che abbiamo visto nella lezione 30 si può ottenere dal teorema di de l'Hôpital (in effetti è un caso particolare di questo). Sia $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ continua in I e derivabile in I_{x_0} (con $x_0 \in I$). Supponiamo che $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = l \in \mathbb{R}$. Allora basta prendere $g(x) = x - x_0$ e evidentemente $g(x)$ e $f(x) - f(x_0)$ tendono a zero per $x \rightarrow x_0$, e inoltre

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(f(x) - f(x_0))'}{(x - x_0)'} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{1} = l.$$

Quindi esiste il limite del rapporto incrementale ed è uguale a l ; perciò se $l \in \mathbb{R}$, allora f è derivabile e $f'(x) = l$.

Esempio 1.6.

(i) Consideriamo il limite notevole

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}.$$

Si tratta di una forma indeterminata $0/0$ e la derivata del denominatore non si annulla mai. Facciamo vedere che si può risolvere immediatamente con il Teorema 1.2. Infatti

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = 1.$$

(ii) Consideriamo il limite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}.$$

Si tratta di una forma indeterminata $0/0$ e la derivata del denominatore è diversa da zero per $x \neq 0$. Dunque, le ipotesi del Teorema 1.2 sono verificate e si può concludere che

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = \frac{1}{6}.$$

(iii) Consideriamo il limite

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x - \log(\cos x)}{x \sin x}.$$

Di nuovo, si tratta di una forma indeterminata $0/0$ e la derivata del denominatore è $\sin x + x \cos x$ che è diversa da zero per $x \in]0, \pi/2[$. Allora per il Teorema 1.2 si ha

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x - \log(\cos x)}{x \sin x} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x + \frac{\sin x}{\cos x}}{\sin x + x \cos x} = \frac{1}{0^+} = +\infty.$$

(iv) Consideriamo il limite

$$\lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\log(\sin x)}{\operatorname{tg}(2x)}.$$

Notando che

$$\lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\log(\sin x)}{\operatorname{tg}(2x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(\sin(x + \pi/2))}{\operatorname{tg}(2x + \pi)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(\cos x)}{\operatorname{tg}(2x)},$$

il limite si può risolvere mediante l'uso di limiti notevoli come segue

$$\frac{\log(\cos x)}{\operatorname{tg}(2x)} = \underbrace{\frac{\log(1 + \cos x - 1)}{\cos x - 1}}_{\downarrow 1} \cdot \underbrace{\frac{\cos x - 1}{x^2}}_{\downarrow -1/2} \underbrace{\frac{2x}{\sin(2x)}}_{\downarrow 1} \underbrace{\frac{x \cos(2x)}{2}}_{\downarrow 0} \rightarrow 0 \quad \text{per } x \rightarrow 0.$$

In alternativa, applicando il teorema di de l'Hôpital, si ha

$$\lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\log(\sin x)}{\operatorname{tg}(2x)} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\frac{\cos x}{\sin x}}{\frac{2}{\cos^2(2x)}} = \frac{0}{-2} = 0.$$

2 Approssimazioni polinomiali e Formula di Taylor

Cominciamo con il problema delle approssimazione lineari di funzioni. Si tratta di trovare una funzione lineare

$$p(x) = ax + b \quad (a, b \in \mathbb{R})$$

che approssima una data funzione f in un intorno di x_0 studiando l'errore

$$r(x) := f(x) - p(x) \quad \text{per } x \rightarrow x_0.$$

Ovviamente una condizione minima perché questa approssimazione sia ragionevole è che

$$r(x) \rightarrow 0 \quad \text{per } x \rightarrow x_0. \quad (2)$$

Ora, se la funzione f è continua in x_0 si ha che $r(x) = f(x) - p(x) \rightarrow f(x_0) - P(x_0)$ per $x \rightarrow x_0$ e quindi, la condizione (2) è equivalente a

$$f(x_0) = P(x_0) = ax_0 + b \Leftrightarrow b = f(x_0) - ax_0;$$

e questo conduce ad una espressione di p del tipo

$$p(x) = f(x_0) + a(x - x_0).$$

Osserviamo comunque che la condizione (2) soltanto non garantisce una buona approssimazione della funzione f nelle vicinanze del punto x_0 . A tal fine, infatti, si deve richiedere che l'errore vada a zero abbastanza rapidamente quando $x \rightarrow x_0$. Si può allora richiedere che

$$\frac{r(x)}{x - x_0} \rightarrow 0 \quad \text{per } x \rightarrow x_0. \quad (3)$$

Notiamo adesso che

$$\frac{r(x)}{x - x_0} = \frac{f(x) - (f(x_0) + a(x - x_0))}{x - x_0} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - a.$$

Perciò la condizione (3) è soddisfatta se e solo se la funzione f è derivabile in x_0 e $a = f'(x_0)$. Possiamo riassumere quanto discusso finora con la seguente proposizione

Proposizione 2.1. Sia $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ definita in un intervallo I e $x_0 \in I$. Allora sono equivalenti

(i) f è derivabile in x_0

(ii) esiste $a \in \mathbb{R}$ tale che $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - a(x - x_0)}{x - x_0} = 0$

e vera l'una e quindi l'altra risulta $a = f'(x_0)$.

Quindi la funzione lineare

$$x \mapsto f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

è l'unica funzione lineare che verifica la condizione (3).

Generalizziamo adesso il problema dell'approssimazione considerando polinomi di grado maggiore di 1. Ricordiamo che un polinomio si scrive come

$$p(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \cdots + b_nx^n \quad (4)$$

con $b_0, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}$ e che il *grado del polinomio* p , che si indica con $\text{grad } p$, è il più grande esponente dei monomi non nulli di p . Quindi se in (4) $b_n \neq 0$, allora $\text{grad } p = n$, mentre se $b_n = 0$, allora $\text{grad } p < n$. Allora un generico polinomio p di *grado al più* n avrà la forma (4) con i coefficienti b_0, b_1, \dots, b_n che eventualmente potranno anche essere zero.

Sia $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione definita in un intervallo I e $x_0 \in I$. Il problema che ci poniamo è quello di trovare un polinomio $p(x)$ di grado al più $n \in \mathbb{N}^*$, in modo che

$$r(x) := f(x) - p(x) \rightarrow 0 \quad \text{abbastanza rapidamente per } x \rightarrow x_0.$$

Cominciamo con il notare che ogni polinomio si può riscrivere *centrato in un punto arbitrario* x_0 . Con questo intendiamo che il polinomio (4) si può mettere sempre nella forma

$$p(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots + a_n(x - x_0)^n,$$

per opportuni coefficienti a_0, a_1, \dots, a_n . Per esempio se $p(x) = 4 + 2x - x^2 + 3x^3$, allora se si prende come riferimento il punto $x_0 = 1$ si può scrivere

$$\begin{aligned} p(x) &= 4 + 2(x - 1 + 1) - (x - 1 + 1)^2 + 3(x - 1 + 1)^3 \\ &= 4 + [2 + 2(x - 1)] - [1 + 2(x - 1) + (x - 1)^2] + 3[1 + 3(x - 1) + 3(x - 1)^2 + (x - 1)^3] \\ &= 8 + 9(x - 1) + 8(x - 1)^2 + 3(x - 1)^3. \end{aligned}$$

In generale vale il seguente risultato.

Proposizione 2.2. Sia $x_0 \in \mathbb{R}$. Ogni polinomio a coefficienti reali di grado al più $n \geq 1$ si può scrivere nella forma

$$\begin{aligned} p(x) &= a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots + a_n(x - x_0)^n \\ &= \sum_{k=0}^n a_k(x - x_0)^k \quad \text{con } a_k \in \mathbb{R}. \end{aligned} \quad (5)$$

Dimostrazione. Sia $p(x) = \sum_{k=0}^n b_k x^k$. Allora

$$\begin{aligned}
p(x) &= \sum_{k=0}^n b_k (x - x_0 + x_0)^k \\
&= \sum_{k=0}^n b_k \left[\sum_{i=0}^k \binom{k}{i} (x - x_0)^i x_0^{k-i} \right] \\
&= b_0 \\
&\quad + b_1 [x_0 + (x - x_0)] \\
&\quad + b_2 [x_0^2 + 2x_0(x - x_0) + (x - x_0)^2] \\
&\quad + b_3 [x_0^3 + 3x_0^2(x - x_0) + 3x_0(x - x_0)^2 + (x - x_0)^3] \\
&\quad \dots \dots \dots \\
&\quad + b_n [x_0^n + \binom{n}{1} x_0^{n-1} (x - x_0) + \binom{n}{2} x_0^{n-2} (x - x_0)^2 + \dots + \binom{n}{n-1} x_0 (x - x_0)^{n-1} + (x - x_0)^n] \\
&= a_0 + a_1 (x - x_0) + a_2 (x - x_0)^2 + \dots + a_{n-1} (x - x_0)^{n-1} + a_n (x - x_0)^n,
\end{aligned}$$

dove si è posto $a_k = \sum_{i=k}^n b_i \binom{i}{k} x_0^{i-k}$. □

Proposizione 2.3. *Supponiamo che p sia un polinomio di grado al più n , I un intervallo non banale (con interno non vuoto) di \mathbb{R} e $x_0 \in I$ e consideriamo la restrizione $p|_I: I \rightarrow \mathbb{R}$ del polinomio all'intervallo I . Allora*

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{p|_I(x)}{(x - x_0)^n} = 0 \implies p = 0.$$

Dimostrazione. Supponiamo che $\lim_{x \rightarrow x_0} p|_I(x)/(x - x_0)^n = 0$. Sia $k \in \mathbb{N}$ con $0 \leq k < n$. Allora

$$\frac{p|_I(x)}{(x - x_0)^k} = \underbrace{\frac{p|_I(x)}{(x - x_0)^n}}_{\downarrow 0} \underbrace{(x - x_0)^{n-k}}_{\downarrow 0} \rightarrow 0 \quad \text{per } x \rightarrow x_0.$$

Quindi si ha

$$\lim_{x \rightarrow x_0} p|_I(x) = 0 \tag{C-0}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{p|_I(x)}{x - x_0} = 0 \tag{C-1}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{p|_I(x)}{(x - x_0)^2} = 0 \tag{C-2}$$

.....

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{p|_I(x)}{(x - x_0)^n} = 0. \tag{C-n}$$

Per la Proposizione 2.2 p si può scrivere nella forma

$$p(x) = \sum_{k=0}^n a_k(x - x_0)^k = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots + a_n(x - x_0)^n. \quad (6)$$

Allora, dall'espressione (6), è chiaro che

$$\begin{array}{ll} \text{(C-0)} & \Rightarrow a_0 = 0 \\ a_0 = 0 \text{ e (C-1)} & \Rightarrow a_1 = 0 \\ a_0 = 0 \text{ e } a_1 = 0 \text{ e (C-2)} & \Rightarrow a_2 = 0 \\ \dots\dots\dots & \Rightarrow \dots\dots \\ a_0 = 0 \text{ e } a_1 = 0 \text{ e } \dots \text{ e } a_{n-1} = 0 \text{ e (C-n)} & \Rightarrow a_n = 0. \end{array}$$

Da cui segue che $p = 0$. □