

Esercizio :

$$f(x) = \begin{cases} \sin x & -\pi < x \leq 0 \\ \cos x & 0 < x \leq \pi \end{cases}$$

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 \sin x + \int_0^{\pi} \cos x dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left[-\cos x \right]_{-\pi}^0 + \left[\sin x \right]_0^{\pi} \\ &= -\frac{1}{\pi} (1 + 1) = -\frac{2}{\pi} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos x dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 \sin x \cos x dx + \int_0^{\pi} \cos x \cos x dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 \sin x \cos x dx + \int_0^{\pi} \cos^2 x dx \end{aligned}$$

$$\int_{-\pi}^0 \sin x \cos x dx = -\frac{1}{2} \cos^2(x) \Big|_{-\pi}^0 = 0$$

$$\int_0^{\pi} \cos^2 x dx = \frac{\pi}{2}$$

$$a_1 = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

$$b_2 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 \sin x \sin(2x) dx + \int_0^{\pi} \cos x \sin(2x) dx$$

$$\int_{-\pi}^0 \sin x \sin(2x) dx = \left. \frac{1}{2} \sin x - \frac{1}{6} \sin(3x) \right|_{-\pi}^0 = 0$$

$$\int_0^{\pi} \cos x \sin(2x) dx = \left. -\frac{1}{2} \cos x - \frac{1}{6} \cos(3x) \right|_0^{\pi} = \frac{4}{3}$$

$$b_2 = \frac{1}{\pi} \frac{4}{3} = \frac{4}{3\pi}$$

Disuguaglianza di Bessel

Consideriamo:

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx)$$

dove:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$$

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(kx) dx$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(kx) dx$$

Considero il seguente integrale:

$$\begin{aligned} & \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - s_m(x)|^2 dx = \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} [f(x)^2 + \underline{s_m(x)^2} - \underline{2f(x)s_m(x)}] dx \end{aligned}$$

Per $s_m(x)^2$:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \left(\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^m a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx) \right)^2 dx =$$

$$= \frac{a_0^2}{4} 2\pi + \sum_{k=1}^m a_k^2 \pi + \sum_{k=1}^m b_k^2 \pi =$$

$$= \frac{a_0^2}{4} \pi + \pi \sum_{k=1}^m a_k^2 + b_k^2$$

Per $2f(x)s_m(x)$:

$$- 2 \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \left[\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^m a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx) \right] dx$$

$$- a_0 \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx - 2 \sum_{k=1}^m a_k \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(kx) dx$$

$$\sum_{k=1}^m \pi [a_k^2 + b_k^2] - 2 \sum_{k=1}^m a_k \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(kx) dx$$

$$+ 2 \sum_{k=1}^{\infty} b_k \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(kx) dx = b_k$$

$$= -a_0^2 \pi - 2\pi \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2)$$

Ottengo:

$$\int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx = \frac{a_0^2}{2} \pi - \pi \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2) \geq 0$$

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx$$

questa serie converge

segue (olatta condizione necessaria):

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} a_k = 0, \quad \lim_{k \rightarrow +\infty} b_k = 0$$

ossia:

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(kx) dx = \lim_{k \rightarrow +\infty} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(kx) dx = 0$$

Nota: Mantando $k \rightarrow +\infty$, coefficienti di Fourier tendono a 0.

Def Una funzione regolare a tmalti e' una funzione che presenta dei salti, ossia e' regolare a tmalti se esiste un numero finito di punti tali che

f è derivabile con derivata continua.

Nucleo di Dirichlet ("dimischi")

Definiamo una funzione:

$$d_m = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^m \cos(kx)$$

si ha:

$$d_m = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^m \cos(kx) = \frac{\sin\left((m + \frac{1}{2})x\right)}{2 \sin\left(\frac{x}{2}\right)}$$

Inoltre:

$$\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} d_m(t) dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 d_m(t) dt = \frac{1}{2}$$