

Высшая математика

Лисид Лаконский

April 2023

Содержание

1	Высшая математика - 5 апреля 2023 г.	2
1.1	Степенные ряды как частный случай функциональных рядов	2
1.2	Формулы приближенных вычислений	2
1.3	Ряды Фурье	3

1 Высшая математика - 5 апреля 2023 г.

1.1 Степенные ряды как частный случай функциональных рядов

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots$$
$$a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + a_3(x - x_0)^3 + \dots$$

Теорема 1 Если степенной ряд сходится при некотором значении $x' \neq 0$, то он будет абсолютно сходиться $\forall |x| < |x'|$

Если степенной ряд расходится при некотором значении $x' \neq 0$, то он будет расходиться $\forall |x| > |x'|$

Определение 1 *Интервалом сходимости* степенного ряда называется интервал $(-R; R)$, что для всякого x , находящегося внутри этого интервала, ряд абсолютно сходится, а для находящегося снаружи — расходится

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}x^{n+1}}{a_n x^n} \right| = |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1$$
$$|x| < \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} \text{ — радиус сходимости}$$
$$|x| < R, -R < x < R$$

$$\sum \frac{x^{2n-1}}{9^n} = \frac{x^1}{9} + \frac{x^3}{81} + \frac{x^5}{729} + \dots$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{x^{2n+1} * 9^n}{9^n * 9 * x^{2n-1}} \right| = \frac{|x|^2}{9} < 1, |x^2| < 9, -3 < x < 3 \text{ — интервал сходимости}$$

Проверим, что происходит при $x = \pm 3$:

$$\sum_{x=3} \frac{3^{2n-1}}{9^n} = \sum \frac{1}{3}$$
$$\sum_{x=-3} \frac{(-3)^{2n-1}}{9^n} \text{ — ряд не является сходящимся}$$

Степенной ряд является **мажорируемым** на любом отрезке, целиком лежащем внутри его области сходимости.

Если **пределы интегрирования** тоже лежат внутри интервала сходимости, то **интеграл от суммы ряда будет равняться сумме отдельных интегралов от элементов данного ряда**.

Если степенной ряд имеет интервал сходимости $(-R; R)$, то ряд, полученный **почленным дифференцированием** этого ряда, **имеет тот же интервал сходимости**, и сумма этого ряда будет равна производной суммы исходного ряда, если $x \in (-R; R)$

1.2 Формулы приближенных вычислений

$$1. \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5} - \dots \quad 2. \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots \quad 3. e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$
$$4. \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots \quad 5. \sinh h = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots \quad 6. \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$$
$$7. \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots \quad 8. (1+x)^m = 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{3!}x^3 + \dots$$

Например,

$$\frac{1}{\sqrt[5]{e^3}} = e^{-3/5} = 1 - \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \left(\frac{9}{25} \right) - \frac{1}{6} \left(\frac{27}{125} \right) + \dots = 1 - 0.6 + 0.18 - 0.036 = 0.544, \text{ с точностью } 0.0054 \text{ — первый отбрасываемый член}$$

Другой пример,

$$\sqrt[5]{36} = (32 + 4)^{1/5} = 32^{1/5} \left(1 + \frac{1}{8} \right)^{1/5} = 2 \left(1 + \frac{1}{8} \right)^{1/5}$$
$$(1+x)^{1/5} = 1 + \frac{1}{5}x + \frac{\frac{1}{5}(-\frac{4}{5})x^2}{2!} + \frac{\frac{1}{5}(-\frac{4}{5})(-\frac{9}{5})x^3}{3!}, \quad (1 + \frac{1}{8})^{1/5} = 1 + \frac{1}{5} * \frac{1}{8} - \frac{4}{25*2} * (\frac{1}{8})^2 + \frac{36}{125*6} * (\frac{1}{3})^3$$

Дальнейшее решение тривиально и оставляется в качестве упражнения читателю

Третий пример,

$$\int_0^1 \sqrt{x} e^{-x} dx = \int_0^1 \sqrt{x} \left(1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \dots \right) dx = \int_0^1 \left(x^{1/2} - x^{3/2} + \frac{1}{2!} x^{5/2} - \frac{1}{3!} x^{7/2} + \dots \right) dx =$$
$$\left(\frac{2x^{3/2}}{3} - \frac{2x^{5/2}}{5} + \frac{1}{2!} * \frac{2x^{7/2}}{7} - \frac{1}{3!} * \frac{2x^{9/2}}{9} + \dots \right) \Big|_0^1 = \frac{2}{3} - \frac{2}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{54} + \dots$$

1.3 Ряды Фурье

Функциональный ряд вида $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ называется **тригонометрическим рядом**, где a_0, a_n, b_n — **коэффициенты тригонометрического ряда**

Пусть периодическая функция $f(x)$ с периодом 2π такова, что она **представляется тригонометрическим рядом, сходящимся к данной функции** на интервале $[-\pi; \pi]$, то есть **является суммой данного ряда**, тогда

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx, \quad a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx dx, \quad b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx dx$$

Попробуем с помощью этих формул составить тригонометрический ряд Фурье для функции

$$f(x) = \begin{cases} -1; & -\pi < x < 0 \\ 1; & 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 (-1) dx + \int_0^{\pi} (1) dx \right) = (-x) \Big|_{-\pi}^0 + x \Big|_0^{\pi} = 0 - \pi + \pi - 0 = 0$$

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos x dx = \frac{1}{\pi} \left(- \int_{-\pi}^0 \cos kx dx + \int_0^{\pi} \cos kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} \sin kx \Big|_{-\pi}^0 + \frac{1}{k} \sin kx \Big|_0^{\pi} \right) = 0$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx dx = \frac{1}{\pi} \left(- \int_{-\pi}^0 \sin kx dx + \int_0^{\pi} \sin kx dx \right) = \frac{1}{\pi k} \left(\cos kx \Big|_{-\pi}^0 - \cos kx \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{1}{\pi k} (\cos 0 - \cos k\pi - \cos k\pi + \cos 0) =$$

$$\frac{1}{\pi k} (1 - \cos k\pi - \cos k\pi + 1) = \begin{cases} 0, & k - \text{четное} \\ \frac{4}{\pi k}, & k - \text{нечетное} \end{cases}$$

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n} = \frac{4}{\pi} \left(\sin x + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 5x}{5} \right), \text{ где } n - \text{нечетное}$$

Определение 2 Функция $f(x)$ называется **кусочно-монотонной** на $[a; b]$, если этот отрезок можно разбить конечным числом точек на интервалы, так что на каждом из этих интервалов эта функция либо не возрастает, либо не убывает.

Таким образом, функция может иметь разрывы, но эти разрывы могут быть только первого рода.

Теорема 2 Если $f(x)$ — периодическая функция ($T = 2\pi$), являющаяся кусочно-монотонной и ограниченной на отрезке $[-\pi; \pi]$, то ряд Фурье $(\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx))$, построенный для этой функции, сходится во всех точках.

Сумма полученного ряда равняется значению $f(x)$ в точках непрерывности функции. А в точках, где функция имеет разрыв, сумма равна среднему арифметическому между пределом справа и пределом слева для функции $f(x)$