

CE080 - FUNDAMENTOS BÁSICOS PARA ESTADÍSTICA

2018-03-19

Sumário

Prefácio	5
1 Conjuntos Numéricos	7
1.1 Números Inteiros	7
1.2 Números Naturais	8
1.3 Números Racionais	8
1.4 Números Irracionais	9
1.5 Números Reais	9
1.6 Operações com Conjuntos	10
2 Sem Título	13
3 Sem Título	15
4 Sem Título	17
5 Sem Título	19

Prefácio

Este material busca auxiliar na compreensão e nos estudos dos assuntos tratados na matéria *Fundamentos Básicos para Estatística* (CE080) ministrada pela professora *Fernanda Buhner Rizzato* (fernandab@ufpr.br) no primeiro semestre de 2018 para os candidatos presentes na terceira fase de seleção de acadêmicos do curso de Estatística da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Capítulo 1

Conjuntos Numéricos

Um conjunto numérico pode ser definido como um agrupamento de elementos numéricos que possuem alguma característica em comum. Por exemplo, podemos definir o conjunto dos números pares positivos como:

$$P = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, \dots\}$$

Onde a característica em comum entre os elementos de P é a satisfação dos requisitos: i) ser par; ii) ser positivo.

De forma geral podemos denotar um conjunto em função das características em comum de seus elementos. Seja C um conjunto de elementos e com uma característica em comum a definimos:

$$C = \{e \mid e \text{ possui a característica } a\}$$

Lê-se: C é o conjunto dos elementos e tal que e possui a característica a .

Retomando o exemplo do conjunto P , podemos escrevê-lo em função de suas características (i e ii):

$$P = \{x \mid x = 2n \ \forall n \in \mathbb{N}^*\}$$

Repare que n pertence a um conjunto denotado por \mathbb{N}^* . O conjunto \mathbb{N}^* possui apenas elementos positivos e inteiros (zero não está incluso pois não é positivo e sim neutro). Logo os valores de x serão os valores de n multiplicados por 2, desta forma todos os valores de x serão positivos e pares. Falaremos mais sobre o conjunto \mathbb{N} nas próximas seções.

1.1 Números Inteiros

O conjunto dos números inteiros, denotado por \mathbb{Z} , compreende todos os números inteiros não positivos (inclui o zero) e os números inteiros positivos. Desta forma temos:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Na notação de conjunto podemos incluir três operadores: $*$, $+$ e $-$ que servem respectivamente para denotar a ausência do elemento neutro (zero), presença somente de elementos não negativos e a presença somente de elementos não positivos. Com esses operadores obtemos diversas variações do conjunto \mathbb{Z} , ou seja, subconjuntos do conjunto \mathbb{Z} , são elas:

1. Números inteiros não-nulos

$$\mathbb{Z}^* = \{\dots, -3, -2, -1, 1, 2, 3, \dots\}$$

2. Números inteiros não negativos

$$\mathbb{Z}_+ = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

3. Números inteiros não positivos

$$\mathbb{Z}_- = \{\dots, -3, -2, -1, 0\}$$

4. Números inteiros positivos

$$\mathbb{Z}_+^* = \{1, 2, 3, \dots\}$$

5. Números inteiros negativos

$$\mathbb{Z}_-^* = \{\dots, -3, -2, -1\}$$

1.2 Números Naturais

O conjunto dos números naturais, denotado por \mathbb{N} , compreende todos os números inteiros não negativos (inclui o zero). Desta forma temos:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Repare que o conjunto \mathbb{N} é um subconjunto de \mathbb{Z} , ou seja, $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$. Note também que \mathbb{N} é equivalente a \mathbb{Z}_+ .

Na notação do conjunto dos números naturais podemos definir somente o operador $*$ uma vez que, por natureza, ele só possui elementos não negativos.

1. Números naturais positivos

$$\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, \dots\}$$

1.3 Números Racionais

O conjunto dos números naturais, denotado por \mathbb{Q} , compreende todos os números da forma $\frac{a}{b}$ onde $a \in \mathbb{Z}$ e $b \in \mathbb{Z}^*$. Desta forma temos:

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^* \right\}$$

Repare que o conjunto \mathbb{Z} é subconjunto de \mathbb{Q} e \mathbb{N} é subconjunto de \mathbb{Z} , ou seja $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$. Então podemos dizer que todos número natural é um número inteiro, e todo numero inteiro é um número racional, sendo assim todo número natural é também racional.

Na notação do conjunto dos números racionais estão definidos os três operadores.

1. Números racionais não-nulos

$$\mathbb{Q}^* = \left\{ \frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z}^*, b \in \mathbb{Z}^* \right\}$$

2. Números racionais não negativos

$$\mathbb{Q}_+ = \left\{ \frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z}_+, b \in \mathbb{Z}_+^* \right\}$$

$$\mathbb{Q}_+ = \left\{ \frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z}_-, b \in \mathbb{Z}_-^* \right\}$$

3. Números racionais não positivos

$$\mathbb{Q}_- = \left\{ \frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z}_-, b \in \mathbb{Z}_+^* \right\}$$

$$\mathbb{Q}_- = \left\{ \frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z}_+, b \in \mathbb{Z}_-^* \right\}$$

4. Números racionais positivos

$$\mathbb{Q}_+^* = \left\{ \frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z}_+^*, b \in \mathbb{Z}_+^* \right\}$$

$$\mathbb{Q}_+^* = \left\{ \frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z}_-^*, b \in \mathbb{Z}_-^* \right\}$$

5. Números racionais negativos

$$\mathbb{Q}_-^* = \left\{ \frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z}_-^*, b \in \mathbb{Z}_+^* \right\}$$

$$\mathbb{Q}_-^* = \left\{ \frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z}_+^*, b \in \mathbb{Z}_-^* \right\}$$

1.4 Números Irracionais

O conjunto dos números irracionais, denotado por \mathbb{I} , compreende todos números reais que não podem ser expressos através de $\frac{a}{b}$ em que $a \in \mathbb{Z}$ e $b \in \mathbb{Z}^*$. Desta forma temos:

$$\mathbb{I} = \{a \mid a \in \mathbb{R}, a \notin \mathbb{Q}\}$$

São exemplos de números irracionais: $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $e = 2,71828\dots$, $\pi = 3,14159\dots$, entre outros.

Na notação do conjunto dos números irracionais estão definidos dois operadores: $+$ e $-$.

1. Números irracionais positivos

$$\mathbb{I}_+ = \{a \mid a \in \mathbb{R}_+, a \notin \mathbb{Q}\}$$

2. Números irracionais negativos

$$\mathbb{I}_- = \{a \mid a \in \mathbb{R}_-, a \notin \mathbb{Q}\}$$

1.5 Números Reais

O conjunto dos números reais, denotado por \mathbb{R} , compreende todos os números decimais exatos e periódicos (isto é, todos os racionais) e também todos os números decimais não exatos e não periódicos (isto é, todos os irracionais). Pode-se dizer então que o conjunto dos números reais é uma união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Desta forma temos:

$$\mathbb{R} = \{a \mid a \in \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}\}$$

É impossível enumerar todos os elementos que estão entre dois números reais, pois pode-se dizer que entre dois elementos quaisquer do conjunto \mathbb{R} existem infinitos outros elementos. Devido a essa dificuldade denotamos os elementos do conjunto \mathbb{R} de forma intervalar. Sabemos que o conjunto dos reais compreende todos os elementos que existem entre o valor mais extremo negativo e o valor mais extremo positivo, sendo assim denotamos:

$$\mathbb{R} = \{a \mid a \in (-\infty; +\infty)\}$$

Para denotar intervalos cuja os valores extremos estão inclusos devemos colocá-los entre colchetes no sentido dos os valores extremos e dizemos que o intervalo é fechado. Para denotar intervalos cuja os valores extremos

não estão inclusos devemos colocá-los entre parênteses ou entre colchetes no sentido oposto aos valores extremos e dizemos que este intervalo é aberto. Sejam $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}$ e $a < b$ define-se:

1. Intervalo que contém todos os valores entre a a b inclusive a e b (intervalo fechado de a a b)

$$[a; b]$$

2. Intervalo que contém todos os valores entre a a b inclusive a e exclusive b (intervalo fechado em a e aberto em b)

$$[a; b) \text{ ou } [a; b[$$

3. Intervalo que contém todos os valores entre a e b exclusive a e inclusive b (intervalo aberto em a e fechado em b)

$$(a; b] \text{ ou }]a; b]$$

4. Intervalo que contém todos os valores entre a e b exclusive a e b (intervalo aberto de a a b)

$$(a; b) \text{ ou }]a; b[$$

Quanto queremos nos referir ao valor mais extremo possível no conjunto \mathbb{R} usamos o símbolo ∞ , que significa infinito. Note que na representação intervalar do conjunto \mathbb{R} o intervalo é aberto nos extremos $-\infty$ e $+\infty$, isto ocorre pois ∞ não é um elemento e sim um símbolo que representa um valor que não possui limites, logo não faz sentido limitar (fechar) um intervalo em um valor ilimitado.

Na notação do conjunto dos números reais estão definidos os três operadores.

1. Números reais não-nulos

$$\mathbb{R}^* = \{a \mid a \in (-\infty; 0) \cup (0; \infty)\}$$

2. Números reais não negativos

$$\mathbb{R}_+ = \{a \mid a \in [0; \infty)\}$$

3. Números reais não positivos

$$\mathbb{R}_- = \{a \mid a \in (-\infty; 0]\}$$

4. Números reais positivos

$$\mathbb{R}_+^* = \{a \mid a \in (0; \infty)\}$$

5. Números reais negativos

$$\mathbb{R}_-^* = \{a \mid a \in (-\infty; 0)\}$$

1.6 Operações com Conjuntos

1.6.1 União de Conjuntos

Um conjunto definido pela união de dois conjuntos quaisquer pode ser entendido como o conjunto que possui todos os elementos do primeiro conjunto e também todos os elementos do segundo conjunto. Denota-se:

$$A \cup B = \{c \mid c \in A \text{ ou } c \in B\}$$

1.6.2 Intersecção de Conjuntos

1.6.3 Diferença de Conjuntos

1.6.4 Conjuntos Complementares

Capítulo 2

Sem Título

Capítulo 3

Sem Título

Capítulo 4

Sem Título

Capítulo 5

Sem Título