

# Spis treści

<b>1</b>	<b>Wstęp</b>	<b>2</b>
1.1	Notacja . . . . .	2
1.2	Uczenie nadzorowane . . . . .	2
1.3	Uczenie nienadzorowane . . . . .	3
1.4	Praktyka uczenia maszynowego . . . . .	3
1.4.1	Przygotowanie danych . . . . .	4
1.4.2	Tuning hiperparametrów i walidacja skrośna . . . . .	5
<b>2</b>	<b>Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna</b>	<b>6</b>
2.1	Przestrzeń probabilistyczna . . . . .	6
2.2	Prawdopodobieństwo warunkowe i niezależność zdarzeń . . . . .	7
2.3	Prawdopodobieństwo całkowite i wzór Bayesa . . . . .	8
2.4	Zmienne losowe . . . . .	8
2.5	Ważne rozkłady jednowymiarowe . . . . .	11
2.6	Zmienne losowe wielowymiarowe . . . . .	14
2.7	Niezależność zmiennych losowych . . . . .	16
2.8	Kowariancja i współczynnik korelacji . . . . .	17
2.9	Wielowymiarowy rozkład normalny . . . . .	18
2.10	Rodzaje zbieżności zmiennych losowych . . . . .	18
2.11	Wnioskowanie statystyczne . . . . .	19
2.12	Prawa wielkich liczb i CTG . . . . .	20
2.13	Estymatory punktowe . . . . .	21
<b>3</b>	<b>Elementy statystycznego uczenia maszynowego</b>	<b>22</b>
3.1	Podstawy wnioskowania bayesowskiego . . . . .	22
3.2	Modele gaussowskie i liniowe modele gaussowskie . . . . .	24
<b>4</b>	<b>Uczenie głębokie i sieci neuronowe</b>	<b>24</b>

# 1 Wstęp

Celem tych notatek jest zwięźle przedstawienie kompletu zagadnień związanych z szeroko pojętym uczeniem głębokim jako podejściem do Sztucznej Inteligencji (SI). Zaczynamy od minimalnego zbioru wymaganych tematów z zakresu rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej. Następnie opisujemy podstawowe metody uczenia maszynowego z probabilistycznego punktu widzenia. W końcu przechodzimy do zasadniczej części związanej z uczeniem głębokim i sieciami neuronowymi. W każdej części staramy się przedstawiać opisywane tematy w sposób minimalistyczny, skupiając się głównie na matematycznej i ideowej, a nie implementacyjnej stronie zagadnień. Liczymy, iż takie podejście zapewni odpowiednio głębokie zrozumienie tematu, dzięki któremu dalsze studiowanie całej gamy specyficznych technicznych tematów nie sprawi żadnego problemu.

## 1.1 Notacja

W dalszej części tekstu będziemy stosować przedstawioną tutaj pokrótce notację. Wektory, które traktujemy jako elementy przestrzeni  $\mathbb{R}^d$  ze standardowo zdefiniowanymi operacjami dodawania i mnożenia przez skalar będziemy oznaczali wytłuszczonymi małymi literami np.  $\mathbf{x}, \mathbf{w}, \phi$ . Wielkość  $\mathbf{x}_i$  z indeksem dolnym będącym literą alfabetu łacińskiego będzie oznaczać dany element wektora (w tym przypadku  $i$ -ty element  $\mathbf{x}$ ). Wielkość  $\mathbf{x}^\mu$  z indeksem górnym będącym literą alfabetu greckiego będzie oznaczać pewien (w tym przypadku  $\mu$ -ty) element pewnego zbioru wektorów. Macierze oraz wielowymiarowe tablice (zwane również niefortunnie tensorami) będziemy oznaczać wytłuszczonymi wielkimi literami np.  $\mathbf{X}, \mathbf{W}, \Phi$ . Analogicznie jak w przypadku wektorów przez  $\mathbf{X}_{i_1 i_2 \dots i_k}$  będziemy oznaczać  $(i_1, i_2, \dots, i_k)$  element  $k$ -wymiarowej tablicy  $\mathbf{X}$ , natomiast  $\mathbf{X}^\mu$  będzie oznaczać  $\mu$ -ty element pewnego zbioru tablic.

## 1.2 Uczenie nadzorowane

Uczenie nadzorowane jest jednym z dwóch podstawowych (pomijając tzw. uczenie ze wzmocnieniem) paradygmatów w uczeniu maszynowym, którego ogólną ideą jest zdefiniowanie pewnego modelu odwzorowującego dane wejściowe na wyjściowe predykcje. Zakładamy w nim, iż mamy dostępny zbiór obserwacji w postaci uporządkowanych par  $\mathcal{X} = \{(\mathbf{x}^\mu, t_\mu)\}_{\mu=1}^n$ , gdzie  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$  nazywamy wektorem cech a  $t$  jest prawidłową wartością odpowiedzi dla tych cech. Dwa najbardziej podstawowe przypadki zagadnień tego rodzaju to regresja oraz klasyfikacja. W przypadku regresji zmienna  $t$  przyjmuje wartości z przedziału liczb rzeczywistych. W przypadku klasyfikacji zmienna  $t$  przyjmuje wartości ze skończonego zbioru kategorii, przy czym wartości z tego zbioru nie powinny posiadać naturalnej tj. wynikającej z natury problemu, relacji porządku; gdy tak nie jest mamy do czynienia z regresją/klasyfikacją porządkową (z ang. *ordinal regression/classification*).

W jaki sposób tworzymy wspomniany model odwzorowujący  $\mathbf{x}$  na  $t$ ? W dalszych paragrafach poznamy różne metody, ale najczęściej (nie wchodząc teraz w modelowanie probabilistyczne) modelem jest pewna rodzina funkcji postaci  $\phi(\mathbf{x}; \mathbf{w})$  parametryzowana skończoną liczbą parametrów, które możemy łącznie zapisać jako pewien wektor  $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^m$ . Aby znaleźć parametry  $\mathbf{w}$ , dzięki którym dla konkretnego zagadnienia model będzie zadowalająco odwzorowywał cechy na predykcje (innymi słowy aby nauczyć model) wprowadzamy dodatkowo funkcjonal kosztu (z ang. *loss function*)  $L[\phi(\mathbf{x}; \mathbf{w}), t]$ , który kwantyfikuje odpowiedzi modelu  $\phi$  w stosunku do znanych prawidłowych odpowiedzi  $t$ . Trening modelu polega wówczas na znalezieniu parametrów  $\mathbf{w}^*$ , które minimalizują sumę wartości funkcji kosztu dla przykładów w zbiorze treningowym  $\mathcal{X}$

$$\mathbf{w}^* = \arg \min_{\mathbf{w}} \sum_{\mu=1}^n L[\phi(\mathbf{x}^\mu; \mathbf{w}), t_\mu]. \quad (1.1)$$

Zauważmy, że takie podejście ma jedną zasadniczą wadę – istotnie nie interesuje nas tak naprawdę, jak model radzi sobie na zbiorze treningowym, tylko jak będzie radził sobie na nowych, niewidzianych wcześniej danych. Sytuację, w której model bardzo dobrze modeluje dane w zbiorze treningowym, ale słabo radzi sobie na nowych danych nazywamy przeuczeniem lub nadmiernym dopasowaniem (z ang. *overfitting*). Sytuację, w której model słabo radzi sobie zarówno na zbiorze treningowym, jak i na nowych danych nazywamy niedouczeniem lub niedopasowaniem (z ang. *underfitting*). Występowanie *overfittingu* i *underfittingu* jest powiązane z pojemnością (z ang. *capacity*) modelu. Złożony model o dużej pojemności potrafi dopasować się do bardzo skomplikowanych obserwacji, ale istnieje ryzyko jego przeuczenia (mówimy wówczas o *high variance*). Dla prostego modelu o małej pojemności istnieje z kolei ryzyko, iż nie ma on wystarczająco ekspresywności (mówimy wówczas o *high bias*).

### 1.3 Uczenie nienadzorowane

W przypadku uczenia nienadzorowanego naszym celem nie jest znalezienie modelu odwzorowującego cechy na predykcje. Chcemy raczej zrozumieć wewnętrzną strukturę danych. Modele tego rodzaju znajdują zastosowanie w analizie biznesowej, gdzie pozwalają, chociażby na analizę ważności poszczególnych wskaźników, czy wizualizację wysoko-wymiarowych danych. Nas będą interesować natomiast szczególnie generatywne modele nienadzorowane, za pomocą których modelujemy rozkład prawdopodobieństwa danych, czy to wprost poprzez funkcję gęstości prawdopodobieństwa, czy też jedynie jako model, z którego możemy próbować nowe przykłady.

### 1.4 Praktyka uczenia maszynowego

W dalszej części nie będziemy skupiać się na detalach implementacyjnych. W naszej ocenie jednak dziedzina uczenia maszynowego jest przede wszystkim „nauką eksperymentalną” dlatego bardzo ważne jest empiryczne sprawdzenie różnych metod przed wybraniem ostatecznego modelu dla danego zagadnienia. W

tym paragrafie opisujemy standardowe praktyki stosowane przy trenowaniu modeli uczenia maszynowego (głównie nadzorowanych operujących na danych tabelarycznych).

#### 1.4.1 Przygotowanie danych

Kluczem do uzyskania dobrych wyników przy korzystaniu z algorytmów uczenia maszynowego jest odpowiednie przygotowanie danych (z ang. *preprocessing*). Typowo preprocessing składa się z:

- wczytania danych;
- eksploracji danych oraz wstępnego czyszczenia, w szczególności usunięcia jawnych wartości odstających (z ang. *outliers*) oraz cech posiadających zbyt dużo wartości brakujących;
- analizy rozkładu zmiennej docelowej oraz ewentualnej transformacji logarytmicznej, która poprawia stabilność numeryczną, gdy przewidywane wartości są dużymi dodatnimi liczbami rzeczywistymi, zmienia dziedzinę zmiennej objaśnianej z  $\mathbb{R}_+$  na  $\mathbb{R}$  oraz dodatkowo jest przykładem transformacji stabilizującej wariancję;
- podziału zbioru na część treningową oraz testową;
- dokonania skalowania i imputacji brakujących wartości cech (metody `.fit()` wywołujemy jedynie dla zbioru treningowego);
- usunięcia silnie skorelowanych cech;
- zakodowania wartości kategorycznych za pomocą tzw. *one-hot encoding* pamiętając o *dummy variable trap* – jedną z  $k$  kategorii kodujemy za pomocą wektora *one-hot* długości  $n - 1$ , aby uniknąć zależności liniowej między cechami (opcja `drop="first"` w `OneHotEncoder` w `scikit-learn`);
- wykonania feature engineering – dodania wielomianów cech do naszych danych lub skonstruowania innych cech (np. cech określających miesiąc, dzień itp.);

Podział zbioru na część treningową i testową jest najważniejszym etapem preprocessingu. Zbiór testowy wydzielamy, aby po wytrenowaniu modelu sprawdzić, jak poradzi on sobie na nowych, niewidzianych wcześniej danych. Powinniśmy go traktować jako dane, które będziemy w przyszłości dostawać po wdrożeniu modelu do realnego systemu. Takie dane również będziemy musieli przeskalować, zakodować itp., ale parametry potrzebne do wykonania tych transformacji możemy wziąć jedynie z dostępnego wcześniej zbioru treningowego. Wykorzystanie danych testowych w procesie trenowania to **błąd wycieku danych** (z ang. *data leakage*). Skutkuje on niepoprawnym, nadmiernie optymistycznym oszacowaniem jakości modelu.

#### 1.4.2 Tuning hiperparametrów i walidacja skrośna

Praktycznie wszystkie modele uczenia maszynowego mają hiperparametry, często liczne, które w zauważalny sposób wpływają na wyniki, a szczególnie na underfitting i overfitting. Ich wartości trzeba dobrać zatem dość dokładnie. Proces doboru hiperparametrów nazywa się tuningiem hiperparametrów (z ang. *hyperparameter tuning*).

Istnieje na to wiele sposobów. Większość z nich polega na tym, że trenuje się za każdym razem model z nowym zestawem hiperparametrów i wybiera się ten zestaw, który pozwala uzyskać najlepsze wyniki. Metody głównie różnią się między sobą sposobem doboru kandydujących zestawów hiperparametrów. Najprostsze i najpopularniejsze to:

- pełne przeszukiwanie (z ang. *grid search*) – definiujemy możliwe wartości dla różnych hiperparametrów, a metoda sprawdza ich wszystkie możliwe kombinacje (czyli siatkę),
- losowe przeszukiwanie (z ang. *randomized search*) – definiujemy możliwe wartości jak w pełnym przeszukiwaniu, ale sprawdzamy tylko ograniczoną liczbę losowo wybranych kombinacji.

Jak ocenić, jak dobry jest jakiś zestaw hiperparametrów? Nie możemy sprawdzić tego na zbiorze treningowym – wyniki byłyby zbyt optymistyczne. Nie możemy wykorzystać zbioru testowego – mielibyśmy wyciek danych, bo wybieralibyśmy model explicite pod nasz zbiór testowy. Trzeba zatem osobnego zbioru, na którym będziemy na bieżąco sprawdzać jakość modeli dla różnych hiperparametrów. Jest to zbiór walidacyjny (z ang. *validation set*). Zbiór taki wycina się ze zbioru treningowego.

Jednorazowy podział zbioru na części nazywa się *split validation* lub *holdout*. Używamy go, gdy mamy sporo danych, i 10-20% zbioru jako dane walidacyjne czy testowe to dość dużo, żeby mieć przyzwoite oszacowanie. Zbyt mały zbiór walidacyjny czy testowy da nam mało wiarygodne wyniki – nie da się nawet powiedzieć, czy zbyt pesymistyczne, czy optymistyczne. W praktyce niestety często mamy mało danych. Trzeba zatem jakiejś magicznej metody, która stworzy nam więcej zbiorów walidacyjnych z tej samej ilości danych. Taką metodą jest walidacja skrośna (z ang. *cross validation*, CV). Polega na tym, że dzielimy zbiór treningowy na  $K$  równych podzbiorów, tzw. foldów. Każdy podzbiór po kolei staje się zbiorem walidacyjnym, a pozostałe łączymy w zbiór treningowy. Trenujemy zatem  $K$  modeli dla tego samego zestawu hiperparametrów i każdy testujemy na zbiorze walidacyjnym. Mamy  $K$  wyników dla zbiorów walidacyjnych, które możemy uśrednić (i ewentualnie obliczyć odchylenie standardowe). Takie wyniki są znacznie bardziej wiarygodne.

## 2 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna

### 2.1 Przestrzeń probabilistyczna

Pojęciem pierwotnym w rachunku prawdopodobieństwa jest pojęcie **przestrzeni zdarzeń elementarnych**, którą oznaczamy  $\Omega$ . W przypadku doświadczeń losowych przestrzeni zdarzeń elementarnych jest zbiorem wszystkich niepodzielnych wyników obserwacji.

**Definicja 2.1** (Rodziny zdarzeń). *Niech  $\Omega$  będzie przestrzenią zdarzeń elementarnych. Rodzinę zdarzeń nazwiemy rodzinę zbiorów  $\mathcal{F}$  taką, że*

1.  $\Omega \in \mathcal{F}$ .
2. Jeśli  $A \in \mathcal{F}$  to  $\Omega \setminus A \in \mathcal{F}$ .
3. Jeśli  $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$  to  $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$ .

Rodzinę zdarzeń  $\mathcal{F}$  nazywamy  $\sigma$ -ciałem zdarzeń losowych.

**Definicja 2.2** (Zdarzenia losowego). *Zdarzeniem losowym nazywamy dowolny zbiór należący do rodziny zdarzeń  $\mathcal{F}$ . W szczególności  $\Omega$  nazwiemy zdarzeniem pewnym, a  $\emptyset$  – zdarzeniem niemożliwym.*

**Definicja 2.3** (Rozkładu prawdopodobieństwa). *Niech dana będzie przestrzeń zdarzeń elementarnych  $\Omega$  i rodzina zdarzeń  $\mathcal{F}$ . Rozkładem prawdopodobieństwa nazwiemy funkcję  $P : \mathcal{F} \mapsto [0; 1]$  spełniającą*

1. Dla każdego  $A \in \mathcal{F}$  zachodzi  $P(A) \geq 0$ .
2.  $P(\Omega) = 1$ .
3. Dla każdego ciągu zdarzeń parami rozłącznych  $A_1, A_2, \dots, \forall i \neq j : A_i \cap A_j = \emptyset$  zachodzi

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

**Twierdzenie 2.1.** *Niech  $P$  będzie rozkładem prawdopodobieństwa w rodzinie zdarzeń  $\mathcal{F}$ , wówczas*

1.  $P(\emptyset) = 0$ .
2. (Addytywność) Dla dowolnych zdarzeń  $A_1, \dots, A_n$  parami rozłącznych zachodzi

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i).$$

3. Dla dowolnego zdarzenia  $A$  zachodzi

$$P(A') = 1 - P(A).$$

4. Dla dowolnych zdarzeń  $A, B$  zachodzi

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

5. Jeśli  $A \subset B$  to  $P(A) \leq P(B)$ .

6. Dla każdego zdarzenia  $A$  zachodzi  $P(A) \leq 1$ .

**Definicja 2.4** (Przestrzeni probabilistycznej). *Przestrzenią probabilistyczną nazywamy uporządkowaną trójkę  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ , gdzie  $\Omega$  jest przestrzenią zdarzeń elementarnych,  $\mathcal{F}$  – rodziną zdarzeń określoną na  $\Omega$ , a  $P$  – rozkładem prawdopodobieństwa w  $\mathcal{F}$ .*

## 2.2 Prawdopodobieństwo warunkowe i niezależność zdarzeń

**Definicja 2.5** (Prawdopodobieństwa warunkowego). *Jeśli  $P(B) > 0$  to prawdopodobieństwem  $P(A | B)$  zdarzenia  $A$  pod warunkiem zdarzenia  $B$  nazywamy iloraz prawdopodobieństw*

$$P(A | B) := \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Można pokazać, iż prawdopodobieństwo warunkowe jako funkcja zdarzenia  $A$  przy ustalonym zdarzeniu  $B$  spełnia wszystkie aksjomaty rozkładu prawdopodobieństwa.

**Twierdzenie 2.2** (O wielokrotnym warunkowaniu). *Dla dowolnych zdarzeń  $A_1, \dots, A_n$  takich, że  $P(A_1, \dots, A_n) > 0$  zachodzi*

$$P(A_1, \dots, A_n) = P(A_n | A_{n-1}, \dots, A_1) \dots P(A_2 | A_1) P(A_1),$$

gdzie dla uproszczenia zapisu używamy  $P(A, B)$  w znaczeniu  $P(A \cap B)$ .

**Definicja 2.6** (Niezależności pary zdarzeń). *Zdarzenia  $A, B$  nazwiemy niezależnymi jeśli*

$$P(A, B) = P(A)P(B).$$

Zauważmy, iż w przypadku  $P(B) > 0$  powyższa definicja jest równoważna bardziej intuicyjnej wynikającej z definicji prawdopodobieństwa warunkowego, mianowicie zdarzenia  $A, B$  nazywamy niezależnymi jeśli  $P(A | B) = P(A)$ .

**Definicja 2.7** (Niezależności zdarzeń). *Zdarzenia  $A_1, \dots, A_n$  nazwiemy niezależnymi, jeśli dla dowolnych wskaźników  $k_1, \dots, k_s$ , gdzie  $1 \leq k_1 < \dots < k_s \leq n$  zachodzi*

$$P(A_{k_1}, \dots, A_{k_s}) = P(A_{k_1}) \dots P(A_{k_s}).$$

**Twierdzenie 2.3** (O łącznym prawdopodobieństwie niezależnych zdarzeń). *Jeśli zdarzenia  $A_1, \dots, A_n$  są niezależne to*

$$P(A_1, \dots, A_n) = P(A_1) \dots P(A_n).$$

**Definicja 2.8** (Warunkowej niezależności pary zdarzeń). *Zdarzenia  $A, B$  są warunkowo niezależne względem  $C$  jeśli*

$$P(A, B | C) = P(A | C)P(B | C).$$

**Definicja 2.9** (Warunkowej niezależności zdarzeń). *Zdarzenia  $A_1, \dots, A_n$  są warunkowo niezależne względem  $B$  jeśli dla dowolnych wskaźników  $k_1, \dots, k_s$ , gdzie  $1 \leq k_1 < \dots < k_s \leq n$  zachodzi*

$$P(A_{k_1}, \dots, A_{k_s} | B) = P(A_{k_1} | B) \dots P(A_{k_s} | B).$$

**Twierdzenie 2.4.** *Jeśli zdarzenia  $A_1, \dots, A_n$  są warunkowo niezależne względem  $B$  to*

$$P(A_1, \dots, A_n | B) = P(A_1 | B) \dots P(A_n | B).$$

## 2.3 Prawdopodobieństwo całkowite i wzór Bayesa

**Definicja 2.10** (Układu zupełnego zdarzeń). *Jeśli zdarzenia  $A_1, A_2, \dots$ , są parami rozłączne oraz  $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \Omega$  to zbiór zdarzeń  $\{A_i\}$  nazywamy układem zupełnym.*

**Twierdzenie 2.5** (O prawdopodobieństwie całkowitym). *Jeśli zdarzenia  $A_i$  (gdzie  $i$  przebiega przeliczalny zbiór wartości) tworzą układ zupełny zdarzeń oraz  $P(A_i) > 0$  dla każdego  $i$ , to dla dowolnego zdarzenia  $B$  zachodzi*

$$P(B) = \sum_i P(B | A_i)P(A_i).$$

**Twierdzenie 2.6** (Bayesa). *Jeśli zdarzenia  $A_i$  spełniają założenia tw. o prawdopodobieństwie całkowitym oraz  $P(B) > 0$ , to dla każdego zdarzenia  $A_j$  z rozpatrywanego układu zdarzeń zachodzi*

$$P(A_j | B) = \frac{P(B | A_j)P(A_j)}{P(B)} = \frac{P(B | A_j)P(A_j)}{\sum_i P(B | A_i)P(A_i)}.$$

Prawdopodobieństwa  $P(A_j)$  nazywamy prawdopodobieństwami **a priori**, a  $P(A_j | B)$  – **a posteriori**. Prawdopodobieństwo  $P(B | A_j)$  nazywamy **wiarygodnościami**.

## 2.4 Zmienne losowe

**Definicja 2.11** (Zmiennnej losowej). *Niech  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  będzie przestrzenią probabilistyczną. Niech dany będzie również drugi zbiór  $\mathcal{X}$ , w którym wyróżniamy  $\sigma$ -ciało  $\mathcal{F}_{\mathcal{X}}$ . Zmienną losową  $X$  nazywamy odwzorowanie*

$$X : \Omega \mapsto \mathcal{X}$$



takie, że dla każdego  $A \in \mathcal{F}_X$  zachodzi warunek

$$\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in A\} \in \mathcal{F}.$$

W szczególności jeśli  $\mathcal{X} = \mathbb{R}$  to zmienną losową  $X$  nazywamy **zmienną losową rzeczywistą**, natomiast jeśli  $\mathcal{X} = \mathbb{R}^n$  to zmienną losową  $\mathbf{X}$  nazywamy **zmienną losową  $n$ -wymiarową**.

**Definicja 2.12** (Rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej losowej). *Niech  $X : \Omega \mapsto \mathcal{X}$  będzie zmienną losową. Funkcję  $P_X : \mathcal{F}_X \mapsto [0; 1]$  określoną jako*

$$P_X(A) = P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in A\})$$

*nazywamy rozkładem prawdopodobieństwa zmiennej losowej  $X$ .*

W dalszym ciągu będziemy stosować notację uproszczoną pomijając indeks dolny  $X$  tj.

$$P(X \in A) := P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in A\}).$$

Znajomość rozkładu zmiennej losowej  $X$  pozwala badać własności tej zmiennej bez znajomości przestrzeni probabilistycznej  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ , na której owa zmienna jest określona. Możemy mianowicie zawsze rozpatrywać tę zmienną jako określoną na przestrzeni probabilistycznej  $(\mathcal{X}, \mathcal{F}_X, P_X)$ .

**Definicja 2.13** (Dystrybuanty zmiennej losowej rzeczywistej). *Niech  $X : \Omega \mapsto \mathbb{R}$  będzie zmienną losową rzeczywistą. Dystrybuantą zmiennej losowej  $X$  nazywamy funkcję  $F : \mathbb{R} \mapsto [0; 1]$  zdefiniowaną jako*

$$F(x) = P(X \leq x).$$

**Twierdzenie 2.7** (Własności dystrybuanty zmiennej rzeczywistej). *Niech  $F$  będzie dystrybuantą zmiennej losowej rzeczywistej  $X$ , wówczas*

1. *Jeśli  $a < b$  to  $F(b) - F(a) = P(X \in (a; b])$ .*
2. *Funkcja  $F$  jest niemalejąca.*
3.  *$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$  oraz  $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$ .*
4.  *$F$  jest prawostronnie ciągła.*
5.  *$F$  jest ciągła w  $x_0$  wtedy i tylko wtedy, gdy  $P(X = x_0) = 0$ .*

**Definicja 2.14** (Rozkładu dyskretnego zmiennej losowej rzeczywistej). *Mówimy, że zmienna losowa rzeczywista  $X$  ma rozkład dyskretny jeśli istnieje skończony lub przeliczalny zbiór  $\mathcal{S} \subset \mathbb{R}$  taki, że*

$$P(X \in \mathcal{S}) = 1.$$

*Dla takiej zmiennej określa się funkcję prawdopodobieństwa (z ang. probability mass function, pmf)*

$$p(x) = P(X = x), \quad x \in \mathcal{S}.$$

Zauważmy, że jeśli zmienna  $X$  ma rozkład dyskretny to zbiór  $\mathcal{S}$  ma postać  $\{x_1, \dots, x_k\}$  dla pewnych  $x_i \in \mathbb{R}$ .

**Definicja 2.15** (Rozkładu ciągłego zmiennej losowej rzeczywistej). *Mówimy, że zmienna losowa rzeczywista  $X$  ma rozkład ciągły jeśli istnieje funkcja  $p : \mathbb{R} \mapsto [0; +\infty)$  taka, że dla dowolnego przedziału  $(a; b)$  zachodzi*

$$P(X \in (a; b)) = \int_a^b p(x) dx .$$

Funkcję  $p$  nazywamy gęstością rozkładu prawdopodobieństwa (z ang. probability density function, pdf).

Jeśli  $X$  jest zmienną losową rzeczywistą o rozkładzie ciągłym to wartość dystrybucyjną jest dana przez

$$F(x) = \int_{-\infty}^x p(x') dx' . \quad (2.1)$$

W szczególności dystrybucyjną  $F$  jest ciągła oraz dla każdego  $x$  zachodzi  $P(X = x) = 0$ .

**Definicja 2.16** (Wartości oczekiwanej zmiennej losowej rzeczywistej). *Wartością oczekiwaną zmiennej losowej rzeczywistej  $X$  nazywamy liczbę  $m$  określoną wzorem*

$$m = \int_{-\infty}^{+\infty} xp(x) dx$$

dla rozkładu ciągłego oraz

$$m = \sum_{x \in \mathcal{S}} xp(x)$$

dla rozkładu dyskretnego. Stosujemy dodatkowo oznaczenie  $\mathbb{E}[X] := m$ .

**Definicja 2.17** (Wariancji zmiennej losowej rzeczywistej). *Wariancją zmiennej losowej rzeczywistej  $X$  nazywamy liczbę  $\sigma$  określoną wzorem*

$$\sigma^2 = \mathbb{E}[(X - m)^2] ,$$

gdzie  $m = \mathbb{E}[X]$ . Stosujemy dodatkowo oznaczenie  $\mathbb{V}[X] := \sigma^2$ . **Odchyleniem standardowym** zmiennej losowej  $X$  nazywamy pierwiastek jej wariancji

$$\sigma = \sqrt{\mathbb{V}[X]} .$$

**Twierdzenie 2.8** (Własności wariancji). *Niech  $X$  będzie zmienną losową rzeczywistą, wówczas*

$$1. \mathbb{V}[X] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 .$$

2. Jeśli zmienna  $X$  ma skończoną wariancję, to dla dowolnych  $a, b \in \mathbb{R}$  zachodzi

$$\mathbb{V}[aX + b] = a^2 \mathbb{V}[X].$$

3.  $\mathbb{V}[X] = 0$  wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje  $x_0 \in \mathbb{R}$  takie, że

$$P(X \neq x_0) = 0.$$

**Definicja 2.18** (Zmiennej standaryzowanej). Zmienną losową o wartości oczekiwanej 0 i wariancji 1 nazywamy zmienną standaryzowaną. Jeśli  $X$  jest dowolną zmienną o niezerowej wariancji, to

$$Z := \frac{X - m}{\sigma}$$

jest zmienną standaryzowaną, ponieważ

$$\mathbb{E}[Z] = \frac{1}{\sigma} \mathbb{E}[X - m] = \frac{1}{\sigma}(m - m) = 0$$

oraz

$$\mathbb{V}[Z] = \frac{1}{\sigma^2} \mathbb{V}[X] = \frac{\sigma^2}{\sigma^2} = 1.$$

**Twierdzenie 2.9** (Nierówność Czebyszewa). Jeśli zmienna losowa  $X$  ma skończoną wartość średnią  $m$  i wariancję  $\sigma^2$ , to dla dowolnego  $\epsilon > 0$  zachodzi

$$P(|X - m| \geq \epsilon \sigma) \leq \frac{1}{\epsilon^2}.$$

**Definicja 2.19** (Kwantyla). Kwantylem rzędu  $p \in (0; 1)$  zmiennej losowej o dystrybucji  $F$  nazywamy dowolną liczbę  $q_p$  taką, że

$$F(q_p^-) \leq p \leq F(q_p).$$

Kwantyl rzędu 0.5 nazywamy **medianą**, kwantyl rzędu 0.25 – **dolnym kwantylem**, a kwantyl rzędu 0.75 – **górnym kwantylem**. Jeśli  $X$  ma rozkład ciągły, to kwantylem rzędu  $p$  jest dowolne rozwiązanie równania

$$F(q_p) = p.$$

**Definicja 2.20** (Mody). Modą zmiennej losowej o rozkładzie dyskretnym nazywa się dowolne maksimum funkcji prawdopodobieństwa tego rozkładu.

Modą zmiennej losowej o rozkładzie ciągłym nazywa się dowolne maksimum lokalne gęstości tego rozkładu.

## 2.5 Ważne rozkłady jednowymiarowe

**Definicja 2.21** (Rozkładu jednopunktowego). Jeśli  $X$  jest zmienną losową rzeczywistą o rozkładzie dyskretnym i  $\mathcal{S} = \{x_0\}$ , to mówimy, że  $X$  ma rozkład jednopunktowy, wówczas

$$m = x_0, \quad \sigma^2 = 0.$$

**Definicja 2.22** (Rozkładu dwupunktowego). *Jeśli  $X$  jest zmienną losową rzeczywistą o rozkładzie dyskretnym i  $\mathcal{S} = \{x_1, x_2\}$  oraz  $p(x_1) = p$ , to mówimy, że  $X$  ma rozkład dwupunktowy z parametrem  $p$ , wówczas*

$$m = x_1 p + x_2 (1 - p), \quad \sigma^2 = p(1 - p)(x_1 - x_2)^2.$$

*Jeśli  $x_1 = 1$  i  $x_2 = 0$  to taki rozkład dwupunktowy nazywamy **rozkładem zero-jedynkowym** (lub rozkładem Bernoulliego) i oznaczamy jako  $X \sim \text{Ber}(p)$ .*

**Definicja 2.23** (Schematu dwumianowego). *Rozważmy doświadczenie losowe o dwu możliwych wynikach: sukces osiągamy z prawdopodobieństwem  $p$ , porażkę z prawdopodobieństwem  $1 - p$ . Doświadczenie tego rodzaju nazywamy **próbą Bernoulliego**. Doświadczenie takie jest modelowane zmienną losową o rozkładzie dwupunktowym z parametrem  $p$ . Schematem dwumianowym (lub schematem Bernoulliego) nazywamy doświadczenie polegające na  $n$ -krotnym powtórzeniu próby Bernoulliego, przy założeniu, iż poszczególne próby są od siebie niezależne.*

**Definicja 2.24** (Rozkładu dwumianowego). *Niech  $X$  będzie zmienną losową taką, że  $X$  jest liczbą sukcesów w schemacie dwumianowym długości  $n$  z prawdopodobieństwem sukcesu w każdej próbie równym  $p$ . Wówczas*

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

*Rozkład prawdopodobieństwa określony powyższym wzorem nazywam się rozkładem dwumianowym o parametrach  $n, p$ . Jeśli zmienna  $X$  ma rozkład dwumianowy to stosujemy notację  $X \sim \text{Bin}(n, p)$ . Jeśli  $X \sim \text{Bin}(n, p)$  to*

$$m = np, \quad \sigma^2 = np(1 - p).$$

**Definicja 2.25** (Rozkładu geometrycznego). *Mówimy, że zmienna losowa  $X$  ma rozkład geometryczny z parametrem  $p \in (0; 1)$ , tj.  $X \sim \text{Geo}(p)$ , jeśli  $\mathcal{S} = \mathbb{N} \setminus \{0\}$ , a funkcja prawdopodobieństwa ma postać*

$$p(x) = (1 - p)^{x-1} p.$$

*Zmienna  $X$  opisuje czas oczekiwania na pierwszy sukces w schemacie dwumianowym o nieskończonej długości. Jeśli  $X \sim \text{Geo}(p)$ , to*

$$m = p^{-1}, \quad \sigma^2 = \frac{1 - p}{p^2}.$$

**Definicja 2.26** (Rozkładu Poissona). *Jeśli zmienna  $X$  o wartościach w  $\mathbb{N}$  opisuje liczbę wystąpień pewnego powtarzalnego zdarzenia w przedziale czasowym  $[0; t]$ , przy czym spełnione są następujące założenia:*

- powtórzenia zdarzenia występują niezależnie od siebie;
- „intensywność” wystąpień  $r$  jest stała;

- w danej chwili (rozumianej jako odpowiednio mały przedział) może zajść co najwyżej jedno zdarzenie

to zmienna ta ma rozkład Poissona z parametrem  $\lambda = rt$ , tj.  $X \sim \text{Pos}(\lambda)$ .  
Jeśli  $X \sim \text{Pos}(\lambda)$ , to

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}.$$

Ponadto

$$m = \lambda, \quad \sigma^2 = \lambda.$$

**Twierdzenie 2.10** (Poissona). Niech  $(X_n)$  będzie ciągiem zmiennych losowych takich, że  $X_n \sim \text{Bin}(n, p_n)$ , gdzie  $(p_n)$  jest ciągiem takim, że

$$\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda$$

dla pewnej liczby  $\lambda > 0$ . Wówczas

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}.$$

**Definicja 2.27** (Rozkładu jednostajnego). Mówimy, że zmienna  $X$  o rozkładzie ciągłym ma rozkład jednostajny na przedziale  $[a; b]$  tzn.  $X \sim \mathcal{U}(a, b)$  jeśli jej gęstość wyraża się wzorem

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a; b] \\ 0, & x \notin [a; b] \end{cases}.$$

Jeśli  $X \sim \mathcal{U}(a, b)$ , to

$$m = \frac{a+b}{2}, \quad \sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

**Definicja 2.28** (Rozkładu wykładniczego). Niech  $T$  będzie zmienną modelującą czas oczekiwania na pierwsze zdarzenie w ciągu zdarzeń takim, że czas wystąpienia każdego z nich w przedziale  $[0; t]$  jest opisany przez zmienną  $X \sim \text{Pos}(\lambda t)$ . wtedy

$$P(T > t) = P(X = 0) = e^{-\lambda t}$$

oraz

$$P(T > 0) = 1.$$

Mówimy wtedy, że  $T$  ma rozkład wykładniczy z parametrem  $\lambda$ , tzn.  $T \sim \text{Exp}(\lambda)$ . Gęstość rozkładu wykładniczego ma postać

$$p(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ \lambda e^{-\lambda t}, & t > 0 \end{cases}.$$

Jeśli  $T \sim \text{Exp}(\lambda)$ , to

$$m = \lambda^{-1}, \quad \sigma^2 = \lambda^{-2}.$$

**Definicja 2.29** (Rozkładu normalnego). *Mówimy, że zmienna losowa  $X$  o gęstości  $\phi(x; \mu, \sigma^2)$  ma rozkład normalny z parametrami  $\mu \in \mathbb{R}, \sigma^2 \in [0; +\infty)$ , tzn.  $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ , jeśli*

$$\phi(x; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right).$$

Jeśli  $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ , to

$$m = \mu, \quad \mathbb{V}[X] = \sigma^2.$$

Jeśli  $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ , to

$$\begin{aligned} P(|X - m| > 2\sigma) &\approx 0.0455003, \\ P(|X - m| > 3\sigma) &\approx 0.0026998. \end{aligned} \tag{2.2}$$

Obserwacje te nazywamy odpowiednio regułą 5% oraz regułą  $3\sigma$ . Rozkład  $\mathcal{N}(0, 1)$  nazywamy **standardowym rozkładem normalnym**. Jeśli  $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ , to zmienna standaryzowana  $Z = (X - \mu)/\sigma$  ma standardowy rozkład normalny.

## 2.6 Zmienne losowe wielowymiarowe

**Definicja 2.30** (Dystrybuanty zmiennej losowej wielowymiarowej). *Niech  $\mathbf{X} : \Omega \mapsto \mathbb{R}^n$  będzie zmienną losową  $n$ -wymiarową. Dystrybantą zmiennej losowej  $\mathbf{X}$  nazywamy funkcję  $F : \mathbb{R}^n \mapsto [0; 1]$  zdefiniowaną jako*

$$F(\mathbf{x}) = P(\mathbf{X}_1 \leq \mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{X}_n \leq \mathbf{x}_n)$$

**Definicja 2.31** (Rozkładu dyskretnego zmiennej losowej wielowymiarowej). *Mówimy, że  $n$ -wymiarowa zmienna losowa  $\mathbf{X}$  ma rozkład dyskretny jeśli istnieje zbiór skończony lub przeliczalny  $\mathcal{S} \subset \mathbb{R}^n$  taki, że*

$$P(\mathbf{X} \in \mathcal{S}) = 1.$$

*Dla takiej zmiennej określa się funkcję prawdopodobieństwa (z ang. probability mass function, pmf)*

$$p(\mathbf{x}) = P(\mathbf{X}_1 = \mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{X}_n = \mathbf{x}_n), \quad \mathbf{x} \in \mathcal{S}.$$

Zauważmy, że jeśli zmienna  $\mathbf{X}$  ma rozkład dyskretny to zbiór  $\mathcal{S}$  ma postać  $\{\mathbf{x}^1, \dots, \mathbf{x}^k\}$  dla pewnych  $\mathbf{x}^i \in \mathbb{R}^n$ .

**Definicja 2.32** (Rozkładu ciągłego zmiennej losowej wielowymiarowej). *Mówimy, że  $n$ -wymiarowa zmienna losowa  $\mathbf{X}$  ma rozkład ciągły jeśli istnieje funkcja  $p : \mathbb{R}^n \mapsto [0; +\infty)$  taka, że dla dowolnych przedziałów  $(a_i; b_i)$  zachodzi*

$$P(\mathbf{X}_1 \in (a_1; b_1), \dots, \mathbf{X}_n \in (a_n; b_n)) = \int_{a_1}^{b_1} \dots \int_{a_n}^{b_n} p(\mathbf{x}) d^n \mathbf{x}.$$

*Funkcję  $p$  nazywamy gęstością rozkładu prawdopodobieństwa (z ang. probability density function, pdf).*

Zauważmy, że jeśli  $\mathbf{X}$  jest zmienną losową wielowymiarową o rozkładzie ciągłym to wartość dystrybucyjną jest związana z gęstością rozkładu prawdopodobieństwa poprzez

$$F(\mathbf{x}) = \int_{-\infty}^{\mathbf{x}_1} \dots \int_{-\infty}^{\mathbf{x}_n} p(\mathbf{x}') d^n \mathbf{x}' . \quad (2.3)$$

**Definicja 2.33** (Wartości oczekiwanej zmiennej losowej wielowymiarowej). *Wartością oczekiwaną zmiennej losowej wielowymiarowej nazywamy  $n$ -elementowy wektor rzeczywisty  $\mathbf{m}$ , którego elementy są określone wzorem*

$$\mathbf{m} = \int_{\mathbb{R}^n} \mathbf{x} p(\mathbf{x}) d^n \mathbf{x}$$

dla rozkładu ciągłego oraz

$$\mathbf{m} = \sum_{\mathbf{x} \in \mathcal{S}} \mathbf{x} p(\mathbf{x})$$

dla rozkładu dyskretnego. Stosujemy dodatkowo oznaczenie  $\mathbb{E}[\mathbf{X}] := \mathbf{m}$ .

**Definicja 2.34** (Rozkładu brzegowego). *Niech  $\mathbf{X}$  będzie  $n$ -wymiarową zmienną losową. Weźmy dwa zbiory indeksów  $\{i_1, \dots, i_k\} \subset \{1, \dots, n\}$  i  $\{j_1, \dots, j_{n-k}\} = \{1, \dots, n\} \setminus \{i_1, \dots, i_k\}$ .  $(n-k)$ -wymiarowym rozkładem brzegowym zmiennej  $\mathbf{X}$  (względem zmiennych  $j_1, \dots, j_{n-k}$ ) nazywamy rozkład prawdopodobieństwa na przestrzeni  $\mathbb{R}^{n-k}$  określony wzorem*

$$\begin{aligned} P_{\mathbf{X}_{j_1}, \dots, \mathbf{X}_{j_{n-k}}}(A) \\ &= P([\mathbf{X}_{j_1}, \dots, \mathbf{X}_{j_{n-k}}] \in A) \\ &= P([\mathbf{X}_{j_1}, \dots, \mathbf{X}_{j_{n-k}}] \in A, \mathbf{X}_{i_1} \in \mathbb{R}, \dots, \mathbf{X}_{i_k} \in \mathbb{R}) \end{aligned}$$

Niech  $\mathbf{X}$  będzie  $n$ -wymiarową zmienną losową o dystrybucji  $F$ . Dystrybucja rozkładu brzegowego  $\mathbf{X}$  względem zmiennych  $\mathbf{X}_{j_1}, \dots, \mathbf{X}_{j_{n-k}}$  spełnia równość

$$F_{\mathbf{X}_{j_1}, \dots, \mathbf{X}_{j_{n-k}}}(\mathbf{x}_{j_1}, \dots, \mathbf{x}_{j_{n-k}}) = \lim_{\mathbf{x}_{i_1} \rightarrow \infty, \dots, \mathbf{x}_{i_k} \rightarrow \infty} F(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n). \quad (2.4)$$

Dystrybucja ta nosi nazwę  $(n-k)$ -wymiarowej dystrybucji brzegowej.

Jeśli  $\mathbf{X}$  jest  $n$ -wymiarową zmienną losową o rozkładzie ciągłym, to rozkłady brzegowe są także rozkładami ciągłymi o gęstościach

$$p_{\mathbf{X}_{j_1}, \dots, \mathbf{X}_{j_{n-k}}}(\mathbf{x}_{j_1}, \dots, \mathbf{x}_{j_{n-k}}) = \int_{\mathbb{R}^k} p(\mathbf{x}') d\mathbf{x}_{i_1} \dots d\mathbf{x}_{i_k}. \quad (2.5)$$

Jeśli z kolei  $\mathbf{X}$  ma rozkład dyskretny, to rozkłady brzegowe także są rozkładami dyskretnymi z funkcjami prawdopodobieństwa

$$p_{\mathbf{X}_{j_1}, \dots, \mathbf{X}_{j_{n-k}}}(\mathbf{x}_{j_1}, \dots, \mathbf{x}_{j_{n-k}}) = \sum_{i_1, \dots, i_k} p(\mathbf{x}). \quad (2.6)$$

**Twierdzenie 2.11.** Niech zmienna  $n$ -wymiarowa  $\mathbf{X}$  ma rozkład ciągły o gęstości  $p_{\mathbf{X}}$  i niech  $\mathbf{Y}_i = \varphi_i(\mathbf{X})$  dla  $i = 1, \dots, n$ . Jeśli odwzorowanie  $\varphi$  jest różniczkowalne i odwracalne, przy czym odwzorowanie odwrotne  $\psi = \varphi^{-1}$  jest różniczkowalne, to  $n$ -wymiarowa zmienna  $\mathbf{Y}$  ma rozkład o gęstości

$$p_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y}) = |J|p_{\mathbf{X}}(\psi(\mathbf{y})),$$

gdzie  $J := \det \left[ \frac{\partial \psi_i}{\partial y_i} \right]$  jest jacobianem odwzorowania  $\psi$ .

## 2.7 Niezależność zmiennych losowych

**Definicja 2.35** (Niezależności zmiennych losowych). Niech  $X_i : \Omega \mapsto \mathcal{X}$  będą zmiennymi losowymi. Zmienne  $X_1, \dots, X_n$  nazywamy niezależnymi jeżeli dla dowolnych  $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}_{\mathcal{X}}$  zachodzi równość

$$P(X_1 \in A_1, \dots, X_n \in A_n) = P(X_1 \in A_1) \dots P(X_n \in A_n).$$

**Twierdzenie 2.12.** Zmienne losowe wielowymiarowe  $\mathbf{X}, \mathbf{Y}$  o rozkładzie dyskretnym lub ciągłym z funkcją lub gęstością prawdopodobieństwa  $p(\mathbf{x}, \mathbf{y})$  są niezależne wtedy i tylko wtedy, gdy dla dowolnych  $\mathbf{x}, \mathbf{y}$  zachodzi równość

$$p(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = p_{\mathbf{X}}(\mathbf{x})p_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y}).$$

**Twierdzenie 2.13** (O niezależności funkcji zmiennych losowych). Niech  $X_1, \dots, X_n$  będą zmiennymi losowymi o wartościach  $\mathcal{X}$ , a  $g_1, \dots, g_n : \mathcal{X} \mapsto \mathcal{Y}$ ,  $\varphi : \mathcal{X}^m \mapsto \mathcal{Y}$  i  $\psi : \mathcal{X}^{n-m} \mapsto \mathcal{Y}$  funkcjami oraz  $m < n$ . Wówczas jeśli  $X_1, \dots, X_n$  są niezależne to:

1. zmienne losowe  $g_1(X_1), \dots, g_n(X_n)$  są niezależne;
2. zmienne losowe  $\varphi(X_1, \dots, X_m)$  i  $\psi(X_{m+1}, \dots, X_n)$  są niezależne.

Jeśli  $(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$  jest zmienną losową o rozkładzie ciągłym z gęstością  $p(\mathbf{x}, \mathbf{y})$  i gęstość brzegowa  $p_{\mathbf{Y}}$  jest funkcją dodatnią, to dla każdego  $\mathbf{y}$  rozkład warunkowy  $\mathbf{X}$  pod warunkiem  $\mathbf{Y} = \mathbf{y}$  także jest ciągły z gęstością

$$p(\mathbf{x} | \mathbf{y}) = \frac{p(\mathbf{x}, \mathbf{y})}{p_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y})}, \quad (2.7)$$

którą nazywamy gęstością warunkową  $\mathbf{X}$  pod warunkiem  $\mathbf{Y} = \mathbf{y}$ .

Jeśli  $(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$  jest zmienną losową o rozkładzie dyskretnym z funkcją prawdopodobieństwa  $p(\mathbf{x}, \mathbf{y})$  i brzegowa funkcja prawdopodobieństwa  $p_{\mathbf{Y}}$  jest funkcją dodatnią, to dla każdego  $\mathbf{y}$  rozkład warunkowy  $\mathbf{X}$  pod warunkiem  $\mathbf{Y} = \mathbf{y}$  także jest dyskretny z funkcją prawdopodobieństwa

$$p(\mathbf{x} | \mathbf{y}) = \frac{p(\mathbf{x}, \mathbf{y})}{p_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y})}, \quad (2.8)$$

którą nazywamy warunkową funkcją prawdopodobieństwa  $\mathbf{X}$  pod warunkiem  $\mathbf{Y} = \mathbf{y}$ .



**Definicja 2.36** (Warunkowej wartości oczekiwanej). *Warunkową wartość oczekiwaną  $\mathbf{X}$  pod warunkiem  $\mathbf{Y} = \mathbf{y}$  nazywamy wielkość*

$$\mathbb{E}[\mathbf{X} | \mathbf{y}] = \int_{\mathbb{R}^n} \mathbf{x} p(\mathbf{x} | \mathbf{y}) d^n \mathbf{x}$$

**Definicja 2.37** (Warunkowej niezależności). *Niech  $X_i : \Omega \mapsto \mathcal{X}$  oraz  $Y$  będą zmiennymi losowymi. Mówimy, że zmienne  $X_1, \dots, X_n$  są warunkowo niezależne względem  $Y$ , jeśli dla dowolnych  $A_i \in \mathcal{F}_{\mathcal{X}}$  i dowolnej wartości  $y$  zachodzi*

$$\begin{aligned} P(X_1 \in A_1, \dots, X_n \in A_n | Y = y) \\ = P(X_1 \in A_1 | Y = y) \dots P(X_n \in A_n | Y = y). \end{aligned}$$

Dla rozkładów ciągłych lub dyskretnych z gęstością lub funkcją prawdopodobieństwa  $p$  warunkowa niezależność  $\mathbf{X}, \mathbf{Y}$  względem  $\mathbf{Z}$  jest równoważna

$$p(\mathbf{x}, \mathbf{y} | \mathbf{z}) = p_{\mathbf{X}}(\mathbf{x} | \mathbf{z}) p_{\mathbf{Y}}(\mathbf{y} | \mathbf{z}).$$

## 2.8 Kowariancja i współczynnik korelacji

**Definicja 2.38** (Kowariancji). *Kowariancją zmiennych losowych rzeczywistych  $X, Y$  o nazywamy liczbę*

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - m_X)(Y - m_Y)],$$

gdzie wartości oczekiwane są liczone względem łącznego rozkładu prawdopodobieństwa  $p(x, y)$ . **Współczynnikiem korelacji zmiennych  $X, Y$**  nazywamy liczbę

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}.$$

**Twierdzenie 2.14** (Własności kowariancji). *Niech  $X, Y$  będą zmiennymi losowymi rzeczywistymi, wówczas*

1.  $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - m_X m_Y$ .
2. Jeśli  $X$  i  $Y$  są niezależne oraz istnieje  $\mathbb{E}(XY)$ , to  $\text{Cov}(X, Y) = 0$ .

**Definicja 2.39** (Macierzy kowariancji). *Macierz kowariancji  $\mathbf{K}$   $n$ -wymiarowej zmiennej losowej  $\mathbf{X}$  nazywamy macierz  $n \times n$  zdefiniowaną jako*

$$\mathbf{K} = \mathbb{E}[(\mathbf{X} - \mathbf{m})(\mathbf{X} - \mathbf{m})^T]$$

lub równoważnie

$$\mathbf{K}_{ij} = \begin{cases} \mathbb{V}[\mathbf{X}_i], & i = j \\ \text{Cov}(\mathbf{X}_i, \mathbf{X}_j), & i \neq j \end{cases}.$$

**Twierdzenie 2.15** (Własności macierzy kowariancji). *Niech  $\mathbf{K}$  będzie macierzą kowariancji zmiennej  $\mathbf{X}$ , wówczas*

1. Macierz kowariancji jest symetryczna.
2. Macierz kowariancji jest nieujemnie określona.
3. Jeśli zmienne  $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n$  są niezależne, to macierz kowariancji jest diagonalna.

## 2.9 Wielowymiarowy rozkład normalny

**Definicja 2.40** (Standardowego wielowymiarowego rozkładu normalnego). Zmienna losowa  $\mathbf{X}$  ma standardowy  $n$ -wymiarowy rozkład normalny jeśli jej składowe są niezależne i dla każdego  $i = 1, \dots, n$   $\mathbf{X}_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$ . Jest to rozkład ciągły o gęstości

$$p(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n}} \exp\left(-\frac{1}{2}\mathbf{x}^T \mathbf{x}\right).$$

**Definicja 2.41** (Wielowymiarowego rozkładu normalnego). Zmienna losowa  $\mathbf{X}$  ma  $n$ -wymiarowy rozkład normalny (z ang. *Multivariate Normal Distribution*, *MVN*), tzn.  $\mathbf{X} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$  jeśli istnieje  $k$ -wymiarowa zmienna losowa  $\mathbf{Z}$  o standardowym rozkładzie normalnym dla pewnego  $k \leq n$  oraz istnieje  $\boldsymbol{\mu} \in \mathbb{R}^n$  i macierz  $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times k}$  takie, że  $\boldsymbol{\Sigma} = \mathbf{A}\mathbf{A}^T$  oraz

$$\mathbf{X} = \mathbf{A}\mathbf{Z} + \boldsymbol{\mu}.$$

Jeśli macierz  $\boldsymbol{\Sigma}$  jest dodatnio określona, to rozkład  $\mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$  jest ciągły, a jego gęstość jest dana przez

$$p(\mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \det \boldsymbol{\Sigma}}} \exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^T \boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})\right)$$

Macierz  $\boldsymbol{\Sigma}^{-1}$  nazywa się **macierzą precyzji**.

Poziomice gęstości niezdegenerowanego wielowymiarowego rozkładu normalnego są elipsoidami, których półosie są skierowane wzdłuż wektorów własnych macierzy  $\boldsymbol{\Sigma}$  i mają długości proporcjonalne do pierwiastka z wartości własnych.

**Twierdzenie 2.16** (Własności niezdegenerowanego rozkładu normalnego). Niech  $\mathbf{X} \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$  dla dodatnio określonej macierzy  $\boldsymbol{\Sigma}$ , wówczas

1. Wszystkie rozkłady brzegowe i warunkowe  $\mathbf{X}$  są rozkładami normalnymi.
2. Zmienne składowe  $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n$  są niezależne wtedy i tylko wtedy, gdy  $\boldsymbol{\Sigma}$  jest macierzą diagonalną.

## 2.10 Rodzaje zbieżności zmiennych losowych

Niech  $X_1, X_2, \dots$  i  $X$  będą zmiennymi losowymi o wartościach w tej samej przestrzeni  $\mathcal{X}$ .

**Definicja 2.42** (Zbieżności stochastycznej). Ciąg  $(X_n)$  jest zbieżny do  $X$  według prawdopodobieństwa (lub stochastycznie) jeśli dla każdego  $\epsilon > 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| < \epsilon) = 1.$$

**Definicja 2.43** (Zbieżności z prawdopodobieństwem 1). Ciąg  $(X_n)$  jest zbieżny do  $X$  z prawdopodobieństwem 1 jeśli

$$P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X\right) = 1.$$

**Definicja 2.44** (Zbieżności według dystrybuant). Załóżmy, że  $\mathcal{X} = \mathbb{R}^k$  i niech  $F_{\mathbf{X}^n}$  będzie dystrybuantą  $\mathbf{X}^n$ ,  $F_{\mathbf{X}}$  dystrybuantą  $\mathbf{X}$ . Ciąg  $(\mathbf{X}^n)$  jest zbieżny do  $\mathbf{X}$  według dystrybuant jeśli dla każdego  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^k$  takiego, że  $F_{\mathbf{X}}$  jest ciągła w  $\mathbf{x}$  zachodzi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_{\mathbf{X}^n}(\mathbf{x}) = F_{\mathbf{X}}(\mathbf{x}).$$

**Twierdzenie 2.17** (Zależności między rodzajami zbieżności). Niech  $(X_n)$  będzie ciągiem zmiennych losowych. Wówczas

1. Jeśli  $X_n \rightarrow X$  z prawdopodobieństwem 1, to  $X_n \rightarrow X$  według prawdopodobieństwa.
2. Jeśli  $X_n \rightarrow X$  według prawdopodobieństwa, to istnieje podciąg  $X_{n_k}$  taki, że  $X_{n_k} \rightarrow X$  z prawdopodobieństwem 1.
3. Jeśli  $X_n \rightarrow X$  według prawdopodobieństwa, to  $X_n \rightarrow X$  według dystrybuant.

## 2.11 Wnioskowanie statystyczne

Niech zmienna losowa  $X$  określa model rozkładu pewnej cechy (cech) w ustalonym zbiorze instancji (tzw. **populacji generalnej**). Innymi słowy, przyjmujemy, że wartości cech zachowują się jakby zostały wybrane losowo zgodnie z rozkładem zmiennej  $X$ . Do podstawowych zagadnień wnioskowania statystycznego należą:

- oszacowanie wielkości charakteryzujących rozkład  $X$  (np. wartości średniej albo wariancji);
- weryfikacja hipotez dotyczących rozkładu  $X$  (tym nie będziemy się zajmować).

**Definicja 2.45** (Modelu statystycznego). Modelem statystycznym nazywamy parę  $(\mathcal{P}, \mathcal{X})$ , gdzie  $\mathcal{P}$  jest rodziną rozkładów prawdopodobieństwa na zbiorze  $\mathcal{X}$ . Zazwyczaj przyjmuje się

$$\mathcal{P} = \{P_{\boldsymbol{\theta}} : \boldsymbol{\theta} \in \Theta\}$$

dla pewnego zbioru parametrów  $\Theta$ . Model statystyczny nazywamy **parametrycznym** jeśli  $\Theta \subset \mathbb{R}^k$ .

**Definicja 2.46** (Prostej próby losowej). *Prostą próbą losową o liczności  $n$  nazywamy ciąg niezależnych zmiennych losowych  $X_1, \dots, X_n$  o wartościach w  $\mathcal{X}$  i o tym samym rozkładzie  $P_{\theta} \in \mathcal{P}$  (z ang. independent and identically distributed, i.i.d).*

**Definicja 2.47** (Realizacji prostej próby losowej). *Ciąg wartości  $x_1, \dots, x_n \in \mathcal{X}$  takich, żeby*

$$X_1(\omega) = x_1, \dots, X_n(\omega) = x_n$$

*dla pewnego  $\omega$  nazywamy realizacją prostej próby losowej  $X_1, \dots, X_n$ .*

**Definicja 2.48** (Statystyki). *Statystyką nazywa się zmienną losową będącą funkcją prostej próby losowej  $T(X_1, \dots, X_n)$ .*

Średnią w prostej próbie losowej nazywa się statystykę

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i. \quad (2.9)$$

Wariancję w prostej próbie losowej nazywa się statystykę

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2. \quad (2.10)$$

## 2.12 Prawa wielkich liczb i CTG

**Definicja 2.49.** *Mówimy, że dla ciągu zmiennych losowych  $X_1, X_2, \dots$  zachodzi **słabe prawo wielkich liczb** jeżeli*

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - \mathbb{E}[X_k]) \rightarrow 0$$

*według prawdopodobieństwa. Jeżeli powyższy ciąg jest zbieżny z prawdopodobieństwem 1, to mówimy, że dla ciągu  $(X_n)$  zachodzi **mocne prawo wielkich liczb**.*

**Twierdzenie 2.18.** *Słabe prawo wielkich liczb zachodzi, jeśli ciąg  $(X_n)$  spełnia jeden z podanych warunków:*

- $\frac{1}{n^2} \mathbb{V}[\sum_{k=1}^n X_k] \rightarrow 0$  (prawo wielkich liczb Markowa).
- $X_n$  są niezależne i ich wariancje są wspólnie ograniczone (prawo wielkich liczb Czebyszewa).
- $X_n$  są niezależne i mają ten sam rozkład o skończonej wartości średniej (prawo wielkich liczb Chinczyna).

**Twierdzenie 2.19** (Prawo wielkich liczb Kołmogorowa). *Jeśli  $X_n$  są niezależne, mają skończone wariancje oraz*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathbb{V}[X_n]}{n^2} < +\infty,$$

*to dla  $X_n$  zachodzi mocne prawo wielkich liczb (prawo wielkich liczb Kołmogorowa).*

**Twierdzenie 2.20** (Centralne Twierdzenie Graniczne). *Niech  $X_n$  będzie ciągiem niezależnych zmiennych losowych o tym samym rozkładzie ze skończoną wartością średnią  $m$  i wariancją  $\sigma^2 > 0$ . Wtedy ciąg  $Z_n$*

$$Z_n := \frac{\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

*jest zbieżny według dystrybucji do zmiennej losowej  $Z$  o standardowym rozkładzie normalnym.*

## 2.13 Estymatory punktowe

**Definicja 2.50** (Estymatora). *Estymatorem nazywa się statystykę  $\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$  służącą do oszacowania wartości parametru  $\theta$ . Liczbę  $\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$  dla konkretnej realizacji prostej próby losowej nazywa się wartością estymatora albo estymatą.*

**Definicja 2.51** (Obciążenia estymatora). *Liczbę*

$$B(\hat{\theta}) = \mathbb{E}[\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)] - \theta$$

*nazywamy obciążeniem estymatora  $\hat{\theta}$ . Jeśli  $B(\hat{\theta}) = 0$  to estymator nazywamy nieobciążonym.*

**Definicja 2.52** (Błąd średniokwadratowy). *Błędem średniokwadratowym (z ang. Mean Squared Error, MSE) estymatora  $\hat{\theta}$  parametru  $\theta$  nazywamy liczbę*

$$\text{MSE}(\hat{\theta}) = \mathbb{E}[(\hat{\theta} - \theta)^2].$$

**Twierdzenie 2.21.** *Dla dowolnego estymatora  $\hat{\theta}$  zachodzi*

$$\text{MSE}(\hat{\theta}) = \mathbb{V}[\hat{\theta}] + (B(\hat{\theta}))^2.$$

**Definicja 2.53** (Funkcji wiarygodności). *Funkcją wiarygodności (z ang. likelihood function) dla modelu  $\mathcal{P} = \{P_{\theta} : \theta \in \Theta\}$  nazywamy funkcję*

$$\mathcal{L} : \mathbb{R}^n \times \Theta \ni (\mathbf{x}, \theta) \mapsto \mathcal{L}(\mathbf{x}; \theta) \in [0; +\infty)$$

*wyznaczającą rozkład łączny obserwowanych danych jako funkcję parametru  $\theta$ .*

Niech  $\mathbf{X}^1, \dots, \mathbf{X}^n$  będzie prostą próbą losową. Jeśli  $P_{\boldsymbol{\theta}}$  są rozkładami ciągłymi lub dyskretnymi o gęstościach lub funkcjach prawdopodobieństwa  $p(\cdot; \boldsymbol{\theta})$ , to

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}^1, \dots, \mathbf{x}^n; \boldsymbol{\theta}) = \prod_{i=1}^n p(\mathbf{x}^i; \boldsymbol{\theta}). \quad (2.11)$$

Dla wygody obliczeń często rozważa się tzw. zanegowaną logarytmiczną funkcję wiarygodności (z ang. *Negated Log-Likelihood function*, *NLL*), tzn.

$$L(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta}) = -\log \mathcal{L}(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta}). \quad (2.12)$$

Wówczas dla realizacji prostej próby losowej mamy

$$L(\mathbf{x}^1, \dots, \mathbf{x}^n; \boldsymbol{\theta}) = -\sum_{i=1}^n \log p(\mathbf{x}^i; \boldsymbol{\theta}). \quad (2.13)$$

**Definicja 2.54** (Estymatora największej wiarygodności). *Estymatorem największej wiarygodności (z ang. *Maximum Likelihood Estimator*, *MLE*) nazywamy funkcję  $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ , która przy ustalonych wartościach obserwacji (realizacji prostej próby losowej)  $\{\mathbf{x}^1, \dots, \mathbf{x}^n\}$  maksymalizuje wartość funkcji wiarygodności lub, co równoważne, minimalizuje wartość zanegowanej logarytmicznej funkcji wiarygodności tj.*

$$\hat{\boldsymbol{\theta}}(\mathbf{x}^1, \dots, \mathbf{x}^n) = \arg \min_{\boldsymbol{\theta} \in \Theta} \left[ -\sum_{i=1}^n \log p(\mathbf{x}^i; \boldsymbol{\theta}) \right].$$

Jeśli funkcja wiarygodności jest różniczkowalna względem  $\boldsymbol{\theta}$  dla dowolnych  $\mathbf{x}^i$ , to MLE można czasem wyznaczyć analitycznie korzystając z warunku koniecznego optymalności, tzn. rozwiązując układ równań

$$\frac{\partial L(\mathbf{x}^1, \dots, \mathbf{x}^n; \boldsymbol{\theta})}{\partial \boldsymbol{\theta}} = 0. \quad (2.14)$$

Jeśli MLE nie da się wyliczyć analitycznie, wyznacza się je przy użyciu algorytmów optymalizacji numerycznej. Estymatory MLE są asymptotycznie nieobciążone.

### 3 Elementy statystycznego uczenia maszynowego

Przechodzimy teraz do zagadnień uczenia maszynowego, w których wykorzystamy przedstawioną wcześniej teorię rachunku prawdopodobieństwa (w szczególności teorię zmiennych losowych) oraz wnioskowania statystycznego.

#### 3.1 Podstawy wnioskowania bayesowskiego

Niech  $\mathcal{X} = \{\mathbf{x}^1, \dots, \mathbf{x}^n\}$  będzie realizacją prostej próby losowej, czyli inaczej zbiorem obserwacji i.i.d. Zakładamy, że obserwacje te pochodzą z pewnego parametrycznego modelu statystycznego  $\mathcal{P}$  z parametrami  $\boldsymbol{\theta} \in \Theta$ . Wcześniej  $\boldsymbol{\theta}$

niał jedynie rangę parametru. We wnioskowaniu bayesowskim uznajemy, że parametry  $\boldsymbol{\theta}$  są również zmiennymi losowymi, a model statystyczny modeluje warunkowy rozkład prawdopodobieństwa obserwacji pod warunkiem parametru. Mamy zatem rodzinę gęstości prawdopodobieństwa  $p(\mathbf{x} | \boldsymbol{\theta})$  i chcemy wnioskować o parametrze  $\boldsymbol{\theta}$  na podstawie obserwacji  $\mathcal{X}$ . Jeśli znamy rozkład a priori (inaczej **prior**) parametru  $\boldsymbol{\theta}$  opisany przez  $p(\boldsymbol{\theta})$ , to z twierdzenia Bayesa rozkład a posteriori (**posterior**) jest dany przez

$$p(\boldsymbol{\theta} | \mathcal{X}) = \frac{p(\mathcal{X} | \boldsymbol{\theta})p(\boldsymbol{\theta})}{p(\mathcal{X})} = \frac{p(\mathcal{X} | \boldsymbol{\theta})p(\boldsymbol{\theta})}{\sum_{\boldsymbol{\theta}' \in \Theta} p(\mathcal{X} | \boldsymbol{\theta}')p(\boldsymbol{\theta}')} \quad (3.1)$$

Nie jesteśmy tutaj zbyt formalni z notacją, gdyż używamy  $p$  bardziej jakby był to rozkład prawdopodobieństwa (miara probabilistyczna), a w rzeczywistości jest to gęstość lub funkcja prawdopodobieństwa, więc powinniśmy używać indeksów dolnych określających zmienną losową, której rozkład jest opisany danym  $p$ , aby rozróżnić człony od siebie. Zapis taki jest jednak niezwykle wygodny i dość czytelny. Należy jedynie pamiętać, iż nazwa argumentu funkcji  $p$  określa teraz z jakiego wzoru powinniśmy skorzystać aby obliczyć jej wartość. Człon w mianowniku postaci

$$Z = \sum_{\boldsymbol{\theta}' \in \Theta} p(\mathcal{X} | \boldsymbol{\theta}')p(\boldsymbol{\theta}') \cong \int_{\Theta} p(\mathcal{X} | \boldsymbol{\theta}')p(\boldsymbol{\theta}') d^n \boldsymbol{\theta}' \quad (3.2)$$

jest tzw. **czynnikiem normalizacyjnym** (czyli po prostu liczbą, często oznaczaną przez  $Z$ ), który zapewnia, iż  $p(\boldsymbol{\theta} | \mathcal{X})$  sumuje / całkuje się do 1.

Ponieważ założyliśmy, iż obserwacje ze zbioru  $\mathcal{X}$  są warunkowo niezależne względem parametru  $\boldsymbol{\theta}$  oraz pochodzą z tego samego rozkładu opisanego przez  $p(\mathbf{x} | \boldsymbol{\theta})$ , więc człon  $p(\mathcal{X} | \boldsymbol{\theta})$  zwany **wiarygodnością** możemy zapisać jako

$$p(\mathcal{X} | \boldsymbol{\theta}) = \prod_{i=1}^n p(\mathbf{x}^i | \boldsymbol{\theta}). \quad (3.3)$$

Całe wnioskowanie bayesowskie opiera się na wyznaczeniu rozkładu a posteriori dla danego zbioru obserwacji  $\mathcal{X}$ , który wyraża naszą wiedzę o estymowanym parametrze  $\boldsymbol{\theta}$ . Na podstawie tego rozkładu możemy wyznaczyć estymatę punktową MAP maksymalizującą gęstość prawdopodobieństwa a posteriori,

$$\hat{\boldsymbol{\theta}}_{\text{MAP}}(\mathcal{X}) = \arg \max_{\boldsymbol{\theta} \in \Theta} p(\boldsymbol{\theta} | \mathcal{X}), \quad (3.4)$$

jak również niepewność związaną z wyznaczeniem tej estymaty np. poprzez wyznaczenie przedziału wiarygodności (nie należy mylić z przedziałem ufności). Możemy również skonstruować rozkład predykcyjny (z ang. *posterior predictive distribution*) określający prawdopodobieństwo uzyskania nowej obserwacji  $\mathbf{t}$

$$p(\mathbf{t} | \mathcal{X}) = \int_{\Theta} p(\mathbf{t} | \boldsymbol{\theta})p(\boldsymbol{\theta} | \mathcal{X}) d^n \boldsymbol{\theta}. \quad (3.5)$$

Znając rozkład a posteriori estymowanego parametru  $\theta$  możemy nie tylko wyznaczyć estymaty punktowe, wartości oczekiwane i przedziały wiarygodności, ale również znaleźć estymator Bayesa (z ang. *Bayes estimator*), który minimalizuje wartość oczekiwaną pewnej funkcji straty (z ang. *loss function*)  $L(\theta, \hat{\theta})$  po wszystkich estymatorach  $\hat{\theta}$

$$\hat{\theta}_{\text{Bayes}}(\mathcal{X}) = \arg \min_{\hat{\theta} \in \Theta} \int_{\Theta} L(\theta, \hat{\theta}) p(\theta | \mathcal{X}) d^n \theta . \quad (3.6)$$

Całkę w powyższym wzorze nazywa się również funkcją ryzyka (z ang. *risk function*)  $R(\hat{\theta})$ , która określa oczekiwaną stratę spowodowaną wykorzystaniem danego estymatora parametru.

Są dwa zasadnicze problemy we wnioskowaniu bayesowskim: pierwszym jest potrzeba znania rozkładu a priori estymowanego parametru, drugim problem z obliczeniem czynnika normalizującego, który może być skomplikowaną całką lub sumą po wykładniczo-wielu elementach. Oba te problemy można czasami rozwiązać wprowadzając tzw. **prior sprzężony do wiarygodności**, tzn. zakładamy taki rozkład a priori, aby dla danej wiarygodności rozkład a posteriori miał znaną postać (np. rozkładu normalnego, rozkładu beta), wówczas nie musimy obliczać czynnika normalizującego, gdyż jest on po prostu znany.

### 3.2 Modele gaussowskie i liniowe modele gaussowskie

## 4 Uczenie głębokie i sieci neuronowe