

Árboles filogenéticos

Life on Earth

Archaea

Bacteria

Protista etc.


Árboles

Sistemática y biología evolutiva

Un árbol es una representación de las relaciones de diferentes especies y sus ancestros

Biología molecular

Un árbol es una representación de las relaciones de secuencias de genes o proteínas con sus secuencias ancestrales.




Christoph Bleidorn

Phylo- genomics


An Introduction

Springer



Ancestros → **Especies actuales**

- "Un grupo monofilético es un grupo de especies descendientes de una simple especie que incluye todos los descendientes de esta especie troncal".




Grupos monofiléticos: (CD), (EF), ((CD)(EF)), (B((CD)(EF)))
Grupos no monofiléticos (BC) o (AC)

• **Taxón**

Un taxón es un grupo de organismos a los que se da un nombre. En principio cualquier rango taxonómico es un taxón.

- **Taxón natural.** Es un grupo de organismos que existe en la naturaleza. En el ámbito de la Sistemática Filogenética se entiende a una especie particular o a cualquier grupo de organismos monofilético. Son los únicos aceptados por la sistemática filogenética.
- **Taxón artificial:** Son aquellos que no existen en la naturaleza. Son grupos de organismos no monofiléticos. Son absolutamente descartados por la sistemática filogenética, aunque tolerados en la práctica real por su evidente utilidad en los casos de filogenias excesivamente complejas.



Monophyletic group:


a *Clade* – a node and all of its descendants.

Paraphyletic group:


a clade minus some of its members.

Polyphyletic group:


members of several clades, perhaps grouped by a convergent feature or other superficial similarity.



Monofilia



Parafilia




Monophyly
Paraphyly
Polyphyly

CONTENTS		PAGE
CLASS I. PISCES		2
Sub-Class 1. Selachii		17
ORDER 1. PLEUROPTERYGII		19
2. ACANTHOIDI		20
3. ICTHYOPTERI		22
4. PLAGIOSTOMI		25
5. HOLOCEPHALI		44
Sub-Class 2. Ostracodermi		50
ORDER 1. HETEROSTRACI		50
2. ANASPIDA		53
3. ANSTIOCEPHALI		54
4. ANTIARCHA		56
Sub-Class 3. Arthrodiri		58
Sub-Class 4. Dipnoi		61
ORDER 1. CTENODIPTERINI		61
2. SHRENOIDEI		64
Sub-Class 5. Ganoidel		65
ORDER 1. CHONDOPTERYGII		69
2. CHONDROSTEI		73
3. HETEROCERCI		75
4. LEPIDOSTEI		79
5. AMIOIDEI		89
Sub-Class 6. Teleostei		92
ORDER 1. PHYSOSTOMI		93
2. PHYSOCLEISTI		101
CLASS II. AMPHIBIA		114
ORDER 1. STEGOCEPHALIA		117
2. GYNOPTEROSA		133
3. URODELA		135
4. ANURA		137

Table of Contents from Zittel (1902),
Text-Book of Palaeontology, Vol. II.

CLASS III. REPTILIA	PAGE
ORDER 1. RHYNCHOCERPHALIA	140
2. SQUAMATA	145
3. ICHTHYOSAURIA	152
4. SAUROPTERYGIA	165
5. THEROPODIFORMES	171
6. CHELONIA	179
7. CROCODYLIA	189
8. DINOSAURIA	246
9. PTEROSAURIA	246
CLASS IV. AVES	256
Sub-Class 1. Saururae	264
ORDER 1. ARCHAEORHITHES	264
Sub-Class 2. Ornithurae	265
Super-Order 1. Odontolcae	266
Super-Order 2. Odontormae	267
Super-Order 3. Dromaeognathae	268
ORDER 1. STRUTHIONES	268
2. ALTERNES	271
3. CRYPTURI	271
Super-Order 4. Euornithes	271
ORDER 1. IMPENNES	272
2. CROCOTRIPAR	272
3. GRALLAE	273
4. CROCOTRIPAR	273
5. HERODI	274
6. STEGANOPODES	275
7. OPETHOCOMI	275
8. GALLINAE	276
9. COLUMBAE	276
10. ACCIPITRES	276
11. PIPITRACI	277
12. PSALIAE	277
13. PASSERES	278
INDEX	279


Parafilia




Apomorfia

estado derivado de un carácter. Este estado podría catalogarse como “novedoso” si se le compara con un grupo ancestral próximo.


- **Sinapomorfías:** aquellas apomorfías compartidas por dos o más grupos.
- **Autapomorfías:** aquellas apomorfías que solo aparecen en un grupo.



Plesiomorfia es el estado ancestral o primitivo de un carácter. El concepto se opone al de apomorfía, que es el estado derivado de dicho carácter.




Apomorfia Plesiomorfia




Carácter ancestral (○)
Carácter derivado (●)

Plesiomorphy




Symplesiomorphy



○ Derived trait

● Ancestor trait

Homoplasy





- Derived trait
- Ancestor trait
- Evolutionary novelty



I = powered flight

Common
ancestral
population





Monophyletic group:

a *Clade* – a node and all of its descendants.


Paraphyletic group:

a clade minus some of its members.

Polyphyletic group:

members of several clades, perhaps grouped by a convergent feature or other superficial similarity.

Based On	
Monophyletic	Monophyletic is a group based in synapomorphy .
Paraphyletic	Paraphyletic is a group based in symplesiomorphy .
Polyphyletic	Polyphyletic is a group based on convergence .







Phylogeny Trumps Chemotaxonomy: A Case Study Involving *Turicella otitidis*

Inwoo Baek^{1,2}, Mincheol Kim³, Imchang Lee^{1,2}, Seong-In Na^{2,4}, Michael Goodfellow⁵ and Jongsik Chun^{1,2,4*}

The genus *Turicella* was proposed to harbor clinical strains isolated from middle-ear fluids of patients with otitis media. 16S rRNA phylogeny showed that it belonged to the mycolic acid-containing actinobacteria, currently classified in the order *Corynebacteriales*, and was closely related to the genus *Corynebacterium*. A new genus was proposed for the organisms as unlike corynebacteria they lacked mycolic acids and had different menaquinones. Here, we carried out large-scale comparative genomics on representative strains of the genera *Corynebacterium* and *Turicella* to check if this chemotaxonomic classification is justified. Three genes that are known to play an essential role in mycolic acid biosynthesis were absent in *Turicella* and two other mycolate-less *Corynebacterium* spp., explaining the lack of mycolic acids resulted from the deletion of genes and does not confer any phylogenetic context. Polyphasic phylogenetic analyses using 16S rRNA, bacterial core genes and genes responsible for synthesizing menaquinones unequivocally indicate that *Turicella* is a true member of the genus *Corynebacterium*. Here, we demonstrate that menaquinone and mycolic acid that have been used as critical taxonomic markers should be interpreted carefully, particularly when genome-based taxonomy is readily available. Based on the phylogenetic analysis, we propose to reclassify *Turicella otitidis* as *Corynebacterium otitidis* comb. nov.


a

(A, (B, ((C,D), (E,F))));
 (A:0.01, (B:0.002, ((C:0.009,D:0.005):0.004,
 (E:0.002,F:0.003):0.1):0.45):0.3)

b**c****d****e**

Diferentes formas de representar la misma topología de árbol.
a Un formato Newick.
b Árbol sin raíces.
c Tres representaciones diferentes de la misma topología que un cladograma.
d Filograma.
e Árbol ultramétrico con eje de tiempo.

Politomias



Dicotomia




Politomia



Parcialmente
resuelto



Completamente
resuelto



Cómo se construye un árbol filogenético

