

课程编号：A073003

北京理工大学 2014-2015 学年第一学期

## 线性代数 B 试题 A 卷

一、(10 分) 已知矩阵  $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ , 求行列式  $\begin{vmatrix} 0 & 3A^* \\ B & 0 \end{vmatrix}$  的值。

二、(10 分) 设矩阵  $X$  满足  $XA = B + 2X$ , 其中  $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

(1) 证明:  $A - 2I$  可逆; (2) 求  $X$ 。

三、(10 分) 已知平面上三条直线的方程  $x - y + a = 0, 2x + 3y - 1 = 0, x - ay - \frac{1}{2} = 0$   
讨论的取值与这三条直线相互位置之间的关系。

四、(10 分) 已知

$$\alpha_1 = (1, 2, 3, -4)^T, \quad \alpha_2 = (2, 3, -4, 1)^T, \quad \alpha_3 = (2, -5, 8, -3)^T, \quad \alpha_4 = (3, -4, 1, 2)^T \quad (1) \text{ 求}$$

向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  的秩和一个极大无关组;

(2) 用所求的极大无关组线性表出剩余向量。

五、(10 分) 已知  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  是向量空间  $\mathbf{R}^3$  的一个基,  $\beta_1 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3$ ,  $\beta_2 = 2\alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3$ ,  $\beta_3 = 3\alpha_1 + \alpha_2 + 3\alpha_3$ 。

(1) 证明  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  为  $\mathbf{R}^3$  的一个基;

(2) 求基  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  到基  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  的过渡矩阵;

(3) 求向量  $\gamma = \alpha_1 - \alpha_2 + 2\alpha_3$  关于基  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  的坐标。

六、(10 分) 已知  $\alpha_1 = (1, 0, -1)$ ,  $\alpha_2 = (2, 2, 0)$ ,  $\alpha_3 = (0, 1, 1)$ 。求生成子空间  $L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$  的一个标准正交基。

七、(10 分) 设为  $A$  正交矩阵, 且  $|A| = -1$ , 求证  $\lambda = -1$  为的  $A$  一个特征值。

八、(10 分) 已知二次型  $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 5x_2^2 - 8x_2x_3 + 5x_3^2$

(1) 用正交变换将它化为标准形并给出所用的正交变换; (2) 该二次型是否正定?

九、(10 分) 设三阶矩阵  $A = \begin{pmatrix} \alpha \\ 2\gamma_1 \\ 3\gamma_2 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} \beta \\ \gamma_1 \\ \gamma_2 \end{pmatrix}$ , 其中  $\alpha, \beta, \gamma_1, \gamma_2$  都是三维行向量, 且已知行列式

$|A| = 18, |B| = 2$ , 求  $|A - B|$ 。

十、(10 分) 设  $n$  阶矩阵  $A$  满足  $A^2 = A$ ,  $r(A) = r$  ( $0 < r \leq n$ )。

- (1) 试确定  $A$  的特征值的取值范围;
- (2) 证明  $A$  一定可以相似对角化;
- (3) 求行列式  $|A - 3I|$  的值。