

2010 年线性代数 A 期末考试答案

一、(10分)

解: 方程两边同时左乘 A , 得 $AX+X=AA^*+I$

$$\text{即 } (A+I)X = (|A|+1)I$$

$$\text{又 } |A| = -2, \text{ 故 } (A+I)X = -I$$

$$\text{从而 } X = -(A+I)^{-1} = - \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

二、(10分)

解: 用初等行变换将方程组的增广矩阵化为阶梯形:

$$\hat{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -3 & p \\ q & 2 & 6 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{行}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -5 & p-2 \\ 0 & 0 & -4+q & 2p-1+q(1-p) \end{bmatrix}$$

由方程组有解, 且其导出组 $AX=0$ 的基础解系只有一个向量知

$$r(A) = r(\hat{A}) = 2$$

$$\text{于是有 } \begin{cases} -4+q=0 \\ 2p-1+q(1-p)=0 \end{cases} \text{ 解得 } q=1, p=0$$

$$\text{此时, } \hat{A} \xrightarrow{\text{行}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -5 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{行}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -4 & -1 \\ 0 & 1 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{解得 } \begin{cases} x_1 = -1+4x_3 \\ x_2 = 2-5x_3 \\ x_3 = x_3 \end{cases} \text{ 故通解为 } X = (-1, 2, 0)^T + k(4, -5, 1)^T, k \text{ 为任意常数}$$

三、(10分)

1) 证明: 已知矩阵空间 $R^{2 \times 2}$ 的维数为 4, 要证 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 为 $R^{2 \times 2}$ 的一个基, 只需

证其线性无关 设 $k_1\beta_1+k_2\beta_2+k_3\beta_3+k_4\beta_4=0$

$$\text{则有 } \begin{cases} k_1+k_2+k_3-k_4=0 \\ k_1+k_2-k_3+k_4=0 \\ k_1-k_2+k_3+k_4=0 \\ k_1-k_2-k_3-k_4=0 \end{cases} \text{ 方程组只有零解 } k_i=0, i=1, 2, 3, 4$$

ii)

(2) 解: $\beta_1 = \delta_1 + \delta_2 + \delta_3 + \delta_4$

$\beta_2 = \delta_1 + \delta_2 - \delta_3 - \delta_4$

$\beta_3 = \delta_1 - \delta_2 + \delta_3 - \delta_4$

$\beta_4 = -\delta_1 + \delta_2 + \delta_3 - \delta_4$

于是有 $[\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4] = [\delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_4] \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$

故所求过渡矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$

(3) 解: 法一: 令 $V = x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + x_3\beta_3 + x_4\beta_4$

则有 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 1 \\ x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 2 \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 3 \\ x_1 - x_2 - x_3 - x_4 = 4 \end{cases}$

解之得 $(x_1, x_2, x_3, x_4)^T = (\frac{5}{2}, -1, -\frac{1}{2}, 0)^T$

法二: V 在自然基 $\delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_4$ 下的坐标为

$X = (1, 2, 3, 4)^T$, 于是, 由坐标变换公式, V 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 下的坐标为

$Y = A^{-1}X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$

$= (\frac{5}{2}, -1, -\frac{1}{2}, 0)^T$

四、(10分)

解: (1) 将 $\delta_1, \delta_2, \delta_3$ 作为列构造矩阵, 再用初等行变换将之化为阶梯形,

(2)

$$[\alpha_1^T, \alpha_2^T, \alpha_3^T] = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{行}} \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

由上可知, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的秩为 2, 其中任意两个向量都可作为向量组的一个极大无关组。不妨取 α_1, α_2

(2) 由 (1) 知, α_1, α_2 为 $L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 的一个基

于是只要将其正交化, 单位化即可

$$\text{正交化, 令 } \beta_1 = \alpha_1, \quad \beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = \alpha_2 + \beta_1 = (1, 2, 1)$$

$$\text{单位化, 令 } \eta_1 = \frac{\beta_1}{|\beta_1|} = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$$\eta_2 = \frac{\beta_2}{|\beta_2|} = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}\right)$$

η_1, η_2 为 $L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 的一个标准正交基

五, (10分)

解: (1) 初等因子 $\lambda+1, (\lambda-2)^2, \lambda^2$ 对应的 Jordan 块分别为

$$J_1 = [-1], \quad J_2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ & 2 \end{bmatrix}, \quad J_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ & 0 \end{bmatrix}$$

于是, A 的 Jordan 标准形为

$$J = \text{diag}(J_1, J_2, J_3, J_4)$$

(2) 由 $A \sim J$ 知, A 与 J 有相同的特征值

$$J = \begin{bmatrix} -1 & & & \\ & 2 & 1 & \\ & & 2 & \\ & & & 0 & 1 \\ & & & & 0 \end{bmatrix}$$

为上三角矩阵, 它的对角元就是其全部特征值, 故 A 的特征值为 $-1, 2, 2, 0, 0$

六 (10分)

解: 根据定义 $\phi(1) = 0$

$$\phi(1+x) = 1$$

$$\phi(1+x+x^2) = 1+2x$$

$$\phi(1+x+x^2+x^3) = 1+2x+3x^2$$

(3)

故有 $[6(1), 6(1+x), 6(1+x+x^2), 6(1+x+x^2+x^3)]$

$$= [1, 1+x, 1+x+x^2, 1+x+x^2+x^3] \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

则 6 在自然基下的矩阵为 $\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

法二: 6 在自然基下的矩阵为 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

又自然基到基 $1, 1+x, 1+x+x^2, 1+x+x^2+x^3$ 的过渡矩阵为

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

故 6 在基 $1, 1+x, 1+x+x^2, 1+x+x^2+x^3$ 下的矩阵为

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

七. 证明: 若 n 阶矩阵 A 可相似对角化, 则存在可逆矩阵 P , 使

$$P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \dots, \lambda_n)$$

$$\text{或 } AP = P \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

将 P 按列分块 $P = [x_1, x_2, \dots, x_n]$ 并代入上式得

$$A[x_1, x_2, \dots, x_n] = [x_1, x_2, \dots, x_n] \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

$$\text{即 } [Ax_1, Ax_2, \dots, Ax_n] = [\lambda_1 x_1, \lambda_2 x_2, \dots, \lambda_n x_n]$$

从而有 $Ax_i = \lambda_i x_i, i=1, 2, \dots, n$

由 P 可逆知, $x_i \neq 0 (i=1, 2, \dots, n)$ 且 x_1, x_2, \dots, x_n 线性无关

从而 x_1, x_2, \dots, x_n 是 A 的 n 个线性无关的特征向量,

$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的 n 个特征值。

反之, 若 n 阶矩阵 A 有 n 个线性无关的特征向量, 不妨设为 x_1, x_2, \dots, x_n ,

则有相应的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 使得

$$Ax_i = \lambda_i x_i, i=1, 2, \dots, n$$

此时, 令 $P = [x_1, x_2, \dots, x_n]$

P 可逆, 且有 $P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$

即 A 可相似对角化

八. (10分)

解: (1) 法一: 由 f 的标准形可知, 其正惯性指数为 2,

故 f 不定

法二: 由已知条件知, A 的特征值为 $(1, 2, 0)$, 故 f 不定

(2) 由已知条件知, A 的特征值为 $1, 2, 0$,

$$\text{故 } |A| = 1 \times 2 \times 0 = 0$$

(3) 由已知条件知 $Q^T A Q = \text{diag}(1, 2, 0)$

于是 $A = Q \text{diag}(1, 2, 0) Q^T$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

九. (10分)

证明: 由 $a_{ij} = A_{ji}$ 及伴随矩阵的定义知 $AT = A^*$, 则有

$$|A| = |AT| = |A^*| = |A|^2, \text{ 于是 } |A|(|A|-1) = 0$$

又因 $A \neq 0$, 不妨设 $a_{11} \neq 0$, 则有

$$\begin{aligned}|A| &= a_{11} A_{11} + a_{12} A_{12} + a_{13} A_{13} \\ &= a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{13}^2 > 0\end{aligned}$$

$$\text{故 } |A| = 1 \quad \text{于是 } AA^T = AA^* = |A|I = I$$

从而 A 为正交矩阵

十. (10分)

解: (1) 据已知条件, 有

$$\begin{aligned}A[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] &= [A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3] \\ &= [-\alpha_1 - 3\alpha_2 - 3\alpha_3, 4\alpha_1 + 4\alpha_2 + \alpha_3, -2\alpha_1 + 3\alpha_3] \\ &= [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] \begin{bmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

$$\text{记 } B = \begin{bmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad P_1 = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$$

则由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关知 P_1 可逆, 且 $P_1^{-1}AP_1 = B$ 即 $A \sim B$

求 B 的特征值 $|\lambda I - B| = (\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3)$

故 B 的特征值为 $1, 2, 3$, 从而 A 的特征值也为 $1, 2, 3$

(2) 由 $(I - B)X = 0$, 解得基础解系 $X_1 = (1, 1, 1)^T$

由 $(2I - B)X = 0$, 解得基础解系 $X_2 = (2, 3, 3)^T$

由 $(3I - B)X = 0$, 解得基础解系 $X_3 = (1, 3, 4)^T$

即特征值 $1, 2, 3$ 对应的特征向量分别为 X_1, X_2, X_3

令 $P_2 = [X_1, X_2, X_3]$, 则有

$$P_2^{-1}BP_2 = \text{diag}(1, 2, 3), \quad \text{于是}$$

$$P = P_1 P_2 = [\delta_1, \delta_2, \delta_3] \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$= [\delta_1 + \delta_2 + \delta_3, 2\delta_1 + 3\delta_2 + 3\delta_3, \delta_1 + 3\delta_2 + 4\delta_3]$$

$$\text{则有 } P^{-1}AP = (P_1 P_2)^{-1} A (P_1 P_2) = P_2^{-1} B P_2 = \text{diag}(1, 2, 3)$$

所以矩阵A属于特征值1, 2, 3的特征向量分别为

$$k_1(\delta_1 + \delta_2 + \delta_3), k_2(2\delta_1 + 3\delta_2 + 3\delta_3),$$

$$k_3(\delta_1 + 3\delta_2 + 4\delta_3), k_i \neq 0, i=1, 2, 3$$

(7)