

Guía completa de granja

Agricultura, ganadería, herramientas y fertilizantes en Project Zomboid

Build 42 · revisado el 7 de octubre de 2026

Enfoque práctico: surcos ya hechos a mano, trigo, patatas, vacas, cerdos y ovejas.

Guía para jugar, no para cultivar en la vida real. Está escrita para empezar sin conocimientos técnicos. Los números son referencias para juego vanilla y ajustes predeterminados: un parche, una partida Sandbox, un servidor o un mod pueden cambiarlos.

La idea en un minuto

- **No rehagas los surcos que ya tienes.** Se pueden usar. Para cavar otros, usa paleta de jardinería o pala: son herramientas adecuadas y evitan el riesgo de lesión en la mano.
- **Consulta el mes de la partida antes de sembrar.** Patata: febrero-abril, mejor marzo. Trigo de invierno: agosto-octubre, mejor septiembre.
- **Mira la ficha de cada planta.** El trigo necesita un mínimo de agua de referencia de 30; la patata, 60. El nivel inicial suele ser 0 y el agua se añade en pasos de 10.
- **Quita las malas hierbas y revisa enfermedades.** No eches fertilizante químico varias veces «por si acaso».
- **El compost es renovable.** Se obtiene con una compostera, comida estropeada y estiércol; suele tardar unas dos semanas de juego con el ajuste predeterminado.
- **Para el ganado, pon agua y comida en comederos separados,** dentro de la zona de animales. Asegura el corral y revísalo con frecuencia.

1. Versión y cómo leer los datos

A la fecha de esta revisión, el punto de referencia es **Build 42.21 Stable**; el anuncio oficial comunicó su paso a Stable el 28 de septiembre de 2026 [1]. La agricultura de Build 42 es distinta de la de Build 41: añade calendarios de siembra, cultivos malditos, fases y enfermedades. Por eso, las guías antiguas que recomiendan aplicar una rutina de Build 41 no siempre sirven.

La tabla agrícola de este informe cruza una guía comunitaria comprobada frente a 42.20/42.21 con la página de agricultura de PZwiki. La propia wiki avisa que parte de su contenido todavía corresponde a versiones anteriores (por ejemplo, agricultura 42.18 y varias páginas de animales 42.20.4) [2-7]. **Usa estas cifras como punto de partida, no como una promesa exacta.** En caso de diferencia, manda la ficha de cultivo o de animal que muestra tu partida.

Los tiempos indicados son **días dentro del juego**, no días reales. La velocidad de crecimiento, la duración de las estaciones, la lluvia, la reproducción y el envejecimiento se pueden modificar en Sandbox. Los mods pueden sustituir por completo estas reglas.

2. Tu huerto: pasos sencillos y seguros

2.1 Antes de sembrar

- 1 Mira el calendario de la partida (el reloj o el menú del personaje). No confundas la fecha real con el mes del mundo de juego.
- 2 Comprueba que la parcela está en exterior, a nivel del suelo y en tierra o hierba apta. La mayoría de cultivos necesita luz natural; un invernadero del mapa puede comportarse de forma distinta.

- 3 Mantén el huerto lejos de coches y del recorrido habitual de zombis. Los zombis y los vehículos pueden dañar las plantas; el personaje normalmente puede caminar por el huerto sin destruirlas [3].
- 4 Ten a mano las semillas, una fuente de agua y un recipiente para regar.

2.2 Surcos: conserva los que ya hiciste

Los surcos hechos a mano **no hace falta repetirlos**. Si el juego los reconoce como tierra arada, siembra ahí. Para hacer nuevos:

- 1 Lleva una **paleta de jardinería** o una **pala**.
- 2 Haz clic derecho sobre una casilla de tierra o hierba.
- 3 Elige **Jardinería → Cavar surcos** (el nombre cambia un poco con el idioma).
- 4 Selecciona solo las casillas que vas a plantar.

La paleta o la pala permiten cavar sin el riesgo de lesión en la mano asociado a hacerlo sin la herramienta adecuada [3]. Empieza con pocas casillas: un huerto pequeño es más fácil de regar, vigilar y proteger.

2.3 Sembrar

Haz clic derecho sobre el surco y elige **Sembrar / Sow**. Selecciona el cultivo y confirma. El paquete de semillas debe estar en el inventario. Si el menú no ofrece el cultivo, comprueba que tienes semillas y que el mes está dentro de su temporada; también puede haber una opción Sandbox que desactive las estaciones.

No gastes todas las semillas en la primera prueba. Guarda algunas para la siguiente temporada. Algunos cultivos pueden devolver semillas al cosecharlos en su fase de floración; mira el menú y la ficha del cultivo, porque no todos funcionan igual [3].

2.4 Agua: manda el número de la planta

Las plantas recién sembradas suelen empezar con agua **0**. Se riegan haciendo clic derecho en la planta y usando la acción de regar; una regadera o un rociador de mochila permite añadir agua en incrementos de 10. La lluvia también aporta agua, según su intensidad [2, 3].

Nivel que muestra el juego	Nombre orientativo	Qué hacer
0-29	Muy seca	Riégala; a 0 puede secarse y morir.
30-59	Seca	Comprueba el mínimo de esa especie.
60-69	Sedienta	Puede bastar para algunos cultivos, pero no para todos.
70-89	Bien	Habitualmente está por encima del mínimo de muchos cultivos.
90-100	Muy bien regada	No hace falta perseguir el 100: revisa el umbral de la planta.

Regla fácil: abre la información del cultivo y mantenlo por encima del mínimo que indica. Un nivel inferior puede frenar el crecimiento, perjudicar la salud y aumentar los problemas. No sigas a ciegas consejos antiguos que dicen que todas las plantas quieren la misma cantidad. En la mecánica actual consultada no hay un perjuicio de sobre-riego activo; la principal precaución es no dejar que el cultivo baje demasiado. Si tu ficha o un mod dicen otra cosa, sigue lo que muestra tu juego [2, 3].

La regadera es cómoda para un huerto pequeño; una página de referencia lista una capacidad de 8 litros, pero este dato puede variar y conviene comprobar el objeto en la partida [10]. Una botella, un cubo u otro recipiente compatible pueden servir para llevar agua. La lluvia y los barriles recolectores reducen los viajes.

2.5 Revisión, malas hierbas y salud

Haz una revisión breve cada cierto tiempo, y especialmente después de varios días secos:

- Mira el agua, la fase de crecimiento y el texto de estado de cada planta.
- Retira hierbas o arbustos que aparezcan en las casillas. En Build 42 las malas hierbas consumen agua más rápido, favorecen enfermedades y reducen la eficacia del abono [3].
- Mantén alejados zombis, vehículos y herramientas de corte. La acción de segar hierba con una guadaña puede dañar cultivos que queden dentro del área de efecto [3].
- No te preocupes si el cultivo tarda. Trigo y patata tardan alrededor de tres meses de juego con los ajustes de referencia.

La salud de una planta va aproximadamente de 0 a 100; en 0 muere. El agua suficiente ayuda a mantenerla sana. La temperatura también influye y algunas especies resisten mejor el frío. Una planta con más salud al cosechar suele dar un mejor resultado; enfermedades, hierbas, estación y fertilizante mal usado pueden empeorarlo [2, 3].

2.6 Fases y cosecha

El juego muestra varias fases: brote, planta joven, casi lista y lista para cosechar; puede haber una fase de floración posterior. En general se cosecha cuando la ficha dice «**Lista para cosechar**» o cuando llega a floración. Dejarla olvidada más allá de la última fase puede hacer que se pudra. En ciertos cultivos, la floración es el momento que permite obtener semillas [3].

Cosecha desde el menú/contexto de la planta. Algunas plantas permiten una herramienta específica. Para el trigo ten una guadaña disponible y confirma qué acción ofrece el juego en tu versión. Guarda la cosecha pronto: productos frescos pueden echarse a perder.

3. Los dos cultivos de tu plan

Cultivo	Cuándo sembrar	Mejor mes	Agua mínima de referencia	Tiempo medio de referencia	Nota práctica
Patata	Febrero-abril	Marzo	60	Unos 90 días	Abril es menos favorable. No es resistente al frío invernal. La tabla consultada la marca resistente a babosas.
Trigo de invierno	Agosto-octubre	Septiembre	30	Unos 108 días	Octubre es menos favorable. Es resistente al frío. La cosecha da gavillas de trigo.

Los valores son promedios de referencia: la velocidad de crecimiento, la salud y el rendimiento pueden variar con la habilidad Agricultura, las estaciones, los ajustes y los mods [2, 3]. «Resistente al frío» no significa que dé igual cuándo sembrarlo: evita sembrar fuera de la ventana recomendada.

Patata

La patata encaja en una siembra de final de invierno y primavera. Si puedes elegir, marzo es el mes más favorable. Vigila que no caiga por debajo de 60 de agua y no la dejes plantada sin revisar cuando se acerquen sus meses malos. La patata no es resistente al frío invernal y su periodo de meses malos aparece como agosto-enero en la tabla consultada. No es necesario echarle fertilizante para que crezca.

Trigo de invierno

El trigo se siembra entre agosto y octubre; septiembre es la elección más sencilla. Necesita menos agua mínima que la patata (referencia: 30) y tolera el frío mejor. La tabla agrícola marca octubre como mes menos favorable: se puede sembrar, pero si tienes opción, adelántalo a agosto o septiembre. El ciclo medio indicado es de 108 días [2, 3].

La cosecha es una **gavilla**, no necesariamente harina lista para cocinar. En Build 42 la gavilla puede conservarse secándola en una **rejilla grande para plantas**; después el grano se puede procesar en la cadena de trilla y molienda que ofrezca tu menú de fabricación. Es una tarea opcional y más avanzada; para empezar, basta con cosechar y almacenar correctamente. Las recetas y el tiempo de conservación de la gavilla pueden variar, así que confirma el objeto y el menú de construcción en tu versión [12, 13].

Si ya sembraste fuera de temporada

No arranques la planta automáticamente. Mira su ficha, el mes, el agua y si tu partida tiene las estaciones activadas. En Build 42, sembrar fuera de ventana o mantener un cultivo durante determinados meses malos/invierno puede **maldecirlo**: la planta se recupera peor, se enferma con más facilidad y pierde rendimiento; la wiki indica que no se puede desmaldecir [3]. Si ya está maldita, no desperdicies fertilizante intentando «curarla»; decide si la mantienes o vuelves a sembrar cuando toque.

4. Ganadería: cómo montar un corral que funcione

4.1 Las cuatro necesidades

- 1 **Zona de ganado:** marca con la herramienta de zonas el espacio asignado a los animales. Las zonas que se tocan pueden funcionar como una sola zona; deja separación si quieres mantener especies distintas por separado [4].
- 2 **Comida:** coloca un comedero con heno, hierba cortada, verduras, fruta o pienso compatible. Vacas, cerdos y ovejas pueden pastar si tienen hierba utilizable, pero no dependas solo del pasto.
- 3 **Agua:** pon un comedero distinto para agua. Un comedero no puede llevar comida y agua a la vez. Los recipientes deben quedar dentro de la zona para que los animales los encuentren [4, 8].
- 4 **Espacio, protección y calma:** usa una cerca segura, un acceso controlable y algo de refugio. Los zombis, los ruidos fuertes, correr cerca, la falta de comida/agua y un corral inadecuado pueden elevar el estrés o hacer que un animal se escape. Algunas especies también se estresan con la lluvia o al estar en alturas [4-7].

Como referencia de las definiciones consultadas, se citan mínimos de zona de unas **80 casillas para bovinos adultos** y **40 para ovejas o cerdos adultos**; las crías requieren menos. Son mínimos técnicos, no una recomendación cómoda para una explotación completa. Deja espacio adicional y comprueba las necesidades que muestra el juego: las definiciones y los ajustes pueden cambiar [4-7].

4.2 Comederos de madera

El **comedero corto** sirve para comida o para agua, nunca ambas a la vez. La receta de referencia pide Carpintería 1, 2 tablones, 2 clavos y un martillo; el recipiente de agua aparece con capacidad de 50 litros en esa página. Un comedero largo pide más materiales y un nivel de Carpintería mayor. Las recetas pueden cambiar; revisa el menú de construcción de tu partida [8].

Un comedero descubierto y vacío puede recoger lluvia. El agua acumulada puede aparecer como contaminada: es una fuente para los animales, no la uses para el personaje sin purificarla. Comprueba el estado del líquido antes de beber.

4.3 Vacas

- **Qué aportan:** leche después de quedar preñadas, crías si se reproducen, carne, cuero, huesos y estiércol.
- **Herramienta principal:** cubo u otro recipiente compatible para ordeñar.
- **Necesidades:** agua, alimento, una zona amplia y tranquilidad. Las crías necesitan acceso a la madre para alimentarse.
- **Razas de referencia:** Holstein orientada a leche, Angus a carne y Simmental equilibrada. La genética individual también importa.

- **Ojo:** la leche no aparece simplemente por tener una vaca; la producción está ligada al embarazo/parto y al estado del animal. No dejar que la ubre se acumule indefinidamente: la referencia indica que un exceso puede perjudicar su salud. Los toros estresados pueden atacar [4, 5].

4.4 Cerdos

- **Qué aportan:** carne, cuero, huesos, tendones y estiércol. La cerda da leche a sus lechones; no cuentas con ello como leche para el jugador.
- **Necesidades:** agua, comida, espacio y una cerca resistente. Pueden comer pienso, heno, hierba, verduras y fruta, y también pastar donde quede hierba útil.
- **Ojo:** los cerdos adultos pueden dañar algunas barreras y los jabalíes/cerdos estresados pueden atacar. No confíes en una valla frágil ni los acorrales; reduce ruido y amenazas antes de acercarte [4, 6].

4.5 Ovejas

- **Qué aportan:** lana, leche de oveja tras el embarazo, carne, cuero, huesos y estiércol.
- **Herramienta principal:** tijeras para esquilar. Se puede esquilar a una oveja adulta cuando tiene suficiente lana; la lana obtenida es lana sin procesar. Si el animal está estresado, la acción puede interrumpirse [4, 7, 11].
- **Razas de referencia:** East Friesian orientada a leche, Rambouillet a lana y Suffolk a carne. La genética y los ajustes de la partida modifican el resultado.
- **Crías:** los corderos necesitan a su madre; los carneros estresados pueden atacar. Un refugio ayuda a mantenerlos tranquilos [4, 7].

4.6 Reproducción: déjala para cuando tengas comida de sobra

La reproducción consume espacio y recursos y no es inmediata. En las referencias consultadas, el ganado bovino puede reproducirse durante todo el año; para cerdos y ovejas, la temporada indicada es septiembre-febrero si la opción de temporada de cría está activada. Los tiempos de madurez y gestación son largos y dependen del ajuste **Pregnancy Time** y de la velocidad de envejecimiento. Como orientación técnica de las definiciones actuales: una cría bovina llega a adulta alrededor de 180 días; lechones, alrededor de 140; corderos, alrededor de 180. Edad reproductiva y gestación son distintas de la edad adulta [4–7].

Para empezar, no necesitas criar. Primero asegura agua, comida, zona suficiente y una rutina estable. Si luego quieres reproducir, inspecciona sexo, edad, estado reproductivo y temporada en la ficha del animal; la habilidad **Cuidado animal** va mostrando más información a medida que sube [4, 5].

5. Fertilizantes, compost y enfermedades

5.1 Diferencia entre fertilizante y compost

Producto	De dónde sale	Efecto útil de referencia	Riesgo y uso recomendado
Fertilizante químico	Saqueo de cobertizos/tiendas de jardinería y otros lugares	La primera aplicación en una fase puede acelerar el crecimiento y mejorar la salud; en fases tempranas puede ayudar al rendimiento.	Es limitado. Repetirlo sin control puede quitar salud y maldecir el cultivo. Para principiantes, úsalo poco o nada.
Compost	Compostera con comida estropeada y estiércol	Puede acelerar el crecimiento y mejorar la salud; es renovable.	La primera aplicación útil de una fase es la que cuenta; repetir en la misma fase no añade beneficio, pero la referencia consultada indica que el compost no daña la planta. Es la opción más sencilla para aprender.

La referencia de mecánicas de Build 42 indica que la primera aplicación por fase puede quitar unas 40 horas al crecimiento y sumar salud; con hierbas, el acelerón puede reducirse. Las aplicaciones repetidas de fertilizante químico pueden reducir la salud (la referencia cita una pérdida de 25 puntos en usos

posteriores) y tres o más usos pueden maldecir la planta. Los números se han modificado entre versiones y fuentes; por eso, la regla segura es **no duplicar dosis y preferir compost** [2, 3].

Ni el compost ni el fertilizante aportan la mejora indicada durante invierno o cuando la planta está ya en las fases finales de cosecha. No uses fertilizante para tratar enfermedades: para eso existen remedios específicos [3].

5.2 Cómo producir compost

- 1 Construye o encuentra una compostera. La receta de referencia pide Carpintería 3, 4 tablones, 4 clavos y un martillo [9].
- 2 Mete comida estropeada/podrida o estiércol animal. El contenido aceptado puede variar; comprueba el menú de la compostera.
- 3 Espera: la referencia de ajustes normales habla de alrededor de **dos semanas de juego**, modificables en Sandbox.
- 4 Cuando el indicador tenga suficiente compost, usa un saco vacío para recogerlo y convertirlo en una bolsa de compost [3, 9].
- 5 Usa la bolsa en el cultivo desde el menú de contexto. No hace falta abonar todas las casillas para tener una cosecha.

El estiércol de vacas, cerdos y ovejas convierte el corral en una fuente de compost a largo plazo. Mantén la compostera separada de la zona de comida y agua del ganado.

5.3 Enfermedades y respuesta

Build 42 enumera cuatro problemas: mildiu, moscas de plagas, babosas y pulgones. La enfermedad puede aparecer al cambiar de fase y propagarse a plantas cercanas. Las hierbas y los cultivos malditos elevan el riesgo. Si la ficha señala una enfermedad, actúa pronto; a niveles altos el crecimiento se frena y la planta puede morir [2, 3].

Problema	Remedio de referencia	Consejos
Mildiu	Pulverizador vacío + aproximadamente 1 litro de leche de vaca u oveja.	Revisa la receta desbloqueada en el menú.
Moscas de plagas	Pulverizador vacío + agua y tabaco; la receta consultada admite opciones como cigarrillos, tabaco de mascar o tabaco suelto.	Algunas referencias indican que el repelente de insectos también ayuda.
Pulgones	Pulverizador vacío + agua y alcohol de frotar.	Existe una mecánica de reducirlos dejando la planta seca, pero puede dañarla: no es la solución recomendada para quien empieza.
Babosas	Repelente para babosas encontrado en el mundo.	La referencia consultada no muestra una receta fabricable.

Las recetas exactas pueden requerir la ocupación de granjero, el rasgo Jardinero, revistas específicas o nivel de Agricultura. Las cantidades de agua/ingredientes se han conservado de la referencia de PZwiki y deben confirmarse en el menú del juego [3]. Retirar hierbas y revisar cultivos cercanos es tan importante como aplicar el remedio correcto.

6. Herramientas: qué buscar primero

Herramienta o material	Para qué sirve	Prioridad para tu granja
Paleta de jardinería	Cavar nuevos surcos sin el riesgo de usar las manos.	Alta; no rehagas los surcos que ya tienes.
Pala	Alternativa para cavar; también ayuda a recoger o mover tierra.	Alta si no encuentras paleta.
Semillas de trigo y patata	Sembrar cada cultivo en su ventana.	Alta; guarda una parte para la próxima temporada.
Regadera / recipiente de agua	Regar en incrementos y transportar agua.	Alta. Revisa la ficha y la lluvia antes de rellenar.
Saco vacío	Recoger compost; mover tierra en algunas acciones.	Útil para el ciclo de compost.
Compostera + martillo, tablones y clavos	Convertir residuos orgánicos y estiércol en compost.	Media; no es necesaria el primer día.
Pulverizador de jardín vacío	Preparar y aplicar tratamientos contra ciertas enfermedades.	Media; merece guardarse si encuentras uno.
Cubo	Ordeñar vacas; mover agua u otros líquidos compatibles.	Alta si ya tienes vacas.
Tijeras	Esquilar ovejas.	Alta si tienes ovejas y quieres lana.
Cuerda	Guiar animales grandes y moverlos entre zonas.	Media/alta para reorganizar el corral.
Comederos separados	Mantener agua y comida accesibles para los animales.	Alta; uno para agua y otro para alimento.
Guadaña	Segar hierba/forraje y, según el cultivo, ayudar en la cosecha.	Úsala con cuidado: su área puede cortar plantas cercanas.
Rejilla grande para plantas	Secar gavillas y otros cultivos compatibles.	Opcional, pero útil tras cosechar trigo.

Para una primera salida de saqueo, prioriza: **semillas → paleta o pala → recipiente de agua → herramientas para animales que ya posees**. Después busca saco, martillo, clavos, tablones, cuerda, tijeras y pulverizador. No recojas herramientas solo porque una guía vieja las enumere: comprueba qué acción ofrece el menú de tu versión.

7. Rutina recomendada

Revisión rápida del huerto

- Mira fase, agua y avisos.
- Riega solo si hace falta y llueve poco; prioriza que cada planta supere su mínimo.
- Retira malas hierbas.
- Si hay enfermedad, identifica cuál y busca su remedio; no añadas fertilizante al azar.
- Cosecha a tiempo y guarda lo que no vayas a consumir. Seca el trigo si tienes la rejilla adecuada.

Revisión rápida del ganado

- Comprueba que el agua está disponible y que no se ha vaciado.
- Confirma que el alimento está en su propio comedero y que los animales pueden acceder.
- Revisa que todos siguen dentro de la zona, especialmente después de ruidos o visitas de zombis.
- Inspecciona una vaca antes de ordeñar; lleva un cubo. Mira si las ovejas tienen lana antes de esquilar.
- Mantén a las crías con su madre y recoge estiércol para la compostera.

Calendario orientativo para tus cultivos

Mes del mundo de juego	Qué hacer con tu plan
Enero	Prepara semillas y compost; no siembres patata antes de febrero.
Febrero	Abre la ventana de patata; siembra cuando puedas y vigila el agua.
Marzo	Mejor mes de referencia para patata.
Abril	Aún puede sembrarse patata, pero es menos favorable.
Mayo-julio	Cuida las patatas ya sembradas; prepara herramientas y semillas para trigo.
Agosto	Se abre la ventana de trigo de invierno.
Septiembre	Mejor mes de referencia para sembrar trigo.
Octubre	Aún aparece en la ventana, pero es un mes menos favorable para trigo.
Noviembre-diciembre	Termina de vigilar los cultivos en suelo; el trigo es frío-resistente, la patata no.

Este cuadro no sustituye las estaciones configuradas en tu mundo. Si la partida empezó en julio de 1993, puede que aún no sea la temporada de patata; para trigo, prepara la parcela y espera a agosto-septiembre si las estaciones están activadas.

8. Problemas frecuentes: comprobación rápida

Lo que ves	Qué comprobar primero
No aparece la opción para sembrar	¿El surco ya está arado? ¿Llevas semillas? ¿El cultivo puede sembrarse ese mes? ¿Hay estaciones activadas?
La planta no crece	Fase, agua mínima, hierbas, frío, cultivo maldito, falta de luz o daño por zombi/vehículo.
El agua baja rápido	Quita hierbas, revisa la especie, aprovecha lluvia y mira si usas ajustes de crecimiento o clima distintos.
Planta seca o muerta	Si llegó a agua 0 puede morir. Riégala pronto mientras siga viva; no asumas que el fertilizante la resucita.
La planta está «maldita»	No se puede revertir según la referencia consultada. No la sobreabones; aprende para la siguiente temporada.
Sale una enfermedad	Lee el nombre en la ficha, retira hierbas y aplica el remedio específico; revisa plantas cercanas.
No hay semillas tras cosechar	Comprueba si ese cultivo produce semillas y si debía cosecharse en floración.
La vaca no da leche	Comprueba edad, estado reproductivo, recipiente y ficha del animal; la leche depende del embarazo/parto.
No puedes esquivar	Comprueba que es oveja adulta, que tiene lana suficiente y que llevas tijeras funcionales. Reduce el estrés si interrumpe la acción.
El animal no come o no bebe	Confirma que la zona está bien marcada, que el comedero está dentro, y que comida y agua no comparten el mismo recipiente.
Un animal sale del corral	Revisa sed, hambre, estrés, zombis, ruido, tamaño de zona y resistencia de las vallas; un adulto puede superar barreras débiles.
La compostera no produce	Comprueba el material, que esté podrido/aceptado, el tiempo transcurrido y el ajuste de compostaje Sandbox.

9. Glosario breve

- **Surco:** casilla de tierra arada lista para sembrar.
- **Fase de crecimiento:** paso de la planta desde el brote hasta la cosecha.
- **Mes bueno / pobre / malo:** indicador de cuándo conviene sembrar o qué meses pueden perjudicar al cultivo. «Mes malo» puede afectar una planta que ya está en el terreno.
- **Planta maldita:** cultivo con recuperación y rendimiento perjudicados por una condición de temporada o exceso de fertilizante. No se puede desmaldecir según la referencia consultada.
- **Zona ganadera:** área asignada a los animales para que encuentren comida, agua y refugio.
- **Cuidado animal / Agricultura:** habilidades que revelan información y mejoran algunas interacciones; no hace falta tener nivel alto para empezar.
- **Gavilla de trigo:** producto de la cosecha del trigo; puede requerir secado y procesamiento antes de convertirse en harina.

10. Fuentes y notas de fiabilidad

- 1 **Anuncio oficial de Project Zomboid — Build 42.21 Stable**, 28 de septiembre de 2026. [Steam](#).
- 2 **Build42Guide — Farming: crop table and mechanics**, referencia comunitaria comprobada frente a 42.20 y 42.21 el 27 de septiembre de 2026. [build42guide.wiki](#). Útil para calendario y cifras; no es una fuente oficial.
- 3 **PZwiki — Agriculture**. Página con información agrícola y de Build 42; la página avisa que algunos datos se actualizaron para 42.18 y pueden no reflejar 42.21. [PZwiki](#).
- 4 **PZwiki — Animal y Animal Care**. Mecánicas de zona, estrés, necesidades, manejo y habilidad; página marcada como 42.20.4, anterior a la Stable 42.21. [Animal](#) · [Animal Care](#).
- 5 **PZwiki — Cow**. Leche, razas, cuidados y reproducción; marcada como 42.20.4. [PZwiki](#).
- 6 **PZwiki — Pig**. Cuidado, alimentación, seguridad y productos; marcada como 42.20.4. [PZwiki](#).
- 7 **PZwiki — Sheep**. Lana, leche, razas, cuidado y reproducción; marcada como 42.20.4. [PZwiki](#).
- 8 **PZwiki — Short Wooden Feeding Trough**. Receta, lluvia y capacidad del comedero; la página se marca como anterior a 42.21. [PZwiki](#).
- 9 **PZwiki — Composter**. Materiales, uso y conversión de residuos; la página se marca como anterior a 42.21. [PZwiki](#).
- 10 **PZwiki — Watering Can**. Capacidad y uso de la regadera; página marcada para 42.10. [PZwiki](#).
- 11 **PZwiki — Shears**. Esquilar ovejas y estrés; página marcada como 42.20.4. [PZwiki](#).
- 12 **PZwiki — Wheat y Wheat Sheaf**. Cultivo, gavilla y recetas; páginas con avisos de antigüedad. [Wheat](#) · [Wheat Sheaf](#).
- 13 **Build42Guide — Food preservation**. Referencia comunitaria para secado y conservación de cultivos. [build42guide.wiki](#).

Importante: la wiki y las guías comunitarias pueden quedarse atrás de un parche. Esta guía evita fijar cifras de Sandbox o de mods y prioriza indicaciones que puedes comprobar dentro del juego. Si la interfaz de tu partida discrepa, sigue la interfaz y revisa la versión/ajustes antes de cambiar tu granja.