

2 条件概率与独立性

2.1 条件概率

2.1.1 条件概率

在解决很多实际的概率问题时, 往往需要考虑在某些附加信息(条件)下的事件发生的概率. 通常记事件 A 发生的条件下事件 B 发生的概率为 $P(B|A)$, 称为事件 A 条件下事件 B 的概率.

例2.1. 投掷一枚骰子后观察点数. 事件 B 表示观察到3点, 事件 A 表示观察到奇数点, 求 $P(B), P(B|A)$.

解. 整个样本空间 $\Omega = \{1, 2, \dots, 6\}$, 以及事件 $B = \{3\}$ 和事件 $A = \{1, 3, 5\}$. 根据古典概型得到

$$P(B) = \frac{1}{6}, \quad P(B|A) = \frac{1}{3} = \frac{P(AB)}{P(A)}.$$

□

条件概率的本质: 缩小了有效的样本空间. 下面给出条件概率的形式化定义.

定义2.1. 设 A, B 为同一空间的两个随机事件且 $P(A) > 0$, 称 $P(B|A) = P(AB)/P(A)$ 为事件 A 发生的条件下事件 B 发生的概率, 简称**条件概率**.

若事件 A 发生的条件下事件 B 发生, 则试验结果必为 AB . 由于 A 发生的条件下考虑 B 事件的发生, 因此将 A 看作新的样本空间, 称为缩减的样本空间. 下面给出条件概率的性质:

- 有界性: $0 \leq P(B|A) \leq 1$

Proof. 由 $AB \subset A$, 有 $0 \leq P(AB) \leq P(A)$, 根据 $P(A) > 0$ 得到 $0 \leq \frac{P(AB)}{P(A)} \leq 1$. □

- 规范性: $P(\Omega|A) = 1$

Proof. 由 $\Omega \cap A = A$ 得 $P(\Omega|A) = \frac{P(A\Omega)}{P(A)} = \frac{P(A)}{P(A)} = 1$. □

- 容斥原理: $P(B_1 \cup B_2|A) = P(B_1|A) + P(B_2|A) - P(B_1 B_2|A)$.

Proof. 根据条件概率的定义有 $P(B_1 \cup B_2|A) = P((B_1 \cup B_2) \cap A)/P(A)$, 根据事件的分配率和容斥原理有

$$P((B_1 \cup B_2) \cap A) = P(AB_1 \cap AB_2) = P(AB_1) + P(AB_2) - P(AB_1 AB_2) = P(AB_1 B_2),$$

代入完成证明. □

- 补事件: $P(B|A) = 1 - P(\bar{B}|A)$.

Proof. 由于事件 B 和 \bar{B} 互不相容, 有 $P(\Omega|A) = 1 = P(B \cup \bar{B}|A) = P(B|A) + P(\bar{B}|A)$. □

- 可列可加性: 设 $B_1, B_2, \dots, B_i, \dots$ 是两两互不相容的事件, 则 $P(\cup_{i=1}^{\infty} B_i | A) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i | A)$.

Proof. 由于 $B_1, B_2, \dots, B_i, \dots$ 是两两互不相容的事件, 则 $AB_1, AB_2, \dots, AB_i, \dots$ 也是两两互不相容的事件, 根据定义有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i | A\right) = \frac{P(A \cap (\cup_{i=1}^{\infty} B_i))}{P(A)} = \frac{P(\cup_{i=1}^{\infty} AB_i)}{P(A)} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{P(AB_i)}{P(A)} = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i | A).$$

□

例2.2. 一盒子装有4只不同的产品, 其中3只一等品, 1只二等品. 从盒子中不放回取产品两次, 每次任取一只, 设事件 A 表示第一次拿到一等品, 事件 B 表示第二次取到一等品, 求 $P(B|A)$.

解. [第一种方法] 将3只一等产品分别标为 $\{1, 2, 3\}$, 二等品编号4. 事件 (i, j) 表示第一, 二次分别取到第 i, j 号产品.

$$\Omega = \{(i, j), i \neq j\}, |\Omega| = 4 \times 3 = 12,$$

$$A = \{(i, j), i \neq j, i \neq 4\}, |A| = 3 \times 3 = 9,$$

$$B = \{(i, j), i \neq j, j \neq 4\}, |B| = 3 \times 3 = 9,$$

$$AB = \{(i, j), i \neq j, i \neq 4, j \neq 4\}, |AB| = 3 \times 2 = 6.$$

$$\text{所以 } P(B) = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}, P(AB) = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}, P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{1/2}{3/4} = \frac{2}{3}.$$

[第二种方法: 缩减样本空间] 当第一次取得一等品后剩下2只一等品, 1只2等品, 因此有 $P(B|A) = \frac{2}{3}$. □

例2.3. 掷两次均匀的骰子, 已知第一次掷出6点, 问两次掷出点数之和 ≥ 10 的概率.

解. [第一种方法] 首先有样本空间 $\Omega = \{(i, j) : 1 \leq i, j \leq 6\}$, 事件 $A = \{(i, j) : i = 6, 1 \leq j \leq 6\}$, 事件 $B = \{(i, j) : i + j \geq 10\}$, 事件 $AB = \{(6, j) : j = 4, 5, 6\}$, 于是有 $P(B|A) = 1/2$.

[第二种方法: 缩减空间] 第一次掷6点的情况下, 第二次掷的样本空间 $\Omega = \{1, 2, \dots, 6\}$, 事件 $B = \{\text{两次掷的点数之和} \geq 10\} = \{4, 5, 6\}$, 所以 $P(B|A) = 1/2$. □

2.1.2 乘法公式

根据条件概率公式 $P(B|A) = P(AB)/P(A)$ 可得

$$P(AB) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B).$$

由此可推广到多个事件的乘法公式: 若 $P(A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) > 0$, 由定义可得

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2) \cdots P(A_n|A_1 A_2 \cdots A_{n-1}).$$

例2.4. 一批灯泡100只, 其中10只为次品, 其余为正品. 做不放回抽取, 每次抽取一只, 求第三次才是正品的概率.

解. 设事件 $A_i = \{\text{第 } i \text{ 次抽到的正品}\} (i = 1, 2, 3)$, 事件 $B = \{\text{第 3 次才抽到的正品}\}$. 于是有 $B = \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3$, 以及

$$P(B) = P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3) = P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2|\bar{A}_1)P(A_3|\bar{A}_1 \bar{A}_2) = \frac{10}{100} \times \frac{9}{99} \times \frac{90}{98} = \frac{9}{1078}.$$

□

例2.5. 假设有一串钥匙 n 把, 只有一把能打开门. 任取一把开门, 用后分开, 求第 k 次打开门的概率.

解. [第一种方法: 抽签原理] 第 k 次打开门的事件由前 $k-1$ 次都没有打开门, 以及第 k 次打开门的事件构成. 第 k 次打开门的概率为

$$\frac{\binom{n-1}{k-1}}{\binom{n}{k-1}} \times \frac{1}{n-k+1} = \frac{1}{n}.$$

[第二种方法: 乘积公式] 设事件 A_i 表示第 i 次不能打开门, 则第 k 次打开门的事件可以表示为 $A_1 A_2 \cdots A_{k-1} \bar{A}_k$. 于是有

$$\begin{aligned} P(A_1 A_2 \cdots A_{k-1} \bar{A}_k) &= P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2) \cdots P(A_{k-1}|A_1 \cdots A_{k-2})P(\bar{A}_k|A_1 A_2 \cdots A_{k-1}) \\ &= \frac{n-1}{n} \times \frac{n-2}{n-1} \times \cdots \times \frac{n-(k-1)}{n-(k-2)} \times \frac{1}{n-(k-1)} = \frac{1}{n} \end{aligned}$$

□

习题(Matching问题). 有 n 对夫妻参加一次活动, 所有夫妻被随机两两分成 n 组, 每组 1 男 1 女, 问 n 对夫妻恰好两两配对的概率.

2.1.3 全概率公式(Law of total probability)

全概率公式用于复杂的概率计算, 本质上是加法和乘法的综合运用: 对互不相容的事件 A, B , $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$; 乘法 $P(AB) = P(A)P(B|A)$.

定义2.2 (样本空间的划分). 若事件 A_1, A_2, \cdots, A_n 满足: *i*) 互斥性或互不相容性: $A_i \cap A_j = \emptyset (i \neq j)$; *ii*) 完备性: $\cup_{i=1}^n A_i = \Omega$, 则称 A_1, A_2, \cdots, A_n 为空间 Ω 的一个划分.

注1): 若 A_1, A_2, \cdots, A_n 为样本空间的一个划分, 则每次试验, 事件 A_1, A_2, \cdots, A_n 有且仅有一事件发生.

注2): 若 $n = 2$, 则 $A_1 = \bar{A}_2$, 即 A_1, A_2 互为补事件, 对立事件.

定理2.1 (全概率公式). 设 A_1, A_2, \cdots, A_n 为样本空间 Ω 的一个划分. 对任意事件 B , 有

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i),$$

该公式称为全概率公式.

Proof. 根据事件的分配律可得 $B = B \cap \Omega = B \cap (\cup_{i=1}^n A_i) = \cup_{i=1}^n BA_i$, 由 $A_i \cap A_j = \emptyset$ 可得 $BA_i \cap BA_j = \emptyset$, 即 BA_i 和 BA_j 两两不相容. 由概率的可列可加性得到

$$P(B) = P\left(B \cap \left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right)\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^n BA_i\right) = \sum_{i=1}^n P(BA_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i).$$

□

[直觉解释]: 将事件 B 看作某一过程的结果, 将 A_1, A_2, \dots, A_n 看作该过程的若干原因, 如果

- i) 每一原因发生的概率已知, 即 $P(A_i)$ 已知,
- ii) 每一原因对结果 B 的影响已知, 即 $P(B|A_i)$ 已知,

则 $P(B)$ 可求.

例2.6. 有一种同型号产品由甲乙丙三家工厂生产, 其生产的市场份额分别为30%, 50%, 20%, 三家工厂的次品率分别为2%, 1%, 1%. 求这批产品中任取一件是次品的概率.

解. 设事件 $B = \{\text{任取一件是次品}\}$, $A_i = \{\text{任取一件为第 } i \text{ 厂的产品}\}$, ($i = \text{甲, 乙, 丙}$). 所以

$$P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3) = 1.3\%.$$

□

例2.7 (推迟决定问题). 随机抛 n 次均匀的硬币, 证明正面向上的次数是偶数(奇数)的概率是 $1/2$.

Proof. [第一种方法: 全概率公式] 令 A 表示前 $n-1$ 次抛硬币向上的次数为偶数, B 表示前 n 次抛硬币向上的次数为偶数, 则 \bar{A} 表示前 $n-1$ 次抛硬币向上的次数为奇数. 于是有:

$$P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = \frac{P(A)}{2} + \frac{P(\bar{A})}{2} = \frac{1}{2}.$$

[第二种方法: 直接计算概率] 正面向上的次数是偶数分别是: $0, 2, 4, \dots, 2k$ ($2k \leq n$), 于是有

$$\sum_{0 \leq k \leq n/2} \binom{n}{2k} \left(\frac{1}{2}\right)^{2k} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2k} = \frac{1}{2^n} \sum_{0 \leq k \leq n/2} \binom{n}{2k} = \frac{1}{2}.$$

[第三种方法: 推迟决定原则(Principle of deferred decision)] 无论前 $n-1$ 次抛正面朝上的次数为奇数或偶数, 结果的奇偶性取决于最后一次, 机会各半. □

2.1.4 贝叶斯公式(Bayes' Law)

实际中还存在另一类问题, 已知结果找原因, 因果互换: 即在观察到事件 B 已发生的条件下, 寻找导致 B 发生的概率.

定理2.2 (贝叶斯公式(Bayes' law)). 设 A_1, A_2, \dots, A_n 为样本空间 Ω 的一个划分. 若事件 $P(B) > 0$, 则

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_{j=1}^n P(A_j)P(B|A_j)}.$$

Proof. 由全概率公式可知 $P(A_i|B) = \frac{P(A_i B)}{P(B)} = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_{j=1}^n P(A_j)P(B|A_j)}$. □

[直觉解释]: 将事件 B 看作某一过程的结果, 将 A_1, A_2, \dots, A_n 看作过程中的若干原因, 如果

- 1) 每一原因发生的概率 $P(A_i)$ 已知;
- 2) 每一原因 A_i 对结果 B 的影响已知, 即 $P(B|A_i)$ 已知,

已知事件 B 已发生, 求事件 B 由第 i 个原因引起的概率 $P(A_i|B)$.

特别地, 当 $n = 2$ 时, 即事件 A 和 \bar{A} 为 Ω 的一个划分, 有

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})}.$$

例2.8. 已知有3家元件厂, 编号分别为1, 2, 3, 它们的次品率分别为0.02, 0.01, 0.03, 所占市场份额分别为0.15, 0.8, 0.05. 在仓库中随机取一件, 若已知取到的是次品, 求此产品出自三家工厂的概率.

解. 设事件 $A_i = \{\text{为所需产品来自第 } i \text{ 厂}\} (i = 1, 2, 3)$, 于是有 $P(A_1) = 0.15, P(A_2) = 0.8, P(A_3) = 0.05$. 设事件 B 表示取到次品, 有 $P(B|A_1) = 0.02, P(B|A_2) = 0.01, P(B|A_3) = 0.03$. 根据全概率公式有

$$P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3) = 0.0125.$$

根据贝叶斯公式有

$$\begin{aligned} P(A_1|B) &= \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(B)} = \frac{0.15 \cdot 0.02}{0.0125} = \frac{30}{125} \\ P(A_2|B) &= \frac{P(A_2)P(B|A_2)}{P(B)} = \frac{0.8 \cdot 0.01}{0.0125} = \frac{80}{125} \\ P(A_3|B) &= \frac{P(A_3)P(B|A_3)}{P(B)} = \frac{0.05 \cdot 0.03}{0.0125} = \frac{15}{125} \end{aligned}$$

因此次品出自第2工厂的概率最大. □

习题. 已知事件 A 为病人被诊断为肝癌, 事件 C 为病人患有肝癌, $P(A|C) = 0.95, P(\bar{A}|\bar{C}) = 0.9, P(C) = 0.0004$. 求 $P(C|A)$.

例2.9 (三囚徒问题). 三犯人 A, B, C 均被判为死刑, 被单独隔离. 法官随机赦免了其中一人, 看守知道谁被赦免但不会说. 犯人 A 问看守: B 和 C 谁会被判死刑? 看守的策略: 1) 若赦免 B , 则说 C ; 2) 若赦免 C , 则说 B ; 3) 若赦免 A , 则以 $1/2$ 的概率说 B 或 C . 看守回答 A : 犯人 B 会被执行死刑. 犯人 A 兴奋不已, 因为生存的概率为 $1/2$. 犯人 A 将此事告诉犯人 C , C 同样高兴因为他觉得 A 的生存几率为 $1/3$, 而自己的生存几率为 $2/3$. 那么谁错了?

解. 设事件 $A = \{A \text{被赦免}\}$, 事件 $B = \{B \text{被赦免}\}$, 事件 $C = \{C \text{被赦免}\}$, 由题意可知 $P(A) = P(B) = P(C) = 1/3$. 设事件 $D = \{\text{看守说} B \text{被赦免}\}$, 则有 $P(D|A) = 1/2$, $P(D|B) = 0$, $P(D|C) = 1$. 由全概率公式有

$$P(D) = P(A)P(D|A) + P(B)P(D|B) + P(C)P(D|C) = 1/2.$$

由贝叶斯公式有

$$P(A|D) = \frac{P(A)P(D|A)}{P(D)} = \frac{1}{3} \quad P(C|D) = \frac{P(C)P(D|C)}{P(D)} = \frac{2}{3}$$

所以 A 的推断不正确, C 的推断正确. □

例2.10 (三门问题). 美国游戏节目: 参赛者看到三扇关闭的门, 其中一门后面是汽车, 两门后面是山羊, 选中汽车的门可赢得汽车. 当参赛者选完一扇门但未开启, 节目主持人开启剩下两门中的一门露出山羊. 问题: 参赛者是否要换到另一扇关上的门?

解. 若不换门, 赢的概率为 $1/3$, 若换门, 赢的概率为 $2/3$. □