

EXAMEN ORL COMPLEMENT SIMPLU

1*. Care afirmație este adevărată despre atrezia coanală

- a. reprezintă un defect de dezvoltare în care una sau ambele nări nu se canalizează ca și consecință a unei malformații a peretelui superior al cavității nazale
- b. placa atretică conține în 80-90% din cazuri țesut fibros și în 10% din cazuri mucoasă sau os
- ☒ c. în cazul interesării bilaterale, se poate produce asfixie înainte ca fătul să învețe să respire pe gură
- d. persistența membranei tiroidiene se pare că este cea mai larg acceptată teorie
- e. apar aderențele mezodermale anormale în zona aperturii piriforme

2*. Ozena reprezintă:

- a. Hiperreacție la declansatori nespecifici.
- ☒ b. Afecțiune cronică a mucoasei nazale și a structurilor osoase subiacente.
- c. Infecție cu *Neisseria gonorrhoeae*.
- d. Infecție cu bacil Löffler.
- e. Infecție cu punct de plecare foliculul pilos.

3*. Tratamentul de elecție al colestatomului este:

- ☒ a. chirurgical
- b. antibioterapie
- c. radioterapie
- d. chimioterapie
- e. fizioterapie

4*. Adenoidita acută este inflamația acută a:

- a. amigdalei linguale
- b. amigdalelor palatine
- ☒ c. amigdalei Luschka
- d. amigdala Gerlach
- e. amigdala orofaringiană

5*. Anosmia reprezintă

- ☒ a. Pierdere completă a mirosului
- b. Accentuarea mirosului
- c. Scaderea parțială a mirosului
- d. Pervertirea mirosului
- e. Miros neplăcut permanent

6*. La nivelul maxilarului inferior se deschide orificiul

- ☒ a. Lacrimal
- b. Sinusal frontal
- c. Sinusal maxilar
- d. Sinusal etmoidal
- e. Sinusal sfenoidal

7*. Diagnosticul diferențial al tumorilor maligne ale faringelui se face cu următoarele, exceptând:

- ☒ a. Epiteliomul
- b. Ulceratia sifilitică
- c. Tumora benignă de faringe
- d. Vegetația adenoidă
- e. TBC

8*. Care dintre următoarele NU sunt malformații ale faringelui:

- a. atrezia de cavum
- ☒ b. insuficiența respiratorie
- c. lueta bifidă
- d. cheilopalatoschizis
- e. palatoschizis

9*. Tromboza de sinus cavernos:

- a. Debutează de obicei bilateral.
- b. Este cea mai frecventă complicație a sinuzitei.
- c. Manifestările clinice apar doar la creșterea în dimensiune a leziunii.
- ☒ d. Frecvent apar convulsiile.
- e. Frecvent se însoțește de paralizie de nerv hipoglos

10*. Carcinomul scuamocelular:

- a. Apare în special la copii.
- b. Este o tumoră benignă nazosinusala.
- c. Este o tumoră frecvent localizată în porțiunea posterioară a foselor nazale.
- d. Apare de obicei în sinusul etmoid.
- ☒ e. Se asociază frecvent cu papilomul inversat

11*. Unul dintre următoarele nu este cauză de surditate dobândită

- a. tratament cu chinina
- ☒ b. anemie
- c. meningită
- d. parotidita epidemică
- e. tratament cu kanamicina

12*. Urmatoarele sunt cauze locale ale epistaxisului cu excepția:
a. traumatismele piramidei nazale.
b. rinitele acute și cronice
c. polipul sângerând al septului nazal
☒ d. rinofima
e. tumori maligne nazo-sinuxale

13*. Complicațiile supurative ale otitelor medii sunt favorizate de urmatoarele, cu o excepție:
☒ a. vârsta bolnavului
b. otite medii și otomastoidite netratate sau cu tratament inadecvat
c. terenul bolnavului (tuberculaza, diabet, afecțiuni cronice)
d. virulența agentului patogen
e. particularități anatomice (dehiscente anatomice, căi preformate)

14*. Sinusul maxilar
☒ a. drenează în meatul nazal mijlociu
b. nu este cel mai mare dintre sinusuri
c. se puncționează explorator sau terapeutic în meatul mijlociu
d. drenează în meatul nazal inferior
e. drenează în meatul nazal superior

15*. Insuficiența velopalatină
☒ a. se caracterizează printr-un văl palatin scurt
b. se caracterizează prin tulburări de digestie
c. nu se caracterizează prin refluxul lichidelor pe nas
d. această malformație nu contraindica amigdalectomia
e. se recomandă adenotomia

RASPUNS MULTIPLU

16. Flegmonul retrofaringian
a. apare frecvent la copilul mare sau adult
☒ b. apare cel mai frecvent la sugar și copilul până la 2 ani
☒ c. agent patogen: streptococul, stafilococul
☒ d. simptome clinice: febră 39-40°C, agitație, convulsii, obstrucție nazală etc.
e. este colecție purulentă situată între capsula amigdaliană și peretele anterior al faringelui

17. Caracteristicile colesteatomului sunt:
☒ a. tendință de creștere continuă
b. erodarea țesutului osos întâlnit prin compresiune
c. vindecare spontană
d. tendință de malignizare
☒ e. invazia în toate cavitățile mastoidei, labirint, endocraniu

18. Hemostaza în epistaxis se realizează prin:
☒ a. compresiunea digitală pe aripa nazală
☒ b. cauterizarea petei vasculare cu perla de nitrat de argint
☒ c. tamponamentul anterior
d. aplicarea de comprese reci pe fosele nazale
☒ e. tamponamentul posterior

19. Hemoragia în epistaxisul posterior provine din:
a. artera palatina anterioară
☒ b. artera etmoidală-portiunea posterioară a septului
☒ c. artera subcloazonului
☒ d. artera sfeno-palatina din zona superioară a septului
☒ e. artera sfeno-palatina din zona foselor nazale

20. Considerăm ca epistaxisul are o cauză locală, în caz de:
a. hipertensiune arterială
b. trombocitopenie
☒ c. microtraumatisme locale repetate
☒ d. rinite acute
☒ e. fibromul nazofaringean

21. Care dintre elementele de mai jos evoca o tumoră de rinofaringe:
a. surditatea de percepție
b. surditate de transmisie unilaterală
☒ c. epistaxisuri recidivante
☒ d. obstrucție nazală unilaterală
☒ e. adenopatie regională

22. Principalele cauze de surditati perinatale exogene sunt:
a. anemia
☒ b. ictusul nuclear
c. hipertensiunea arterială
☒ d. prematuritatea

☐ c. Hipoxia perinatală

23. Fibromul nazofaringian

☒ a. apare predominant la sexul masculin fiind

☐ b. considerată tumora pubertății masculine

☒ c. etiologia frecvent incriminată este cea

endocrină

☒ d. dozarea a 17 cetosteroizilor arată surplus,

tumora se dezvoltă până în 20 de ani

☒ e. epistaxisuri repetate la bolnav de sex

masculin în perioada de pubertate

☐ f. obstrucție nazală rapidă

24. Laringele este format din:

☒ a. cartilajul tiroid

☐ b. cartilajul cricoid

☐ c. cartilajele aritenoid

☒ d. epiglota

☐ e. amigdalele palatine

25. Din anginele acute în unele afecțiuni hematologice fac parte

☒ a. angina eritemato-pultacee

☒ b. angina leucemică

☐ c. angina din zona zoster

☐ d. angina aftoasă

☒ e. angina agranulocitară

26. Despre amigdalita cronică sunt adevărate afirmațiile:

☒ a. formele clinice sunt atrofice și hipertrofice

☒ b. factori favorizanți: amigdalite acute repetate în copilărie, adenoidite acute repetate, adenoidita cronică

☒ c. diagnosticul se bazează pe odinofagie, disfagie la consumul de lichide sau alimente mai reci sau la schimbările de temperatură

☒ d. Diagnostic diferențial: tuberculoza hipertrofică simplă, limfogranulomatoză malignă

☐ e. tratamentul este conservator

27. Forme clinice ale inflamațiilor cronice nespecifice faringiene sunt:

☐ a. glosita cronică

☒ b. amigdalita cronică

☐ c. leziunea faringiană

☒ d. vegetații adenoide

☒ e. faringokeratoză

28. Următoarele sunt forme de laringită albă:

☐ a. leukoplazia

☐ b. edemul Reinke

☐ c. papilomul cornos la adulți

☐ d. pahidermia albă

☐ e. laringita cronică pseudomixomatoasă

29. Despre faza de debut a corpiilor străini laringotraheobronșici sunt adevărate afirmațiile:

☒ a. este cea mai caracteristică și cu semnificația clinică cea mai importantă

☐ b. este asimptomatică

☒ c. se însoțește de o simptomatologie

mixomatoasă

☒ d. respirația este dificilă, astfel încât asfisia pare iminentă

☐ e. pacientul este liniștit

30. Diagnosticul tumorii glomice se pune pe următoarele elemente:

☒ a. surditate de transmisie ce poate deveni de percepție

☐ b. acufene nicidecum sincrone cu pulsul

☒ c. vertijul și otalgia moderate, intermitente

☒ d. polipi apăruiți în CAE cărnoși, roșiați, sângerează la atingere și spontan

☒ e. paralizia nervului facial apare frecvent

31. Fibromul nazofaringian:

☒ a. apare predominant la sexul masculin fiind

☐ b. considerată tumora pubertății masculine

☒ c. etiologia frecvent incriminată este cea endocrină

☒ d. dozarea a 17 cetosteroizilor arată surplus, tumora se dezvoltă până în 20 de ani

☒ e. epistaxisuri repetate la bolnav de sex masculin în perioada de pubertate

☐ f. obstrucție nazală rapidă

32. Forme anatomo-clinice ale epistaxisului sunt:

☒ a. anterior

☐ b. hipertensiv

☐ c. diabetic

☒ d. posterior

☐ e. unilateral

33. Inervația laringelui este asigurată de:
- ☒ a. nervul pneumogastric
 - b. nervul accesoriu
 - ☒ c. nervii recurenți
 - d. nervii laringei superiori
 - e. nervii XII

34. Cancerul amigdalei palatine:
- ☒ a. este cea mai frecventă tumoră a faringelui (unilaterală)
 - ☒ b. bucofaringoscopia este examenul prin care se pune în evidență
 - ☒ c. ex. HP nu pune diagnosticul de certitudine
 - d. imunoterapia este tratamentul de bază
 - e. reprezintă cancer hipofaringian

35. Boala Meniere se caracterizează prin:
- ☒ a. debut brusc
 - ☒ b. vertij de tip rotator
 - ☒ c. acufene
 - d. hipoacuzie de percepție imediat urmată de revenirea lentă a auzului
 - e. otoree fetidă

36. Corzile vocale:

- ☒ a. au rol în fonatie
- b. sunt situate în etajul subglotic
- ☒ c. fata lor superioară constituie planseul ventricolului Morgani
- d. sunt situate în etajul supraglotic
- ☒ e. sunt situate în etajul glotic

37. Complicațiile orbitale, cauzate cel mai adesea de etmoidita acută sunt:
- ☒ a. celulita periorbitală sau preseptală
 - ☒ b. tromboza sinusului cavernos
 - ☒ c. abces subperiosteal
 - d. mucocelul
 - e. osteomieliță

38. Rinofima - afecțiune inflamatorie cronică hipertrofică a tegumentului piramidei nazale are ca și factori favorizanti:
- ☒ a. consumul lipidic excesiv
 - ☒ b. consumul excesiv de alcool
 - ☒ c. variații de temperatură
 - ☒ d. deficiențe metabolice
 - e. consumul excesiv de antiinflamatoare nesteroidiene

39. Papiomul inversat are cel mai frecvent loc de apariție:
- ☒ a. peretele lateral al fosei nazale
 - ☒ b. meatusul mijlociu, corespunzător celulelor etmoidale (82%)
 - c. cavitate craniiană - etajul anterior al bazei craniului
 - d. orbita
 - e. fosa infratemporală

40. Carcinomul scuamocelular prezintă următoarele caracteristici:
- a. este o tumoră ce apare în special la copii
 - b. localizată mai frecvent la nivelul vestibulului nazal sau pe sept
 - ☒ c. se asociază frecvent cu papilomul inversat (10-15%)
 - ☒ d. este cea mai frecventă tumoră malignă a nasului și sinusurilor paranasale
 - ☒ e. cea mai frecventă apare la nivelul sinusului maxilar și porțiunea anterioară a foselor nazale

41. Indicațiile traheotomiei sunt:

- ☒ a. obstrucție respiratorie superioară acută
- ☒ b. ajutor în îndepărtarea corpi străini traheali
- ☒ c. ventilația pacienților cu sindrom de detresă respiratorie
- d. respirația orală
- ☒ e. intubarea traheala prelungită

42. În otomicoză (otită externă fungică):

- ☒ a. apar frecvent ca urmare a tratamentului otitei externe cu picături cu antibiotice și corticosteroizi
- ☒ b. cele mai frecvente organisme patogene sunt: *Aspergillus niger*, *Aspergillus fumigatus*, *Aspergillus flavus* și *Candida albicans*
- c. simptomatologia este adesea absentă
- d. spălăturile auriculare sunt recomandate
- ☒ e. examinarea sub microscop revelă o secreție cremoasă frecvent cu identificarea miceliilor

43. Nodulii vocali:

- ☒ a. sunt îngrosări bilaterale, cronice ale epitelului corzii vocale
- ☒ b. sunt localizați de obicei la jonctiunea treimii anterioare cu cea mijlocie
- c. se dezvoltă mai frecvent la bărbați

- ☐ d. e dezvoltă mai frecvent la persoanele cu profesii ce necesită un efort vocal susținut
- ☐ e. 10-20% din pacienții cu noduli vocali prezintă și alte patologii la nivelul corzilor vocale

44. Care din următoarele nu reprezintă rinite acute specifice:

- a. rinită scarlatinoasă ✓
- ☐ b. rinită acută banală
- c. rinită difterică ✓
- ☐ d. rinită streptococică
- e. rinită rujeolică ✓

45. Colesteatomul urechii medii:

- ☐ a. implică prezența epitelului scuamos keratinizat în cavitatea timpanului
- b. retracțiile sunt de obicei localizate în porțiunea inferioară a membranei timpanice
- c. cel mai frecvent este congenital
- ☐ d. este relativ frecvent și poate apărea pe tot parcursul vieții
- e. colesteatomul dobândit poate apărea și în cazul unei perforații marginale

46. Despre angiofibromul juvenil nazofaringian sunt adevărate afirmațiile:

- ☐ a. este o tumoră benignă
- b. este o tumoră bine vascularizată
- c. afectează adolescenți de sex feminin
- d. etiologia este necunoscută
- ☐ e. biopsia preoperatorie confirmă natura benignă

47. Dintre complicațiile intracraniene ale otitelor medii coalesteatomatoase fac parte

- a. fistula labirintică
- b. abcesul extradural
- c. abcesul subdural
- d. labirintită acută
- e. paralizie facială

48. În cazul unei perforații posttraumatice de timpan medicul de familie ia următoarele măsuri:

- a. recomandă pacientului instilarea în ureche de apă oxigenată
- ☐ b. aplică un pansament steril în conductul auditiv extern

- ☐ c. trimite pacientul la medicul specialist ORL
- d. recomandă pacientului efectuarea manevrei Valsalva, pentru menținerea permeabilității trompei lui Eustachio
- e. recomandă aplicarea unui saculeț de sare caldă pe urechea respectivă

49. Funcțiile nasului sunt:

- ☐ a. funcția de fonatie
- b. funcția de deglutiție
- ☐ c. funcția de respirație
- ☐ d. funcția olfactive
- e. funcția reflexă

50. Tumorile benigne ale laringelui sunt:

- ☐ a. noduli vocali
- ☐ b. polipii laringieni
- ☒ c. carcinomul scuamocelular
- ☐ d. hemangiomul
- e. laringita difterică

21 - CD

22 - ADE

28 - ADE

40 - CD

41 - CDE

42 - ABE

43 - AD

47 - ABDE