

COMPLEMENT SIMPLU

1. Ozena reprezintă:

- a. Hiperreactie la declanșatori nespecifici.
- ☒ b. Afecțiune cronică a mucoasei nazale și a structurilor osoase subiacente.
- c. Infecție cu *Neisseria gonorrhoeae*.
- d. Infecție cu bacil Löffler.
- e. Infecție cu punct de plecare foliculul pilos.

2. Rinoscleromul este:

- ☒ a. Rinită cronică specifică.
- b. Rinită cronică nespecifică.
- c. Localizarea primară sau secundară a bacilului Koch la nivelul foselor nazale.
- d. Rinită cronică ce apare în urma unor boli parazitare.
- e. Nici o variantă nu este corectă.

3. Rinosinuzita se clasifică în funcție de durată:

- a. Specifică.
- b. Nespecifică.
- ☒ c. Acută.
- d. Primară.
- e. Secundară.

4. Tromboza de sinus cavernos:

- a. Debutează de obicei bilateral.
- b. Este cea mai frecventă complicație a sinuzitei.
- c. Manifestările clinice apar doar la creșterea în dimensiune a leziunii.
- d. Frecvent apar convulsiile.
- e. Frecvent se însoțește de paralizie de nerv hipoglos

5. Carcinomul scuamocelular:

- a. Apare în special la copii.
- b. Este o tumoră benignă nazosinusala.
- c. Este o tumoră frecvent localizată în porțiunea posterioară a foselor nazale.
- d. Apare de obicei în sinusul etmoid.
- ☒ e. Se asociază frecvent cu papilomul inversat.

6. Printre funcțiile cavității bucale și faringelui se numără, cu excepția:

- ☒ a. Respirația
- ☒ b. Masticația
- c. Fonatia
- ☒ d. Expectoratia
- e. Gustul

7. Corpuri străini ai faringelui:

- a. Întotdeauna se localizează în orofaringe
- ☒ b. Produc odinofagie
- c. Nu necesită rinoscopie posterioară
- d. Tratamentul de elecție este cel antibiotic
- e. Corpuri străini de mici dimensiuni nu reprezintă o urgență

8. Diagnosticul diferențial al tumorilor maligne ale faringelui se face cu următoarele, exceptând:

- ☒ a. Epiteliomul
- b. Ulceratia sifilitică
- c. Tumoră benignă de faringe
- d. Vegetația adenoidă
- e. TBC

9. Selectați afirmația falsă despre aguezie:

- a. Este un deficit senzorial
- b. Este pierderea simțului gustativ
- c. Poate fi unilaterală
- ☒ d. Este cauzată de alterarea corpusculilor gustativi sublinguali
- e. Intervențiile chirurgicale pot determina aguezie funcțională

10. NU este angina acută (inflamație acută a faringelui):

- a. Angina pseudomembranoasă
- b. Angina eritemato-pulțacee
- ☒ c. Angina crescendă
- d. Angina leucemică
- ☒ e. Angina aftoasă

11. Cavitatea laringiană are următoarele caracteristici, cu excepția:

- a. Se extinde de la vârful epiglotei până la marginea cartilajului cricoid
- ☒ b. Se continuă cu traheea
- c. Este localizat în compartimentul visceral al gâtului
- d. Corespunde triunghiului cervical anterior
- ☒ e. Este delimitat inferior de osul hioid și superior de incizura sternală, lateral de marginile mediale ale mușchilor sternocleidomastoidieni

12. Epiglotita cauzează următoarele, cu excepția:

- a. Disfagie
- b. Durere
- c. Modificări caracteristice ale vocii
- ☒ d. Ulcerații în diferite regiuni ale laringelui
- e. Dispnee

13. Diagnosticul otitei medii supurate benigne se pune pe următoarele, cu excepția:

- a. Otoree intermitentă, mucoasă filantă, rareori galben-verzuie
- ☒ b. Absența otalgiei
- c. Perforație largă de timpan
- d. Hipoacuzie de transmisie
- e. Febră

14. Tratatamentul de elecție al colesteatomului este:

- ☒ a. Chirurgical
- b. Antibiotic
- c. Radioterapie
- d. Chimioterapie
- e. Toate de mai sus

15. Complicațiile supurative ale otitelor medii sunt favorizate de următoarele, cu o excepție:

- ☒ a. vârsta bolnavului
- b. otite medii și otomastoidite netratate sau cu tratament inadecvat
- c. terenul bolnavului (tuberculoză, diabet, afecțiuni cronice)
- d. virulența agentului patogen
- e. particularități anatomice (dehiscente anatomice, căi preformate)

GRILE COMPLEMENT MULTIPLU

16. Scheletul cartilaginoid al piramidei nazale este format din:

- ☒ a. Cartilajele laterale (triunghiulare)
- ☒ b. Cartilajele alare
- c. Columela
- d. Lama perpendiculară a etmoidului
- e. Spina nazală a frontalului

17. Pata vasculară Kisselbach este formată din ramificațiile terminale ale:

- a. Arterei oftalmice
- ☒ b. Arterelor nazo-palatine
- c. Arterelor etmoidale posterioare
- ☒ d. Arterelor palatine anterioare
- ☒ e. Arterei subcloazonului

18. Funcțiile nasului:

- ☒ a. funcția de fonatie
- b. funcția de deglutiție
- ☒ c. funcția de respirație
- d. funcția sinusurilor
- e. funcția estetică

19. Hemoragia în epistaxisul posterior provine din:

- a. artera palatină anterioară
- ☒ b. artera etmoidală-portiunea posterioară a septului
- c. artera subcloazonului
- ☒ d. artera sfeno-palatină din zona superioară a septului
- ☒ e. artera sfeno-palatină din zona foselor nazale

20. Considerăm ca epistaxisul are o cauză locală, în caz de:

- a. hipertensiune arterială
- b. trombocitopenie
- c. microtraumatisme locale repetate ☒
- d. rinite acute ☒
- e. trombul nazofaringean ☒

21. Care dintre elementele de mai jos evocă o tumoră de rinofaringe:

- a. surditatea de percepție
- b. surditate de transmisie unilaterală
- ☒ c. epistaxisuri recidivante
- ☒ d. obstrucție nazală unilaterală
- ☒ e. denopatie regională

22. Semnele clinice ale sindromului obstructiv nazal sunt:

- a. jena în respirația nazală, hiposmie, rinolalie deschisă
- ☒ b. respirație de tip oral, rinolalie închisă, hiposmie
- ☒ c. hiposmie, durere nazală, jena în respirația nazală
- d. rinoree, stranut în salve, anosmie
- ☒ e. omni neliniștit, disconfort cu oboseala permanentă, sta cu gura deschisă

23. Rinoscopia anterioară este de trei feluri:

- ☒ a. orizontală
- b. mediană
- ☒ c. oblică
- d. perpendiculară
- e. superioară

24. Punctia sinusală, nu se efectuează în:

- a. sinuzita maxilară acută
- ☒ b. sindroame febrile
- c. formă hiperplagică, când ostiumul sinusului maxilar este blocat
- d. rinită cronică hipertrofică
- e. sinuzita maxilară cronică

25. Hematomul septal posttraumatic apare:

- a. ca o bombare a septului nazal unilateral
- b. ca o bombare a septului nazal bilateral
- ☒ c. caracterizat printr-o colecție de sânge între pericondriul nazal și cartilajul patrat
- d. se poate suprainfecta, determinând abces septal
- ☒ e. ca o bombare a septului și a piramidei nazale

26. Semnele de fractură ale piramidei nazale sunt:

- ☒ a. durere, edem local, echimoze palpebrale, epistaxis
- ☒ b. durere, edem, obstrucție nazală, mobilitate anormală a piramidei nazale
- c. rinoree cerebrospinoasă, obstrucție nazală, exoftalmie, crepitații osoase la palparea piramidei nazale
- ☒ d. soc, durere spontană, epistaxis, echimoze palpebrale bilaterale
- e. anosmie, tromboflebită sinus cavernos, infecție, deformare piramidă nazală

27. Complicațiile rinitei acute banale (guturaiul sau

- a. otite catarale
- ☒ b. sinuzite acute
- c. laringită subglotică
- ☒ d. bronho-pneumonii
- e. deviație de sept

28. In sinuzita maxilara acuta, tratamentul medicamentos este:

- a. punctia sinusului maxilar
- ☒ b. dezinfectante, decongestionante nazale
- ☒ c. antipiretice, antialgice
- ☒ d. antiinflamatoare, antialgice
- ☒ e. antibioterapie conform antibiogramei

29. Polipul sangerand al septului nazal:

- a. este o tumora maligna a foselor nazale
- ☒ b. este un angiofibrom, mai frecvent la femei
- ☒ c. prezinta epistaxisuri repetate unilaterale
- d. examenul histopatologic nu este indicat
- ☒ e. tratamentul este reprezentat de excizia cu electocauterul sau laserul

30. Diagnosticul diferential al sinuzitelor acute se face cu:

- a. rinitele cronice
- ☒ b. algiiile cranio-faciale
- ☒ c. rinite acute
- ☒ d. nevralgia nervului vidian
- e. corpii straini nazali

31. Diagnosticul diferential al atreziei coanale se poate face cu:

- ☒ a. cornete hipertrofice
- ☒ b. polipoza nazala
- ☒ c. neoplasme sinonasale
- d. rinolievoreea
- e. policondrita recidivanta

32. Simptomele nazale ale rinitei non-alergice si dischineziei primare ciliare:

- ☒ a. obstructie
- ☒ b. prurit
- ☒ c. secretii
- ☒ d. stranut
- e. epistaxis

33. Rinita medicamentoasa poate fii provocata de:

- a. steroizi intranasali
- b. antihistaminice intranasale si sistemice
- ☒ c. aspirina si alte antiinflamatoare nesteroidiene
- ☒ d. cocaina
- ☒ e. contraceptive orale

34. Endoscopia nazala flexibila sau rigida evidentiaza in cazul rinitei alergice:

- ☒ a. mucoasa turgescenta, palida violacee, umeda
- ☒ b. formatiuni polipoide la nivelul meatului mijlociu
- c. identificarea celulelor tipice Mikulitz
- d. bogat infiltrat limfo-plasmocitar
- e. noduli granulomatosi in fosele nazale

35. Complicatiile pe termen lung ale hematomului septal sunt:

- a. gastrite
- b. rinolitiiza
- ☒ c. nasul in sa
- ☒ d. perforatie
- ☒ e. retractie columelara

36. Granulomatoza Wegener, forma localizata, ce afecteaza caile aeriene superioare, cuprinde urmatoarele semne si simptome:

- ☒ a. obstructie nazala
- ☒ b. rinoree purulenta/sanguinolenta
- ☒ c. otoree, otalgie
- ☒ d. hipoacuzie de transmisie si neurosenzoriala
- e. transpiratii nocturne

37. Complicatiile orbitale, cauzate cel mai adesea de etmoidita acuta sunt:

- ☒ a. celulita periorbitala sau preseptala
- ☒ b. tromboza sinusului cavernos
- ☒ c. abces subperiostal
- d. mucocelul
- e. osteomielita

38. Rinofima- afectiune inflamatorie cronica hipertrofica a tegumentului piramidei nazale are ca si factori favorizanti:

- ☒ a. consumul lipidic excesiv
- ☒ b. consumul excesiv de alcool
- ☒ c. variatii de temperatura
- ☒ d. deficiente metabolice
- e. consumul excesiv de antiinflamatoare nesteroidiene

39. Papilomul inversat are cel mai frecvent loc de aparitie:

- ☒ a. peretele lateral al fosei nazale
- ☒ b. meatul mijlociu, corespondent celulelor etmoidale (82%)
- c. cavitate craniiana- etajul anterior al bazei craniului
- d. orbita
- e. fosa infratemporală

40. Carcinomul scuamocelular prezinta urmatoarele caracteristici:

- a. este o tumora ce apare in special la copii
- b. localizata mai frecvent la nivelul vestibului nazal sau sept
- ☒ c. se asociaza frecvent cu papilomul inversat (10-15%)
- ☒ d. este cea mai frecventa tumora maligna a nasului si sinusurilor paranazale
- ☒ e. cel mai frecvent apare la nivelul sinusului maxilar, portiunea anterioara a foselor nazale

41. In infectiile fungice ale faringelui:

- a. Apar vezicule care se sparg in 24h
- ☒ b. Agentul etiologic este in mod normal un organism saprofit
- c. Tratamentul include 20 x 10 mil. UI penicilina G/zi i.v. timp de 4-6 saptamani
- ☒ d. Un factor predispozant poate fi transplantul de organe
- e. Mucoasa prezinta leziuni rosii, neregulate

42. Sindromul Sjogren:

- ☒ a. Apare in special la femeile de varsta mijlocie
- b. Apare in special la barbatii tineri
- ☒ c. Este o boala autoimuna ce implica vasculita necrotizanta a tractului respirator
- ☒ d. Diagnosticul se pune prin teste serologice: anticorpi impotriva parenchimului paratiroidian
- ☒ e. Diagnosticul se pune prin teste serologice: Ac anti-SSA, Ac anti-SSB

43. Selectati afirmatiile corecte:

- a. Glandele submandibulare sunt cele mai mari glande salivare
- ☒ b. Luesul este o boala cu transmitere sexuala
- ☒ c. Abuzul de nicotina poate determina "limba neagra paroasa"
- ☒ d. Gingivita acuta ulcero-necrotica este sinonima cu angina Vincent
- ☒ e. 85% din cazurile de oreion apar la copiii sub 15 ani

44. Clasificarea TNM a neoplasmelor cavitatii orale:

- ☒ a. In stadiile avansate (T3, T4) poate fi afectata mandibula
- b. Se face atat pentru neoplasmele benigne, cat si pentru cele maligne
- ☒ c. Include examinarea metastazelor regionale
- ☒ d. Pentru confirmarea diagnosticului este intotdeauna necesara biopsierea tumorii
- e. Radiografia fata si profil a mandibulei este examenul-cheie pentru stabilirea tratamentului

45. Selectati afirmatiile false:

- a. Faringele este impartit in 3 etaje
- b. Rinofaringele este delimitat superior de baza craniului
- c. Orofaringele este delimitat inferior de epiglota
- ☒ d. Orofaringele este delimitat anterior de coane
- ☒ e. Trompa lui Eustachio conecteaza rinofaringele de urechea interna

46. Din clasificarea histopatologica a tumorilor laringiene benigne fac parte:

- ☒ a. Rabdomiomul
- b. Carcinomul epidermoid
- ☒ c. Hemangiomul
- ☒ d. Limfangiomul
- e. Leiomiomul

47. Complicatiile frecvente ale traheostomiei sunt:

- ☒ a. Hemoragie
- b. Cord pulmonar cronic
- ☒ c. Apnee
- ☒ d. Embolie pulmonara
- ☒ e. Infectie

48. Simptomele traumatismelor laringotraheale pot fi:

- ☒ a. Raguseala
- ☒ b. Dispnee
- c. Varsaturi
- d. Dureri abdominale
- ☒ e. Durere, teama, soc

49. Caracteristicile colesteatomului sunt:

- ☒ a. tendință de creștere continuă
- b. erodarea țesutului osos întâlnit prin compresiune
- c. vindecare spontană
- d. tendință de malignizare
- ☒ e. invazia în toate cavitățile mastoidei, labirint, endocraniu

50. Complicații extradurale ale otitelor medii supurate sunt:

- ☒ a. paralizia facială periferică
- ☒ b. labirintita
- ☒ c. petrozita
- ☒ d. abcesul extradural
- e. abcesul cerebral