

ONCO QCM

VAR 1 :

1. * CA 125 augmente fréquemment dans :
 - a. Cancer du pancréas
 - b. Cancer des poumons
 - c. Cancer des ovaires
 - d. Cancer du sein
 - e. Cancer colorectal

2. * L'anémie induite par la chimiothérapie est :
 - a. Normocyte normochrome
 - b. Microcyte hypochrome
 - c. Macrocyte hyperchrome
 - d. Microcyte normochrome
 - e. Macrocyte normochrome

3. * Lequel des médicaments suivants est un inhibiteur de la topoisomérase :
 - a. Cyclophosphamide
 - b. Docetaxel
 - c. Doxorubicin
 - d. Oxaliplatine
 - e. Irinotecan

4. * Lequel des médicaments suivants N'EST PAS une chimiothérapie :
 - a. Cisplatine
 - b. Paclitaxel
 - c. Exemestane
 - d. Oxaliplatine
 - e. Etoposide

5. * Anémie apparaissant pendant la chimiothérapie est basée sur le mécanisme :
 - a. De déficient en fer
 - b. De déficient en B12
 - c. D'inhibition de la moelle osseuse induite par la tumeur
 - d. D'inhibition de la moelle osseuse induite par le traitement
 - e. Auto-immune

6. *Lequel des inhibiteurs de la tyrosine kinase est utilisé dans la leucémie myéloïde chronique :
- a. Sunitinib
 - b. Imatinib
 - c. Sorafenib
 - d. Erlotinib
 - e. Lapatinib
7. *Quelle est l'histologie la plus commune dans le cancer du sein :
- a. Carcinome lobulaire invasif
 - b. Carcinome canalaire invasif
 - c. Tumeur Phyllodes
 - d. Maladie de Paget
 - e. Angiosarcome
8. *Lequel des facteurs de risques suivants N'EST PAS pour le cancer de l'œsophage :
- a. Alcool
 - b. Syndrome Plummer-Vinson
 - c. Fumer
 - d. Exposition au soleil
 - e. Œsophage de Barrett
9. *Lequel des facteurs de risques suivants N'EST PAS pour le cancer du pancréas :
- a. Fumer
 - b. Alcool
 - c. Obésité
 - d. Syndrome Peutz-Jeghers
 - e. Antécédents personnels de cancer du foie
10. *Lequel des facteurs de risques suivants N'EST PAS pour le cancer des poumons :
- a. Fumer
 - b. Régime
 - c. Exposition environnementale au radon
 - d. Exposition aux radiations
 - e. Exposition occasionnelle à l'asbestose

11. *Dans quelle forme de cancer des testicules on peut utiliser une radiothérapie :
- a. Uniquement dans les tumeurs du sac vitellin
 - b. Uniquement dans le carcinome embryonnaire
 - c. Uniquement dans les seminomes
 - d. Uniquement dans les teratomes
 - e. Dans tous les types histologiques des cancers testiculaires
12. *CA 19-9 augmente le plus fréquemment dans :
- a. Cancer des poumons
 - b. Cancer des ovaires
 - c. Cancer du sein
 - d. Cancer de la thyroïde
 - e. Cancer du pancréas
13. *Lequel est le signe clinique le plus commun du cancer du sein :
- a. Grosseur du sein
 - b. Mamelon rétracté
 - c. Ecoulement du mamelon
 - d. Mastite carcinomateuse
 - e. Peau « d'orange »
14. *La forme la plus commune de cancer du foie est :
- a. Cholangiocarcinome
 - b. Carcinome à cellules claires
 - c. Carcinome hépatocellulaire
 - d. Angiosarcome
 - e. Lymphome
15. *Lequel est l'histologie la plus commune dans le cancer rénal :
- a. Carcinome à cellules transitionnelles
 - b. Adénocarcinome papillaire
 - c. Adénocarcinome à cellules claires
 - d. Adénocarcinome chromophobique
 - e. Carcinome embryonnaire
16. Lesquels des virus suivants ont une capacité oncogénique :
- a. Virus Epstein-Barr
 - b. Virus Hépatite C
 - c. Souche 16 du HPV
 - d. Virus Influenza
 - e. Virus Hépatite B

17. La NFS d'un patient sous traitement par chimiothérapie, présente souvent :

- a. Anémie
- b. Polyglobulie
- c. Thrombocytopénie
- d. Neutrophilie
- e. Neutropénie

18. Lesquels des marqueurs suivants sont utilisés dans le cancer colorectal :

- a. AFP
- b. CEA
- c. CA 15-3
- d. CA 125
- e. CA 19-9

19. L'échographie :

- a. A l'avantage de ne pas être invasif
- b. Peut être effectuée même durant une grossesse
- c. Est la méthode de choix dans le diagnostic du cancer des poumons
- d. A une résolution supérieure à une IRM dans le cancer du foie
- e. Peut différencier une tumeur kystique d'une tumeur solide

20. Les investigations endoscopiques ont les avantages suivants :

- a. Permettent des prélèvements de biopsie
- b. Ne sont pas invasives
- c. Sont facilement tolérées par le patient
- d. Permettent la visualisation de l'épithélium des organes creux
- e. Ne requiert jamais de sédation

21. La biopsie à l'aiguille :

- a. Est utilisée dans le cancer du sein
- b. Est effectuée avec des aiguilles spéciales
- c. Est utilisée dans le cancer de la prostate
- d. Peut être effectuée sous guidage échographique
- e. Ne permettent qu'un diagnostic cytologique limité

22. La stadification TNM :

- a. Il y a 2 types distincts de stadifications : clinique et pathologique
- b. La stadification clinique est basée sur les résultats obtenus par l'examen microscopique de la tumeur
- c. Les stadifications clinique et pathologiques sont toujours identiques
- d. La stadification clinique diffère parfois de la stadification pathologique
- e. La stadification pathologique est basée sur les examens d'imagerie

23. Lesquels des cancers suivants sont les plus commun chez les hommes :

- a. Cancer des poumons
- b. Cancer de la thyroïde
- c. Cancer gastrique
- d. Cancer de l'œsophage
- e. Cancer de la vessie

24. Lesquelles des réponses sont vraies à propos des cancers professionnels :

- a. Ils sont de plus en plus fréquents ces derniers temps
- b. Asbestos peut causer le carcinome du col de l'utérus
- c. Les travailleurs de l'industrie des colorants et des peintures développent fréquemment un cancer de la vessie
- d. L'exposition aux composés du benzène peut développer une leucémie
- e. L'exposition aux radiations augmente le risque de leucémie

25. Brachythérapie est :

- a. Une procédure de neurolyse antalgique pour le plexus brachial
- b. Une technique de chimiothérapie intra-artérielle isolée au membre supérieur
- c. Une procédure dans laquelle la tumeur entre en contact avec une source radioactive
- d. Une technique de radiothérapie
- e. Une méthode d'implantation d'un dispositif de perfusion de chimiothérapie

26. La chimiothérapie effectuée avant la chirurgie curative, est appelée :

- a. Chimiothérapie primaire
- b. Chimiothérapie adjuvante
- c. Chimiothérapie néoadjuvante
- d. Chimiothérapie palliative
- e. Chimiothérapie accélérée

27. Laquelle de ces réponses sont vraies à propos du cancer gastrique :
- a. Approximativement 95% des cancers gastriques sont des adénocarcinomes
 - b. L'adénocarcinome diffus est localisé dans l'estomac distal
 - c. L'adénocarcinome intestinal est localisé dans l'estomac distal
 - d. L'adénocarcinome diffus à un meilleur pronostic
 - e. L'adénocarcinome intestinal à un meilleur pronostic
28. Laquelle de ces réponses sont vraies à propos du cancer colorectal :
- a. Est rarement curable, même dans les stades précoces
 - b. L'incidence diminue avec l'âge
 - c. L'activité physique et l'obésité n'influencent pas le risque de développer un cancer colorectal
 - d. Les fumeurs ont un risque plus élevé
 - e. La polypose adénomateuse familiale (FAP) est un facteur de risque
29. Laquelle de ces réponses sont vraies à propos du cancer du foie :
- a. Les tumeurs malignes du foie peuvent être à la fois des tumeurs primaires et des tumeurs secondaires
 - b. Le cancer du foie est l'un des plus rares cancers au monde
 - c. Apparaît exclusivement chez les femmes
 - d. Le carcinome hépatocellulaire est la forme la plus commune
 - e. Le taux de survie à 5 ans est proche des 50%
30. Les symptômes fréquents dans le cancer de l'œsophage sont :
- a. Régurgitation
 - b. Dysphagie
 - c. Vomissements
 - d. Perte de poids
 - e. Hématurie
31. L'examen clinique des patients avec un carcinome hépatocellulaire, montre :
- a. Hépatomégalie
 - b. Splénomégalie
 - c. Circulation abdominale collatérale
 - d. Ascite
 - e. Tumeur palpable au touché rectal

32. Lesquelles des histologies suivantes sont caractéristiques pour le cancer des testicules :
- a. Carcinome à cellules en « bague à chaton »
 - b. Tumeur du sac vitellin
 - c. Choriocarcinome
 - d. Carcinome embryonnaire
 - e. Carcinome à cellules transitionnelles
33. L'adénocarcinome rénal est :
- a. Sensible à la chimiothérapie
 - b. Résistant à la chimiothérapie
 - c. Sensible à la radiothérapie
 - d. Résistant à la radiothérapie
 - e. Sensible aux thérapies anti-angiogéniques
34. Les antigènes carcino-embryonnaire est fréquemment élevé dans :
- a. Le cancer colorectal
 - b. Le cancer des poumons
 - c. Le cancer du sein
 - d. Les cancers tête et cou
 - e. La méningite bactérienne
35. Les réponses sont vraies à propos de l'IRM :
- a. Est basé sur l'utilisation de rayons X
 - b. Est basée sur l'utilisation d'un champ magnétique
 - c. Est contre-indiquée en présence de divers dispositifs métalliques ou pacemakers
 - d. Est plus efficace que la tomographie dans l'évaluation des lésions au cerveau ou au bassin
 - e. La durée d'une IRM est très courte, quelques secondes
36. Plusieurs critères microscopiques suggèrent la malignité :
- a. Variation des cellules en taille et forme
 - b. Activité mitotique faible
 - c. Des noyaux de différentes formes
 - d. Un arrangement organisé des cellules
 - e. Activité mitotique augmentée

37. Les systèmes de classement des tumeurs malignes :

- a. Apprécient le degré de différenciation des tissus
- b. Considèrent le nombre de mitoses
- c. Déterminent la taille de la tumeur primaire
- d. Considèrent le pléomorphisme nucléaire
- e. Considèrent l'existence des métastases à distance

38. Le suivi de patients cancéreux :

- a. Détectent une rechute précoce
- b. Est appelé screening (dépistage)
- c. Est appelé prévention primaire
- d. Est appelé prévention secondaire
- e. Est appelé prévention tertiaire

39. Lesquelles des réponses suivantes sont vraies à propos de la brachythérapie :

- a. Les sources irradiantes sont placées en contact rapproché avec le tissu tumoral
- b. La brachythérapie de surface est utilisée dans le cancer de la prostate
- c. Des implants intra-cavitaires sont utilisés dans le cancer du col de l'utérus
- d. Les techniques de postcharge protègent le personnel médical
- e. La brachythérapie interstitielle est utilisée pour le cancer de la peau

40. Lesquelles des antiémétiques suivants sont des antagonistes de la sérotonine :

- a. Ondansetron
- b. Aprepitant
- c. Metoclopramide
- d. Palonosetron
- e. Prochlorperazine

41. Lesquelles des facteurs de risque suivants sont pour.... :

- a. Cycle menstruel... et ménopause précoce
- b. Contraceptifs oraux
- c. Obésité
- d. Alcool
- e. Venant d'un pays pauvre

42. Trastuzumab :

- a. Est un Ac monoclonal anti-HER2
- b. Est un Ac monoclonal anti-CD20
- c. Est un Ac monoclonal anti-VEGF
- d. Peut être associé avec de la chimiothérapie
- e. Est utilisé dans certains types de cancer du sein

43. Lesquelles des réponses sont vraies concernant le pronostic du cancer de l'œsophage :

- a. Il a un bon pronostic, le taux de survie à 5 ans est supérieur à 40%
- b. La stadification TNM est le facteur pronostic le plus important
- c. Une perte de poids supérieure à 10% du poids corporel est accompagné d'un mauvais pronostic
- d. Les métastases hépatiques n'influencent pas le pronostic
- e. Les tumeurs dans le bas et moyen ... ont un mauvais pronostic

44. Lesquelles des suivants sont des syndromes paranéoplasiques dermatologiques :

- a. Ichtyose acquise
- b. Syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH
- c. Syndrome Eaton-Lambert
- d. Acanthosis Nigricans
- e. Myasthénie gravis

45. Nausées et vomissement causés par la chimiothérapie peuvent être :

- a. Aigues durant les 24 premières heures du traitement
- b. Retardés, commençant 24h après le traitement
- c. D'intensité constante durant la durée de la chimiothérapie
- d. Par anticipation, avant administration
- e. La chimiothérapie n'induit jamais ni nausées ni vomissements

46. Dans le cancer du sein, le traitement peut être :

- a. Chirurgical
- b. Par irradiations
- c. Chimique, utilisant des inhibiteurs de l'aromatase (IA)
- d. Chimique, utilisant des analogues GnRH
- e. Chimique, utilisant des anti-oestrogènes

47. Les facteurs de risques dans le cancer du foie sont :
- a. Infection HBV
 - b. Infection HCV
 - c. Cirrhose
 - d. Ingestion d'aliment contaminés à l'aflatoxine
 - e. Exposition au soleil
48. Des saignements dans le cancer colorectal, peuvent être :
- a. Un des premiers signes cliniques du cancer colorectal
 - b. Sous forme de méléna
 - c. Sous forme de sang frais dans les selles
 - d. Sous forme d'une hémorragie occulte
 - e. Sous forme d'hématémèse
49. Les réponses suivantes concernant le traitement du cancer colorectal sont vraies :
- a. La chimiothérapie est utile uniquement chez les patients avec des maladies métastatiques
 - b. La radiothérapie est utile dans le traitement du cancer rectal
 - c. La combinaison de chimiothérapie et d'Ac monoclonaux, prolongent la survie du patient avec un cancer colorectal métastasé
 - d. On utilise souvent une combinaison de chimiothérapie basée sur 5-FU ou Capécitabine
 - e. La radiothérapie est utile dans le traitement du cancer du colon proximal
50. Lesquelles de ces médicaments sont des inhibiteurs de la tyrosine kinase utilisés dans le cancer rénal :
- a. Sunitinib
 - b. Tensirolimus
 - c. Bevacizumab
 - d. Everolimus
 - e. Sorafenib

Var 2 :

1. *Parmi les étiologies suivantes, laquelle est la plus fréquente dans le cancer du rein ?
 - a. Carcinome transitionnel
 - b. Adénocarcinome papillaire
 - c. Adénocarcinome à cellules claires
 - d. Adénocarcinome chromophile
 - e. Carcinome embryonnaire

2. *Les métastases néoplasiques de la prostate les plus fréquentes sont :
 - a. Hépatiques
 - b. Cérébrales
 - c. Osseuses
 - d. Pulmonaires
 - e. Cutanées

3. *Lequel des éléments suivants n'est pas un élément pronostic négatif pour un patient atteint d'un adénocarcinome bronchopulmonaire :
 - a. Perte de poids involontaire de 10kg au cours des 6 derniers mois
 - b. Mutation de l'EGFR présente
 - c. Indice de performance ECOG 3
 - d. Nodule pulmonaire controlatéral
 - e. Métastases hépatiques

4. *Quelle est la fréquence des cancers du sein hormonodépendants :
 - a. Moins de 5 %
 - b. 20 à 30 %
 - c. 40 à 50 %
 - d. 60 à 70 %
 - e. Plus de 90%

5. *Quel est le principal facteur de risque du cancer du col de l'utérus ?
 - a. Une exposition prolongée aux œstrogènes
 - b. Une exposition prolongée aux rayons du soleil
 - c. Un contact sexuel non protégé
 - d. Une infection par HP
 - e. Une alimentation riche en protéines et en graisses animales

6. *Le type de cancer du foie le plus fréquent est :
- a. L'hépatocarcinome
 - b. Le cholangiocarcinome
 - c. L'hépatoblastome
 - d. Angiosarcome
 - e. Lymphome
7. *Les syndromes paranéoplasiques qui peuvent être observés dans le cancer gastrique sont :
- a. L'acanthosis nigricans
 - b. La dermatomyosite
 - c. Le syndrome de Trousseau
 - d. Le syndrome néphrotique
 - e. Toutes les réponses ci-dessus
8. *Laquelle des affirmations suivantes concernant la résistance biochimique à la chimiothérapie est fausse :
- a. La tumeur peut être incapable de convertir l'agent antinéoplasique en sa forme active
 - b. La résistance pléiotrope est donnée par un type de structure cellulaire de pompe à membrane
 - c. La cellule peut augmenter le niveau d'enzymes cibles que l'agent cytotoxique à l'intention d'inactiver
 - d. La résistance est due à un déficit d'irrigation du tissu malin
 - e. La cellule peut augmenter l'expression des enzymes de réparation de l'ADN
9. *Quel est le signe clinique le plus fréquent au début du cancer du sein :
- a. Nodule mammaire tumoral
 - b. Adénopathies axillaires
 - c. Fuite du mamelon
 - d. Mastite carcinomateuse
 - e. Peau d'orange
10. *Lequel des médicaments suivants sont des antibiotiques antitumoraux :
- a. Analogue de l'azote de la moutarde
 - b. Nitrosurées
 - c. Analogue de la purine
 - d. Anthracyclines
 - e. Taxanes

11. *Lequel des médicaments antiémétiques suivants est un antagoniste de la neurokinine 1 (NK-1) ?
- a. Ondansétron
 - b. Aprepitant
 - c. Métoprolopramide
 - d. Palonosétron
 - e. Prochlorpérazine
12. *Lequel des médicaments suivants est un cytostatique :
- a. Tamoxifène
 - b. Paclitaxel
 - c. Tramstuzumab
 - d. Imatinib
 - e. Exémestan
13. *Le bortézomib est :
- a. Inhibiteur de la kinase mTOR
 - b. Anticorps monoclonal
 - c. Inhibiteur de la tyrosine kinase
 - d. Une cytokine
 - e. Un inhibiteur du protéosome
14. *Les niveaux de CA 19-9 augmentent le plus souvent dans :
- a. Le cancer du poumon
 - b. Le cancer de l'ovaire
 - c. Le cancer du sein
 - d. Le cancer de la thyroïde
 - e. Le cancer du pancréas
15. *Inhibiteurs de l'aromatase :
- a. Réduit le niveau d'œstrogène par le blocage de la synthèse
 - b. Réduit le niveau d'œstrogène par la liaison des récepteurs d'œstrogène
 - c. Réduit le niveau d'œstrogène par la liaison des récepteurs d'œstrogène-progestérone
 - d. Réduit le niveau d'œstrogène par la castration chimique
 - e. Réduit le niveau d'œstrogène par la castration chimique et la liaison des œstrogènes récepteurs

16. Les antigènes carcinoembryonnaires ont des valeurs fréquentes... élevées chez les individus :

- a. Atteints d'un cancer colorectal
- b. Atteints d'un cancer du poumon
- c. Atteints d'une cirrhose hépatique
- d. Non-fumeurs
- e. Atteints de méningite bactérienne

17. Les affirmations suivantes sont vraies à propos de l'IRM :

- a. Sont basées sur l'utilisation des rayons X
- b. Sont basées sur la propriété des atomes d'hydrogène dans un champ magnétique
- c. Est contre-indiquée en présence de dépôts métalliques et de stimulateurs cardiaques
- d. Est plus efficace que la TDM pour évaluer les lésions cérébrales ou pelviennes
- e. La durée d'une IRM est très courte

18. Une série de critères suggérant microscopiquement une malignité :

- a. Pléomorphisme cellulaire
- b. Activité mitotique diminuée
- c. Pléomorphisme nucléaire
- d. Conservation de l'architecture tissulaire
- e. Hyperchromie nucléaire

19. Immunohistochimie :

- a. Est utilisée uniquement pour les tumeurs testiculaires
- b. Permet la détection de certains antigènes exprimés au niveau cytoplasmique ou nucléaire au niveau de la membrane
- c. Permet le phénotypage de la tumeur et sa classification dans un certain type tumoral
- d. Est un examen complémentaire utile dans l'anaplasie tumorale avec un point de sortie non précis
- e. Nécessite un examen scintigraphique initial

20. Classification des tumeurs malignes :

- a. Apprécie l'anaplasie cellulaire
- b. Apprécie le nombre de mitoses
- c. Apprécie la taille de la tumeur primaire
- d. Apprécie le pléomorphisme nucléaire
- e. Apprécie l'existence de métastases à distance

21. Voici des exemples d'études épidémiologiques analytiques :

- a. Études d'incidence
- b. Études descriptives
- c. Études de cohorte
- d. Études cas-témoins
- e. Études de mortalité

22. Lesquelles des affirmations suivantes concernant les facteurs de risque alimentaires sont vraies :

- a. La consommation de légumes et de fruits augmente le risque de cancers digestifs
- b. Le glucane végétal peut augmenter l'immunité de la paroi intestinale
- c. Les phytoestrogènes ont un effet protecteur contre le cancer du sein et de la prostate
- d. L'huile d'olive est un facteur de risque oncologique
- e. Les aflatoxines fongiques sont le principal facteur de risque de cancer du poumon

23. Suivi post-thérapeutique :

- a. Est également appelé dépistage
- b. Est également appelé suivi
- c. Est également appelé prévention primaire
- d. Est également appelé prévention secondaire
- e. Est également appelé prévention tertiaire

24. Le rôle de la chirurgie dans le diagnostic et la stadification des tumeurs malignes :

- a. Est de plus en plus important à mesure que de nouvelles techniques de stadification se développent
- b. Est réalisée comme procédure initiale dans tous les néoplasmes digestifs
- c. Permet la biopsie chirurgicale
- d. Permet de réaliser l'excision tumorale ultérieure sous la même anesthésie session
- e. Est la procédure qui définit le stade du TNM dans la LAM

25. La chirurgie reconstructive chez le patient oncologique :

- a. Améliore la survie
- b. Répare les défauts
- c. Améliore la qualité de vie
- d. Restaure la fonctionnalité des organes ou segments affectés
- e. Réduit la masse tumorale

26. Lesquelles des affirmations suivantes concernant la curiethérapie/brachythérapie sont vraies :

- a. En curiethérapie, les sources de rayonnement sont en contact intime avec le tissu tumoral
- b. La curiethérapie endocavitaire est particulièrement utilisée dans le cancer de la prostate
- c. La curiethérapie de contact est utilisée dans le cancer du col de l'utérus
- d. Les techniques de postchargement protègent le personnel médical de l'irradiation
- e. La curiethérapie interstitielle est utilisée dans le cancer de la cavité buccale.

27. Les avantages de la chimiothérapie néoadjuvante sont les suivants :

- a. Réduire la probabilité de récurrence systémique ultérieure
- b. Etre effectuée après l'ablation de la tumeur primaire et permettre l'obtention d'images microscopiques informatives sur la tumeur
- c. Permet d'évaluer l'efficacité du traitement en mesurant la taille de la tumeur primaire
- d. Réduit la masse de la tumeur primaire et facilite la progression chirurgicale
- e. Est réalisée à de faibles doses qui n'entraînent pas de complications immédiates ou tardives

28. Les combinaisons de chimiothérapie reposent sur les principes suivants :

- a. Substances qui génèrent des mécanismes de résistance différents
- b. Substances qui agissent par le même mécanisme
- c. Substances ayant des effets indésirables différents
- d. Substances qui agissent à différents moments du cycle cellulaire
- e. Substances qui agissent par des mécanismes différents

29. Thrombocytopénie pendant la chimiothérapie :

- a. Est rarement grave ou met rarement la vie en danger
- b. Déterminer le traitement si les plaquettes sont $< 100\,000 / \text{mm}^3$
- c. Déterminer le traitement si les plaquettes sont $< 10\,000 / \text{mm}^3$
- d. Déterminer le traitement si les plaquettes sont $< 50\,000 / \text{mm}^3$
- e. Peut être corrigée par des plaquettes

30. Lesquels des éléments suivants constituent des facteurs de risque de cancer du sein :

- a. Cycle menstruel avec apparition tardive et ménopause précoce
- b. Contraceptifs oraux
- c. Obésité
- d. Alcool
- e. Venir d'un pays pauvre

31. Le transtuzumab :

- a. Est un anticorps monoclonal anti-HER2
- b. Est un anticorps monoclonal anti-CD20
- c. Est un anticorps monoclonal anti-VEGF
- d. Peut être associé à une chimiothérapie
- e. Est indiqué dans le cancer colorectal métastatique

32. Lesquelles des affirmations suivantes concernant le pronostic du cancer de l'œsophage sont vraies :

- a. Le cancer de l'œsophage a un bon pronostic, la survie à 5 ans étant > 40 %
- b. Le statut TNM est le facteur pronostique le plus important
- c. Une diminution de > 10 % du poids corporel est associée à un pronostic plus sombre
- d. La présence de métastases hépatiques n'influence pas le pronostic
- e. La localisation de la tumeur au niveau du tiers inférieur et moyen a un pronostic plus sombre

33. Les facteurs pronostiques du cancer colorectal sont :

- a. Le grade tumoral, tumeurs G1 et G2 avec un pronostic plus sombre que G3 et G4
- b. Le type histopathologique, carcinome à cellules en bague à chaton et carcinome mucineux ayant un pronostic plus réservé
- c. Le stade TNM est l'élément pronostique le plus important
- d. Invasion lymphatique ou veineuse
- e. Tumeur résiduelle

34. Les facteurs de risque du cancer du pancréas sont :

- a. Le tabagisme
- b. Un régime alimentaire hyperlipidique
- c. Une gastrectomie partielle
- d. Une pancréatite chronique
- e. Une exposition excessive au soleil

35. Les symptômes observés dans le cancer gastrique sont les suivants :

- a. Douleur épigastrique
- b. Anorexie
- c. Satiété précoce
- d. Vomissements alimentaires
- e. Hématurie

36. Les facteurs pronostiques négatifs du cancer du pancréas sont :
- a. L'âge avancé
 - b. La localisation à la tête du pancréas
 - c. Le stade avancé de la maladie
 - d. Une tumeur peu différenciée
 - e. Une tumeur bien différenciée
37. Lequel des éléments suivants constitue un facteur de risque de cancer du poumon ?
- a. Cirrhose du foie
 - b. Exposition à l'amiante
 - c. Exposition au radon
 - d. HTA
 - e. Diabète sucré
38. Lesquelles des affirmations suivantes sont vraies concernant la radiothérapie dans le cancer du poumon ?
- a. La TDM prophylactique crânienne est réalisée uniquement chez les patients atteints d'un cancer non à petites cellules
 - b. La radiothérapie radicale irradie la tumeur primaire, les ganglions hilaires et le médiastin
 - c. La RT palliative peut être utilisée dans le syndrome de la veine cave supérieure
 - d. La chimio-radiothérapie concomitante apporte un bénéfice à la thérapie séquentielle
 - e. La RT radicale est réalisée jusqu'à un maximum de 12 GY
39. Chimiothérapie dans le cancer de la prostate :
- a. Est généralement une solution utilisée tardivement après l'hormonothérapie
 - b. Est le traitement initial du cancer de la prostate métastatique
 - c. Le docétaxel et la prednisone sont utilisés en première ligne de chimiothérapie
 - d. La mitoxantrone peut être utilisée chez les patients qui ne tolèrent pas le traitement par taxane
 - e. Utilise des combinaisons de 3 à 4 cytostatiques qui donnent des réponses plus efficaces
40. Laquelle des histologies suivantes est caractéristique d'un cancer des testicules
- a. Carcinome cellulaire à cellules en bague à chaton
 - b. Tumeur du sac vitellin
 - c. Coriocarcinome
 - d. Carcinome transitionnel
 - e. Carcinome embryonnaire

41. Lequel des médicaments suivants sont des inhibiteurs de la tyrosine kinase utilisés dans le néoplasme rénal ?
- a. Sunitinib
 - b. Temsirolimus
 - c. Bevacizumab
 - d. Évérolimus
 - e. Sorafénib
42. Lesquelles des affirmations suivantes sont vraies à propos de l'adénocarcinome endométrial ?
- a. Survient dans 20 % des cas de cancer de l'endomètre
 - b. A un meilleur pronostic que l'adénocarcinome à cellules claires
 - c. Les cellules ont des niveaux accrus de récepteurs de progestérone
 - d. Affecte plus souvent les personnes âgées
 - e. Est associé à l'obésité et au diabète
43. Laquelle des affirmations suivantes concernant le traitement systémique du cancer de l'endomètre est vraie :
- a. La chimiothérapie systémique est indiquée dans les formes avancées ou récurrentes
 - b. L'hormonothérapie est particulièrement indiquée dans les tumeurs bien différenciées avec des récepteurs hormonaux positifs
 - c. L'hormonothérapie est indiquée dans le traitement adjuvant du cancer de l'endomètre
 - d. L'hormonothérapie est indiquée dans les formes métastatiques ou récurrentes
 - e. L'hormonothérapie utilise du bicalutamide ou des analogues de la GnRH
44. Lesquelles des affirmations suivantes concernant le cancer de l'ovaire sont vraies :
- a. La plupart des cancers de l'ovaire sont des tumeurs germinales
 - b. La plupart des cancers de l'ovaire sont des tumeurs stromales
 - c. La plupart des cancers de l'ovaire sont d'origine épithéliale
 - d. Sont généralement des tumeurs chimiosensibles
 - e. Sont généralement détectés à des stades avancés

45. Lesquelles des affirmations suivantes concernant le cancer de l'ovaire sont vraies :
- a. La dissémination la plus fréquente est l'ensemencement péritonéal
 - b. La dissémination la plus fréquente est hématogène
 - c. Les métastases pulmonaires et cérébrales sont rares
 - d. Le cancer de l'ovaire est le plus souvent détecté à un stade précoce, limité à l'ovaire
 - e. L'os est le lieu le plus fréquent de métastase
46. Quelles interventions chirurgicales peuvent être utilisées dans le cancer du col de l'utérus :
- a. Conisation
 - b. Tumorectomie
 - c. Hystérectomie radicale avec lymphadénectomie pelvienne bilatérale
 - d. Sectorectomie
 - e. Exentération pelvienne
47. Gènes de suppression tumorale :
- a. Peuvent donner naissance à des proto-oncogènes par mutations
 - b. Contrôlent le cycle cellulaire
 - c. Sont également appelés proto-oncogènes
 - d. Jouent un rôle dans la carcinogenèse
 - e. Le plus connu est le p53, qui joue le rôle de gardien génomique
48. L'anémie dans le cancer peut être due :
- a. Le plus souvent à un mécanisme auto-immun
 - b. A une inhibition directe de l'érythropoïèse par la tumeur par la production de cytokines
 - c. A un mécanisme de carence en fer par le biais d'hémorragies occultes
 - d. A un œdème
 - e. A une infiltration directe de MOH
49. Dans les métastases hépatiques, des modifications peuvent survenir dans :
- a. Les transaminases
 - b. La bilirubine
 - c. Le PSA
 - d. L'albumine sérique
 - e. Les tests de coagulation

50. Les affirmations suivantes concernant le traitement du cancer colorectal sont vraies :

- a. La chimiothérapie n'est utile que chez les patients atteints de tumeurs non résecables ou métastatiques
- b. La radiothérapie est utile dans le traitement du cancer du rectum
- c. L'association d'anticorps monoclonaux à la chimiothérapie permet de prolonger la survie des patients atteints d'un cancer colorectal métastatique
- d. La chimiothérapie utilise généralement des combinaisons à base de 5-FU ou de capécitabine
- e. La radiothérapie est utile dans le traitement du cancer et du cancer du côlon proximal

Var 3 :

1. *Le CA 19-9 augmente le plus souvent dans :
 - a. Le cancer du poumon
 - b. Le cancer des ovaires
 - c. Le cancer du sein
 - d. Le cancer de la thyroïde
 - e. Le cancer du pancréas

2. *Quel est le premier signe clinique le plus courant du cancer du sein :
 - a. Une masse mammaire
 - b. Le mamelon rétracté
 - c. Un écoulement du mamelon
 - d. Une mastite carcinomateuse
 - e. La peau "peau d'orange"

3. *Le type de cancer du foie le plus courant est
 - a. Le cholangiocarcinome
 - b. Le carcinome à cellules claires
 - c. Le carcinome hépatocellulaire
 - d. L'angiosarcome
 - e. Le lymphome

4. *Laquelle des histologies suivantes est l'histologie la plus courante dans le cancer du rein ?
 - a. Le carcinome à cellules transitionnelles
 - b. L'adénocarcinome papillaire
 - c. L'adénocarcinome à cellules claires
 - d. L'adénocarcinome chromophile
 - e. Le carcinome embryonnaire

5. *Le CA 125 augmente le plus fréquemment dans quel type de cancer :
 - a. Le cancer du pancréas
 - b. Le cancer du poumon
 - c. Le cancer des ovaires
 - d. Le cancer du sein
 - e. Le cancer colorectal

6. *L'anémie induite par la chimiothérapie est une anémie :
- a. Normochrome normocytaire
 - b. Hypochrome microcytaire
 - c. Hyperchrome macrocytaire
 - d. Normochrome microcytaire
 - e. Normochrome macrocytaire
7. *Lequel des médicaments suivants est un inhibiteur de la topoisomérase :
- a. Cyclophosphamide
 - b. Docétaxel
 - c. Doxorubicine
 - d. Oxaliplatine
 - e. Minotécun
8. *Lequel des médicaments suivants n'est PAS une chimiothérapie :
- a. Cisplatine
 - b. Paclitaxel
 - c. Exemestane
 - d. Oxaliplatine
 - e. Etoposide
9. *L'anémie survenant au cours de la chimiothérapie repose sur un mécanisme :
- a. De carence en fer
 - b. De carence en B12
 - c. De l'inhibition de la moelle osseuse induite par la tumeur
 - d. De l'inhibition de la moelle osseuse induite par le traitement
 - e. Autoimmune
10. *Lequel des inhibiteurs de tyrosine kinase suivants est utilisé dans la leucémie myéloïde chronique :
- a. Sunitinib
 - b. Imatinib
 - c. Sorafenib
 - d. Erlotinib
 - e. Lapatinib

11. *Quelle est l'histologie la plus fréquente du cancer du sein :
- a. Carcinome lobulaire invasif
 - b. Carcinome canalaire invasif
 - c. Tumeur phyllode
 - d. La maladie de Paget
 - e. Angiosarcome
12. *Lequel des éléments suivants n'est PAS un facteur de risque de cancer de l'œsophage :
- a. L'alcool
 - b. Le syndrome de Plummer-Vinson
 - c. Le tabac
 - d. L'exposition au soleil
 - e. L'œsophage de Barrett
13. *Les facteurs de risque du cancer du pancréas sont les suivants, sauf :
- a. Le tabac
 - b. L'alcool
 - c. L'obésité
 - d. Le Syndrome de Peutz-Jeghers
 - e. Les antécédents personnels de cancer du foie
14. *Lequel des éléments suivants n'est PAS un facteur de risque de cancer du poumon
- a. Le tabac
 - b. Le régime
 - c. L'exposition environnementale au radon
 - d. L'exposition aux radiations
 - e. L'exposition professionnelle à l'amiante
15. *Dans quel type de cancer du testicule peut-on utiliser la radiothérapie ?
- a. Uniquement dans les tumeurs du sac vitellin
 - b. Uniquement dans le carcinome embryonnaire
 - c. Uniquement dans les séminomes
 - d. Seulement dans les tératomes
 - e. Dans tous les types histologiques de cancer du testicule

16. Parmi les cancers suivants, lesquels sont les plus fréquents chez les hommes ?
- a. Cancer du poumon
 - b. Cancer de la thyroïde
 - c. Cancer de l'estomac
 - d. Cancer de l'oesophage
 - e. Cancer de la vessie
17. Quelles affirmations sont vraies concernant les cancers professionnels :
- a. Sont de plus en plus courants ces derniers temps
 - b. L'amiante peut provoquer un cancer du col de l'utérus
 - c. Les travailleurs de l'industrie des colorants et des peintures développent fréquemment un cancer de la vessie
 - d. L'exposition aux composés du benzène peut développer une leucémie
 - e. L'exposition aux radiations augmente le risque de leucémie
18. La curiethérapie est :
- a. Une procédure de neurolyse antalgique pour le plexus brachial
 - b. Une technique de chimiothérapie intra-artérielle sur membre supérieur
 - c. Une procédure dans laquelle la tumeur entre en contact avec une source radioactive
 - d. Une technique de radiothérapie
 - e. Un procédé d'implantation d'un dispositif de perfusion de chimiothérapie
19. La chimiothérapie pratiquée avant la chirurgie curative est appelée :
- a. Chimiothérapie primaire
 - b. Chimiothérapie adjuvante
 - c. Chimiothérapie néoadjuvante
 - d. Chimiothérapie palliative
 - e. Chimiothérapie accélérée
20. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies concernant le cancer gastrique :
- a. Environ 95 % des cancers gastriques sont des adénocarcinomes
 - b. L'adénocarcinome diffus est situé au niveau de l'estomac distal
 - c. L'adénocarcinome intestinal est situé au niveau de l'estomac distal
 - d. L'adénocarcinome diffus a un meilleur pronostic
 - e. L'adénocarcinome intestinal a un meilleur pronostic

21. Quelles affirmations sont vraies concernant le cancer colorectal :
- a. Est rarement curable, même dans les premiers stades
 - b. L'incidence diminue avec l'âge
 - c. L'activité physique et l'obésité n'influencent pas le risque de développer un cancer colorectal
 - d. Les fumeurs ont un risque élevé
 - e. La polypose adénomateuse familiale (PAF) est associée à un risque élevé
22. Quelles affirmations sont vraies concernant le cancer du foie :
- a. Les tumeurs malignes du foie peuvent être à la fois des tumeurs primaires et des tumeurs secondaires
 - b. Le cancer du foie est l'un des cancers les plus rares au monde
 - c. Survient exclusivement chez les femmes
 - d. Le carcinome hépatocellulaire est la forme la plus fréquente
 - e. Le taux de survie global à 5 ans est proche de 50 %
23. Les symptômes qui peuvent être rencontrés chez les patients atteints d'un cancer de l'œsophage sont :
- a. Régurgitation
 - b. Dysphagie
 - c. Vomissement
 - d. Perte de poids
 - e. Hématurie
24. L'examen clinique chez les patients atteints de carcinome hépatocellulaire peut détecter :
- a. Hépatomégalie,
 - b. Splénomégalie
 - c. Circulation collatérale abdominale
 - d. Ascite
 - e. Tumeur au toucher rectal
25. Parmi les histologies suivantes, lesquelles sont caractéristiques du cancer des testicules ?
- a. Carcinome à cellules en anneau de chevalière
 - b. Tumeur du sac vitellin
 - c. Choriocarcinome
 - d. Carcinome embryonnaire
 - e. Carcinome à cellules transitionnelles

26. L'adénocarcinome rénal est :

- a. Sensible a la chimiothérapie
- b. Résistant à la chimiothérapie
- c. Sensible à la radiothérapie
- d. Résistant à la radiothérapie
- e. Sensible aux thérapies anti-angiogéniques

27. L'antigène carcinoembryonnaire (ACE) est fréquemment élevé dans :

- a. Le cancer colorectal
- b. Le cancer du poumon
- c. Le cancer au sein
- d. Le cancer de tête et du cou
- e. La méningite bactérienne

28. Les affirmations suivantes sont vraies concernant l'IRM :

- a. Repose sur l'utilisation des rayons X
- b. Repose sur l'utilisation d'un champ magnétique
- c. Est contre indiqué en présence de divers appareils métalliques ou stimulateurs cardiaques
- d. Est plus efficace que la tomographie dans l'évaluation des lésions cérébrales ou pelviennes
- e. Le temps de réalisation de l'IRM est très court, quelques secondes

29. Les suivantes critères microscopiques suggèrent une malignité :

- a. Une variation de la taille et de la forme des cellules
- b. Une faible activité mitotique
- c. Le noyau de forme variable
- d. Une disposition organisée des cellules
- e. Une augmentation de l'activité mitotique

30. Les systèmes de classification des tumeurs malignes prennent en compte les suivantes caractéristiques :

- a. Le degré de différenciation des tissus
- b. Le nombre de mitoses
- c. La taille de la tumeur primaire
- d. Le pléomorphisme nucléaire
- e. L'existence de métastases à distance

31. Le suivi des patients atteints d'un cancer :
- a. Peut détecter une rechute précoce
 - b. S'appelle le dépistage
 - c. S'appelle la prévention primaire
 - d. S'appelle la prévention secondaire
 - e. S'appelle la prévention tertiaire
32. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies concernant la curiethérapie ?
- a. La curiethérapie, les sources de rayonnement sont placées en contact intime avec le tissu tumoral
 - b. La curiethérapie de surface est utilisée dans le cancer de la prostate
 - c. Les implants intra-cavitaires sont utilisés dans le cancer du col de l'utérus
 - d. Les techniques de post-chargement protègent le personnel médical
 - e. La curiethérapie interstitielle est utilisée pour le cancer de la peau
33. Parmi les médicaments antiémétiques suivants, lesquels sont des antagonistes de la sérotonine ?
- a. Ondansétron
 - b. Aprepitant
 - c. Métoprolol
 - d. Palonosetron
 - e. Prochlorperazine
34. Parmi les facteurs suivants, lesquels sont des facteurs de risque du cancer du sein ?
- a. Cycle menstruel tardif et ménopause précoce
 - b. Contraceptifs oraux
 - c. Obésité
 - d. Alcool
 - e. Faible niveau socio-économique
35. Le Trastuzumab
- a. Est un anticorps monoclonal anti-HER2
 - b. Est un anticorps monoclonal anti-CD20
 - c. Est un anticorps monoclonal anti-VEGF
 - d. Peut être associé à une chimiothérapie
 - e. Est utilisé dans certains types de cancer du sein

36. Quelles affirmations sont vraies concernant le pronostic du cancer de l'œsophage :

- a. Le cancer de l'œsophage a un bon pronostic, le taux de survie à 5 ans est supérieur à 40 %
- b. Le stade TNM est le facteur pronostique le plus important
- c. Une perte de poids de plus de 10% du poids corporel s'accompagne d'un pronostic plus sombre
- d. Les métastases hépatiques n'influencent pas le pronostic
- e. La tumeur dans le tiers inférieur et moyen a un plus mauvais pronostic

37. Parmi les suivants, lesquels sont des syndromes dermatologiques paranéoplasiques ?

- a. L'ichtyose acquise
- b. Le syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH
- c. Le Syndrome d'Eaton-Lambert
- d. L'acanthosis nigricans
- e. La myasthénie grave

38. Les nausées et les vomissements causés par la chimiothérapie peuvent être :

- a. Aigu, pendant les 24 premières heures de traitement
- b. Retardé, à partir de 24 heures après le traitement
- c. L'intensité constante tout au long de la chimiothérapie
- d. Par anticipation, avant l'administration la chimiothérapie
- e. Ne provoque jamais de nausées et de vomissements

39. Dans le cancer du sein, la castration peut être pratiquée :

- a. Chirurgicalement
- b. Par irradiation
- c. Chimiquement à l'aide d'inhibiteurs de l'aromatase
- d. Chimiquement à l'aide d'analogues de la GnRH
- e. Chimiquement en utilisant des anti-œstrogènes

40. Les facteurs de risque du cancer du foie sont l'infection par le VHB l'infection par le VHC la cirrhose :

- a. L'infection par le VHB
- b. L'infection par le VCH
- c. La cirrhose
- d. L'ingestion d'aliments contaminés par l'aflatoxine
- e. L'exposition au soleil

41. Les saignements dans le cancer colorectal peuvent être :
- a. Un des premiers signes cliniques du cancer colorectal
 - b. Sous forme de méléna
 - c. Sous forme de sang rouge dans les selles
 - d. Sous forme d'hémorragie occulte
 - e. Sous forme d'hématémèse
42. Les déclarations suivantes concernant le traitement du cancer colorectal sont vraies :
- a. La chimiothérapie n'est utile que chez les patients atteints d'une maladie métastatique
 - b. La radiothérapie est utile dans le traitement du cancer du rectum
 - c. La combinaison de la chimiothérapie et des anticorps monoclonaux prolonge la survie des patients atteints d'un cancer colorectal métastatique
 - d. La chimiothérapie combinée couramment utilisée est basée sur le 5-FU ou la capécitabine
 - e. La radiothérapie est utile dans le traitement du cancer du côlon proximal
43. Parmi ces médicaments, lesquels sont des inhibiteurs de la tyrosine kinase à utiliser dans le cancer du rein ?
- a. Sunitinib
 - b. Temsirolimus
 - c. Bévacizumab
 - d. Évérolimus
 - e. Soraténib
44. Lequel des virus suivants a une capacité oncogène ?
- a. Le virus d'Epstein-Barr
 - b. Le virus de l'hépatite C
 - c. La souche VPH-16
 - d. Le virus de la grippe
 - e. Le virus de l'hépatite B
45. La numération formule sanguine (NFS) d'un patient cancéreux sous traitement de chimiothérapie souvent peut présenter :
- a. Une anémie
 - b. Une poliglobulie
 - c. Une thrombocytopénie
 - d. Une neutrophilie
 - e. Une neutropénie

46. Parmi les marqueurs suivants, lesquels sont utilisés dans le cancer colorectal :

- a. AFP
- b. CEA
- c. CA 15-3
- d. CA 125
- e. CA 199

47. L'ultrasonographie :

- a. A l'avantage de ne pas être invasif
- b. Peut être pratiqué même pendant la grossesse
- c. Est la méthode de choix dans le diagnostic du cancer du poumon
- d. A une résolution plus élevée que l'IRM dans le cancer du foie
- e. Peut faire la différence entre une tumeur kystique et une tumeur solide

48. Les examens endoscopiques présentent les avantages suivants :

- a. Permettre le prélèvement par biopsie
- b. Ne sont pas invasifs
- c. Sont facilement tolérés par le patient
- d. Visualiser l'épithélium des organes creux
- e. N'ont jamais besoin de sédation

49. Biopsie au trocart (core needle biopsy) :

- a. Est utilisée dans le cancer du sein
- b. Est réalisé avec des aiguilles spéciales
- c. Est utilisé dans le cancer de la prostate
- d. Peut être réalisé sous guidage échographique
- e. Ne permettent qu'un diagnostic cytologique limité

50. Concernant la classification TNM :

- a. Il existe deux types distincts de stadification - la stadification clinique et la stadification pathologique
- b. La stadification clinique est basée sur les résultats obtenus par examen microscopique de la tumeur
- c. Les stades clinique et pathologique sont toujours identiques
- d. La stadification clinique diffère parfois de la stadification pathologique
- e. La stadification pathologique est basée sur des examens d'imagerie