

QCM 1. * Le nouveau-né SGA (small for gestational age) est un nouveau-né avec un poids :

- A. Grande pour son âge gestationnel
- B. Normal pour son âge gestationnel
- C. Moins de 2500 g
- D. Moins de 1000 g
- E. Petit que son âge gestationnel

QCM 2. *Le nécessaire d'eau chez le nouveau-né

- A. 170-200 ml/kg/j
- B. 100-150 ml/kg/j
- C. 130-150 ml/kg/j
- D. 100-110 ml/kg/j
- E. 140-160 ml/kg/j

QCM 3. *Le fréquence cardiaque normal chez le nouveau-né est de

- A. Sons 100 bpm
- B. 160-180 bpm
- C. 140-160 bpm
- D. 120-140 bpm
- E. 180-200 bpm

QCM 4. *La formule la plus utilisée pour évaluer le poids après l'âge de 1 an est

- A. $9 \times 2 \times \text{âge}$
- B. $4 \times \text{poids} + 7/90 + \text{poids}$
- C. $80 + 5 \times \text{âge}$
- D. $10 + 3 \times \text{âge}$
- E. $9 + 2 \times \text{âge}$

QCM 5. *Quelles sont les affirmations concernant la nécessaire des lipides dans l'alimentation sont correctes :

- A. Nécessaire de lipide de l'alimentation est de 3,5-6g/kg/j chez le nourrisson
- B. La quantité de lipide de l'alimentation représente 35-40% du total de la ration calorique
- C. Le minimum lipidique est de 1,5 g/kg/j
- D. Le nécessaire lipidique de l'alimentation est de 4,5 g/kg/j à l'âge de 1-3 ans
- E. Toutes les affirmations sont correctes

QCM 6. Mentionner les bonnes réponses concernant la croissance en poids dans les 2 premières années de vie

- A. 750 g/mois dans les premiers 4 mois
- B. 500 g/mois dans les mois 5-8
- C. 500 g/mois dans les mois 9-12
- D. 250 g/mois dans la deuxième année
- E. 250 g/mois dans les mois 5-8

QCM 7. Elimination du liquide pulmonaire à la naissance se fait par

- A. La première miction
- B. Compression thoracique

- C. Compression abdominale
- D. Par voie sanguine et lymphatique
- E. Aspiration trachée-bronchique

QCM 8. La croissance se définit par

- A. La réduction du nombre de cellules
- B. L'augmentation de la taille du corps
- C. L'émergence d'une nouvelle masse tissulaire
- D. La multiplication des cellules avec le nombre de cellules
- E. Maturation enzymatique

QCM 9. Le lactose du lait humain est

- A. En concentration de 6-7g/100ml
- B. Unique source de galactose
- C. Importante parce qu'elle stimule la synthèse de la lactase intestinale
- D. La seule source de maltose
- E. Toutes les réponses sont vraies

QCM 10. La ligature et la section du cordon ombilical à la salle d'accouchement se fait

- A. De 25 à 30 cm de la base de l'implantation abdominale
- B. 2,5 à 3 cm de la base de l'implantation abdominale
- C. Avant la cessation de la pulsation artérielle
- D. Après la cessation de la pulsation artérielle
- E. Aucune réponse n'est correcte

QCM 11. Quels sont les affirmations correctes concernant le lait de vache

- A. A un contenu faible de sodium
- B. A un contenu élevé de sodium
- C. L'alimentation précoce avec le lait de vache induit une osmolarité élevée
- D. A un contenu faible en protéines
- E. L'alimentation précoce avec le lait de vache induit une concentration osmotique faible

QCM 12. Quelles sont les affirmations liées au jaunissement physiologique du nouveau-né sont correctes

- A. Coloration jaune apparaît à un niveau de bilirubine de 4-8mg%
- B. Est caractérisée par l'hépatosplénomégalie, des urines foncées, selles décolorées
- C. Coloration jaune apparaît à un niveau de bilirubine de 10-15mg%
- D. A 3 phases évolutives : phase érythrodermie préictérique, phase de la jaunisse, phase de déclin
- E. Nécessité d'une transfusion d'échange

QCM 13. *Le moment optimal pour commencer la diversification de l'alimentation chez le nourrisson

- A. 3 mois
- B. 5 mois
- C. 6 mois
- D. 3 mois et demi
- E. 4 mois

QCM 14. * La valeur énergétique du lait humain est

- A. 97 kcal/100ml
- B. 87 kcal/100ml
- C. 77 kcal/100ml
- D. 67 kcal/100ml
- E. 57 kcal/100ml

QCM 15. *Le nouveau-né sera mis au sein après

- A. 24 heures de vie
- B. 12 heures de vie
- C. 8-10 heures de la vie
- D. 3-6 heures de la vie
- E. Immédiatement après la naissance

QCM 16. *L'intervalle d'âge qui caractérise la première enfance est

- A. 1 mois – 1 an
- B. 0 - 12 mois
- C. 0 – 3 ans
- D. 3 – 4 années
- E. 1 ans – 3 ans

QCM 17. Le nouveau-né à terme se caractérise par

- A. Le poids à la naissance entre 3000 – 3500 g
- B. Le poids à la naissance entre 2500 – 4000 g
- C. De longueur (taille) à la naissance de 50+/- 2 cm
- D. L'âge gestationnel entre 37-42 semaines
- E. L'âge gestationnel entre 32-37 semaines

QCM 18. A la maison, la promenade du nouveau-né se fait

- A. En fonction des conditions météorologiques
- B. En évitant l'exposition excessive au vent ou à l'humidité
- C. Maximum 10 minutes par jour
- D. Commencent à l'âge de 5 jours
- E. Il est interdit de marcher sur le nouveau-né dans le premier mois de vie

QCM 19. Le jaunissement du nouveau-né

- A. Est caractérisé par une hépatosplénomégalie, urines foncées, siéges décolorés
- B. Coloration jaune apparaît à un niveau de bilirubine de 4-8mg%
- C. A 3 phases évolutives : phase érythrodermie préictériale, phase de la jaunisse, phase de déclin
- D. Coloration jaune apparaît à un niveau de bilirubine de 10-15mg%
- E. Nécessité d'une transfusion d'échange

QCM 20. *La diminution physiologique du poids du nouveau-né à terme :

- A. Est la conséquence de l'apport alimentaire et de liquide limité dans les premiers jours de vie

- B. Est comprise entre 5-10%
- C. Jusqu'au jour où 10 un jour, le nouveau-né récupérer cette diminution
- D. Se limite par un apport alimentaire précoce
- E. Toutes les variantes sont correctes

QCM 21. La diversification précoce de l'alimentation a les suivants avantages

- A. Favorise le développement des structures osseuses sollicitées dans le processus de mastication
- B. Induit facilement un rythme plus rapide de croissance et gain de poids
- C. Offre un apport supplémentaire de vitamines, fer, fibres
- D. Favorise l'obésité de l'apport
- E. Des protéines végétales ont une valeur biologique inférieure à celle du lait

QCM 22. Quelles sont les sources idéales de protéines dans les premiers 12 mois de la vie

- A. Viande de porc
- B. Œufs
- C. Caséine
- D. Petit lait/ lactosérum (lactalbumine)
- E. Toutes les réponses sont correctes

QCM 23. Les oligosaccharides du lait sont importantes parce que

- A. Sont une source d'énergie
- B. Ont un rôle dans la croissance
- C. Servent de synthèse de la sphingomyéline et les gangliosides
- D. Ont un rôle dans la défense anti-infectieux
- E. Toutes les réponses sont correctes

QCM 24. En ce qui concerne les téguments du nourrisson et de l'enfant les réponses suivantes sont correctes

- A. La région cutanée est plus grande chez le nourrisson et l'enfant que chez l'adulte
- B. La région cutanée est plus petite chez le nourrisson et l'enfant que chez l'adulte
- C. Les glandes sébacées et la sueur se développent progressivement
- D. La peau chez le nourrisson souri, nourrit naturellement est de couleur rose
- E. La peau chez le nourrisson souri, nourrit artificiellement est de peu cyanose

QCM 25. La période du nourrisson se caractérise par

- A. L'apparition des dents de lait
- B. Âge entre 1 mois -1 an
- C. Le développement de la fonction digestive pour la diversification
- D. Faible mortalité
- E. Le développement de l'indépendance envers la mère

QCM 26. Le vernix caseosa a une action

- A. Lubrifiant
- B. Bactéricide
- C. Protection contre le froid
- D. Aucune réponse n'est correcte

E. Toutes les réponses sont correctes

QCM 27. Le milium du visage (miliaire sébacée) a les caractéristiques suivantes

- A. Apparaît au niveau du nez et visage
- B. Apparaît au niveau de l'abdomen
- C. Est ponctuée
- D. Est de couleur blanche
- E. Aucune réponse n'est correcte

QCM 28. Quelles sont les affirmations correctes concernant l'élimination du méconium

- A. S'élimine habituellement dans les 12 premières heures après la naissance
- B. 99% des nourrissons à terme éliminent le méconium dans les premières 48 heures de la naissance
- C. 95% des prématurés éliminent le méconium dans les premières 48 heures de la naissance
- D. 95% des nourrissons à terme éliminent le méconium dans les premières 48 heures de la naissance
- E. 99% des prématurés éliminent le méconium dans les premières 48 heures de la naissance

QCM 29. *Quel est l'âge de l'introduction dans l'alimentation des protéines alimentaires « étrangères » (viande, poisson, œufs) pour le nourrisson avec un historique familial positif pour l'allergie

- A. 3 mois
- B. 4 mois
- C. 5 mois
- D. Plus de 6 mois
- E. Plus d'un an

QCM 30. *A un an, l'enfant est capable de faire les actions suivantes

- A. Faire les premiers pas sans aide
- B. Monte les escaliers un par un
- C. Lancer le ballon avec ses 2 mains
- D. Tracer des lignes avec un crayon
- E. Manger tout seul avec une cuillère

QCM 31. C'est vrai sur la définition des réflexes primaires (archaïques)

- A. Ne sont pas spécifique pour le nouveau-né
- B. Traduisent l'immaturation du cortex cérébral
- C. Traduisent la maturité du cortex cérébral
- D. Traduisent le degré d'inhibition diminué des régions de la base du cerveau
- E. Sont spécifique des prématurés

QCM 32. Le nouveau-né est examiné

- A. Il présente un risque d'hypothermie
- B. Déshabillé
- C. Dans des conditions qu'il soit réveillé
- D. Placés en décubitus dorsal sur la table d'examen
- E. Le nourrisson être examinée que dans la salle d'accouchement

QCM 33. Caractéristiques de la fonction rénale chez le nouveau-né à terme sont :

- A. Le nouveau-né prédispose à la rétention de sel et d'eau avec l'apparition des œdèmes
- B. Existe l'albuminurie transitoire dans les premiers jours
- C. La diurèse est d'environ 10 ml/kg de poids corporel/24 heures
- D. Dans les premiers jours, la fonction rénale est pauvre
- E. La filtration glomérulaire est faible, la perméabilité membranaire filtrante et la réabsorption tubulaire est faible

QCM 34. Le rapport de la caséine/protéines du petit lait (lactalbumine) est de

- A. 40/60 dans le lait humain mature
- B. 50/50 dans le lait humain hypermature
- C. 90/10 Dans le lait de vache
- D. 70/30 dans le lait de vache
- E. Aucune réponse n'est correcte

QCM 35. Quelles sont les affirmations concernant les fibres alimentaires sont correctes

- A. Manque dans l'alimentation du nourrisson jusqu'au moment de la diversification alimentaire
- B. Assurer la cohérence des sièges
- C. Participer à la régulation du transit intestinal
- D. Eliminer l'eau, des acides organiques et les minéraux
- E. Aucune réponse n'est correcte

QCM 36. Quelles sont les affirmations concernant l'allaitement sont correctes

- A. Est peu-développé chez les prématurés
- B. Est ralenti à cause de l'obstruction nasale
- C. Est mieux développé chez les prématurés
- D. D'air avale pendant l'allaitement détermine les régurgitations et des coliques abdominales
- E. D'air avale pendant l'allaitement détermine l'apparition de diarrhée chez les nourrissons

QCM 37. A l'âge d'un mois le nourrisson

- A. Pleurer de faim et de l'inconfort
- B. Sursaute au bruit fort
- C. S'assoit soutenue
- D. Babille
- E. Attraper un jouet

QCM 38. A l'âge de 3 ans, l'enfant

- A. Pose souvent des questions
- B. Reproduit des poèmes
- C. Manifeste l'opposition
- D. Enumère les jours semaines
- E. Reconnaît les lettres

QCM 39. *Le grand crâne (macrocéphale) peut être trouvé dans

- A. Hydrocéphalie
- B. En famille
- C. Erreurs innés du métabolisme

- D. Gigantisme cérébral
- E. Toutes les variantes sont correctes

QCM 40. *Chez le nouveau-né sain, la diversification commence avec

- A. Purée de légumes
- B. Soupe de légumes
- C. Biscuits + fromage de vache
- D. Viande mélangée
- E. Lait avec farine

QCM 41. *A quel âge le nourrisson babille ?

- A. 2 mois
- B. 3 mois
- C. 4 mois
- D. 5 mois
- E. 6 mois

QCM 42. *Après l'âge d'un an, la taille est estimée à l'aide de la formule suivante

- A. $90 \text{ (cm)} + 5 \times \text{âge}$
- B. $80 \text{ (cm)} + 3 \times \text{âge}$
- C. $5 \text{ (cm)} + 80 \times \text{âge}$
- D. $9 \text{ (g)} \times 2 \times \text{âge}$
- E. $80 \text{ (cm)} + 5 \times \text{âge}$

QCM 43. * L'intervalle d'âge qui caractérise la deuxième enfance (âge préscolaire) est

- A. 1 mois- 1 an
- B. 0 -12 mois
- C. 0 - 3 ans
- D. 3- 6 ans
- E. 1 an- 3 ans

QCM 44. La dynamique de croissance en longueur chez le nourrisson et le petit enfant est

- A. 4 cm le premier mois
- B. 1 cm/ mois pendant les mois 5-12
- C. 3 cm/mois pendant les mois 5-12
- D. Rapide entre 10 et 12 ans chez les filles
- E. Rapide entre 8 et 10 ans chez les garçons

QCM 45. Les érythrocytes chez les nouveau-nés à terme

- A. Ont une faible quantité de glutathion réduit
- B. Ont faible activité métabolique
- C. Ont une moyenne de vie courte
- D. Sont en nombre de $150\,000 - 300\,000/\text{mm}^3$
- E. Sont très fragiles

QCM 46. *La fontanelle antérieure bombée peut être rencontrée en

- A. Méningite

- B. Hydrocéphalie
- C. Œdème cérébral
- D. Hémorragie cérébrale
- E. Toutes les réponses sont correctes

QCM 47. *Les caractéristiques de l'hormone hypophysaire somatotrope spécifique à la période croissance et développement après la naissance sont

- A. Agit sur la croissance du cartilage par somatomédine
- B. A rôle de maturation dentaire
- C. N'a pas de rôle dans la chondrogenèse
- D. Cause la diminution du nombre de cellules
- E. Son hypofonction cause le gigantisme

QCM 48. *Choisissez les caractères de la croissance neuronale

- A. Est caractéristique du système lymphatique
- B. Rythme intense à l'adolescence
- C. Rythme lent dans les premières 2 années de vie
- D. Est caractéristique du système nerveux central
- E. Intensivement jusqu'à l'âge de 6 ans

QCM 49. *Le nécessaire protéique chez le nourrisson est de

- A. 3.2 à 3.6 g/kg/j
- B. à 2.2 g/kg/j
- C. 1.5 à 1.8 g/kg/j
- D. 1.2 à 1.4 g/kg/j
- E. 0.9 à 1.1 g/kg/j

QCM 50. *La valeur du poids à la naissance peut être influencée par les facteurs suivants

- A. La durée de la gestation
- B. L'insuffisance placentaire
- C. Infections intra-utérines
- D. Grossesse multiple
- E. Toutes les réponses sont correctes