

Puncția rahidiană



SPITALUL CLINIC DE
URGENȚĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



Scop

- Diagnostic

- Laborator
- Culturi
- Medulogramă

- Terapeutic

- Anestezie regională
- Decompresie



SPITALUL CLINIC DE
URGENȚĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



Material necesar

- Dezinfectant
- Câmp steril
- Mănuși sterile
- Compresa, leucoplast
- Ace de puncție (ace lungi cu diametru de 1-1,5 mm)
- Seringi
- Medicamente



SPITALUL CLINIC DE
URGENȚĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA




Poziția bolnavului

- Decubit dorsal
- Șezând

cu spatele curbat, coapsele flectate pe abdomen, bărbia atingând pieptul

Lumbar Puncture



Lying Position

Sitting Position



SPITALUL CLINIC DE
URGENȚĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



Puncția rahidiană

- Locul puncției
 - Lombar = cea mai utilizată
- Tehnica
 - Pregătirea psihică, eventual sedare (rar anestezie)
 - Se dezinfectează tegumentul
 - Se stabilește locul puncției și palpează spațiul intervertebral corespunzător
 - Se introduce acul în spațiul intervertebral, orientat ușor ascendent
 - Se avansează până ce pe ac se exteriorizează LCR
 - Se recoltează LCR, se introduc medicamentele (Conform scopului puncției)
 - Se retrage acul și se aplică pansament steril





Incidente complicații

- Leziuni medulare
- Hemoragia
- Hipotensiune LCR (prea mult lichid extras)
- Infecție



SPITALUL CLINIC DE
URGENȚĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



Îngrijiri post-puncție

- Pansament steril pentru 24-36 ore
- Repaus 6 – 12 ore
- Monitorizarea funcțiilor vitale



SPITALUL CLINIC DE
URGENȚĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



De retinut

- Scop: diagnostic sau terapeutic
- Complicatii: spinale, cerebrale, infectioase
- Anestezie: peridurala vs rahidiana
- Pansament, repaus, functii vitale





Mulțumesc



Timisoara, Romania



SPITALUL CLINIC DE
URGENTĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA