



Constipation

Définition

C'est l'évacuation retardée du contenu du côlon > 48 heures

Évacuation insuffisante et fractionnées des matières fécales

L'évacuation des selles dures, sèches en petite quantité



Constipation

Etiologie:

- complexes, plusieurs facteurs sont impliqués:
- modification du péristaltisme
- modification de la progression des matières fécales à travers le gros l'intestin



Constipation

Classification

D'après l'aspect et la quantité de matières fécales.

Constipation accumulative: - émissions quotidiennes, mais très réduite des matières fécales

Constipation fragmentée: - évacuation des matières fécales en petits fragments, sans émissions quotidiennes

Constipation avec des résidus multiples: - alimentation riches en résidus de cellulose



Constipation

Classification: d'après la symptomatologie

Constipation compensée:

Colon évacue sans manifestations subjectives et objectives

Constipation décompensée:

Côlon est évacue avec une souffrance: subjective, objective, locale ou générale

Constipation fonctionnelle (symptomatique)

Constipation organique

Constipation chirurgicale:

- nouveau-né

- nourrisson



Constipation

La constipation du nouveau-né

. Bouchon méconial

Le méconium est les premières selles de l'enfant, pendant les premiers jours qui suivent la naissance

Les expulsions de méconium peuvent former à la naissance un bouchon dit « méconial » éventuellement responsable de phénomènes précoces de constipation chez le nouveau-né.

Le méconium peut aussi être accidentellement inhalé par le nouveau-né au moment de l'accouchement, ou être en contact avec le cordon ombilical au moment où on le coupe



Constipation

La constipation du nouveau-né

Iléus méconial:

- La mucoviscidose (fibrose kystique du pancréas)
- Débuts dans les 24-48 premières heures de la vie
- Les signes cliniques:
 - refus d'alimentation,
 - vomissements bilieux, -fécaloïdes,
 - distension abdominale,
 - troubles respiratoires,
 - absence de transit intestinal,
 - images d'anse hypertrophiée



SPITALUL CLINIC DE
URGENTĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMISOARA



Constipation



A



B



Bishop-Koop anastomosis for irrigation.



SPITALUL CLINIC DE
URGENTĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMISOARA




Constipation

La constipation du nouveau-né

Péritonite méconiale

- début <24 h de vie ,d'origine intra-utérine
- signes cliniques:
 - abdomen distendu,
 - météorisme,
 - œdème sus-pubien,
 - circulation collatérale,
 - vomissements bilieux,
 - transit intestinal absent ou réduit,
 - altération de l'état général,
 - fièvre > 39 ° C



Péritonite méconiale par perforation,
responsable d' ascite de masse pelvienne hyperéchogène,



Constipation

La constipation du nouveau-né

Iléus fonctionnel (paralytique): est rencontrée

- prématurité
- septicémie
- pneumopathies
- Troubles hydro-électrolytiques(**hypokaliémie**)
- Troubles acido-basiques
- Rx: les anses intestinales avec aérocolie marquée sans images hydro-aériques

Le micro-colon:

- enfants de mères diabétiques
- bouchon de méconium collant
- flatulences a l'élimination





Constipation

La constipation du nouveau-né

Occlusion intestinale haute:

l'atrésie et la sténose duodénale, jéjunale:

- débuts entre le 1-2 jours de la vie,
- prématurés,
- grossesse avec hydramnios,
- vomissements bilieux, réduits en quantité et fréquentes,
- ictère,
- les malformations congénitales (omphalocèle, laparoschizis)



SPITALUL CLINIC DE
URGENTĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMISOARA



Constipation

La constipation du nouveau-né

Occlusion intestinale basse:

- début après le 2-4eme jours de vie
- vomissements: bilieux, fécaloïdes en grande quantité
- distension abdominale marquée,
- images des anses visible ,
- circulation collatérale,
- ascension du diaphragme,
- tachypnée avec polypnée



SPITALUL CLINIC DE
URGENTĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMISOARA



Constipation

La constipation du nouveau-né

Occlusion intestinale basse:

Mégacôlon congénital:

- occlusion fonctionnelle,
- constipation chronique,
- vomissements bilieux puis fécaloïde,
- distension abdominale avec météorisme,
- Le toucher rectal:**
 - ampoule rectal vide, sans matières fécales
 - élimination explosive de gaz et méconium





Constipation

La constipation du nouveau-né

Occlusion intestinale basse:

Atrésie ano-rectale:

- l'absence d'anūs
- absence partielle ou totale du rectum





Constipation

La constipation du nouveau-né

Occlusion intestinale basse

Agénésie ano-rectale:

-orifice anal présent,
-absence partielle d'anus ou du rectum, avec
l'ouverture du côlon sigmoïde dans la:

- vessie
- urètre
- vagin



SPITALUL CLINIC DE
URGENTĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMISOARA



Constipation

La constipation du nouveau-né

Occlusion intestinale basse

Imperforation anale:

- membrane anale

Sténose de l'orifice anal

- toucher rectal
- corde anale
- le méconium évacué est mince,



Autres causes de constipation:

- les malrotations intestinales
- duplications intestinales
- tératomes sacro-coccygiens



SPITALUL CLINIC DE
URGENTĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMISOARA



Constipation

Constipation chez le nourrisson et l'enfant

Fissure anale:

- cause la plus fréquente chez le nourrisson,
- défécation défectueuse,
- selles recouvert de sang frais,
- toucher rectal - fissure externe
- fissure interne





Constipation

Constipation chez le nourrisson et l'enfant

Mégacôlon congénital - forme tolérée:

- la constipation chronique selles au 4-6 jours provoquées;
- anorexie,
- météorisme abdominal,
- vomissements fécaloïdes au 2ème jour,
- perte de poids,
- image de anses visibles.

Le toucher rectal :— ampoule rectal vide

Abdominal: La formation tumorale dans la fosse iliaque gauche





Constipation

Constipation chez le nourrisson et l'enfant

Mégacôlon secondaire :

- les brides intestinaux
- les tumeurs du tractus gastro-intestinal
 - lymphosarcomes
 - carcinomes

Mégacôlon idiopathique - constipation psychogène

- apparait après l'âge de 2 ans,
- erreurs d'éducation des sphincters,
- douleurs a la défécation
- diarrhée paradoxale sous-vêtements souillées avec les matières fécales