




Abordul vascular la pacientului chirurgical



SPITALUL CLINIC DE
URGENȚĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



Locurile de electie pentru punctia osoasa (abord vascular intraosos)





Abordul vascular


- Abord în urgență
 - Periferic
 - Intra osos
 - Cateter venos central
- Abord de scurtă durată
 - Periferic
 - Cateter venos central
- Abord de durată medie
 - Periferic
 - Cateter venos central introdus periferic
 - Cateter venos central
- Abord de lungă durată
 - Cateter venos central introdus periferic
 - Cateter venos central
 - Cateter port subcutan





Abord periferic

- Venele dorsale ale mâinii
- Venele anterioare ale antebrațului
- Plica cotului
- Scalp
- Venele dorsale ale piciorului



SPITALUL CLINIC DE
URGENTĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



Abordul vascular

Posibile complicatii:

- Hematom
- Ruperea vasului
- Administrare para-venoasa
- Pneumotorax - CVC





SPITALUL CLINIC DE
URGENȚĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



Cateter ombilical

- La nou născut
- Cateterul se introduce prin vena ombilicală denudată
- Capătul cateterului trebuie să ajungă la vărsarea venei cave inferioare în atriul drept (la nivelul diafragmului pe Rx)
- Nu se menține >14 zile





Cateterul venos central

- Calea de acces
 - Vena jugulară
 - Vena subclavie
 - Vena femurală
- Abord
 - Percutan prin tehnica Seldinger
 - Descoperire chirurgicală și canularea directă





Cateterul venos central





Tehnica Seldinger

- Se cateterizează percutan vena (preferabil sub control ecografic)
- Prin cateter se introduce un fir de ghidaj
- Se retrage cateterul periferic
- Se introduce cateterul central pe ghidaj
- Se retrage ghidajul
- Vârful cateterului trebuie să fie la vărsarea venei cave superioare/ inferioare în atriul drept (Extrasistole pe ECG + Control Rx)






Tehnica Seldinger



SPITALUL CLINIC DE
URGENȚĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



Cateterul venos central





Cateter venos central introdus periferic

- Tehnica Seldinger
- Cateter de dimensiuni mai mici
- Se abordează primar o venă periferică (plica cotului, antebrăț)
- Mai dificil de realizat





Cateterul venos central

- Verificarea radiologică a poziției cateterului
- Dezinfecția periodică a punctului de inserție
- Heparinizarea zilnică a cateterului
- Monitorizarea înșămânțării septice a cateterului





SPITALUL CLINIC DE
URGENȚĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



Cateter port

- Se inseră chirurgical printr-o venă centrală
- Se poate menține ➡ 1 an





De retinut

- Abordul venos - un instrument important de investigare si tratament
 - necesar oricarui pacient in preoperator
 - central sau periferic
 - scurta, medie, lunga durata
- Cateterul venos central - se introduce sub anestezie generala
 - v. jugulara externa, subclaviculara, femurala
 - la nou-nascuti v. ombilicala
 - Tehnica Seldinger





Mulțumesc



Timisoara, Romania



SPITALUL CLINIC DE
URGENȚĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA