

Questionnaire n° 1.2

1. * Le CA 19-9 augmente le plus souvent dans:
- a) le cancer du poumon
 - b) le cancer des ovaires
 - c) le cancer du sein
 - d) le cancer de la thyroïde
 - ☒ e) le cancer du pancréas
2. * Quel est le premier signe clinique le plus courant du cancer du sein
- a) une masse mammaire
 - b) le mamelon rétracté
 - c) un écoulement du mamelon
 - d) une mastite carcinomateuse
 - ☒ e) la peau "peau d'orange"
3. * Le type de cancer du foie le plus courant est
- a) le cholangiocarcinome
 - b) le carcinome à cellules claires
 - ☒ c) le carcinome hépatocellulaire
 - d) l'angiosarcome
 - e) le lymphome
4. * Laquelle des histologies suivantes est l'histologie la plus courante dans le cancer du rein ?
- a) le carcinome à cellules transitionnelles
 - ☒ b) l'adénocarcinome papillaire
 - c) l'adénocarcinome à cellules claires
 - d) l'adénocarcinome chromophile
 - e) le carcinome embryonnaire
5. * Le CA 125 augmente le plus fréquemment dans quel type de cancer:
- a) le cancer du pancréas
 - b) le cancer du poumon
 - ☒ c) le cancer des ovaires
 - d) le cancer du sein
 - e) le cancer colorectal
6. * L'anémie induite par la chimiothérapie est une anémie:
- a) normochrome normocytaire
 - ☒ b) hypochrome microcytaire
 - c) hyperchrome macrocytaire
 - d) normochrome microcytaire
 - e) normochrome macrocytaire
7. * Lequel des médicaments suivants est un inhibiteur de la topoisomérase:
- a) cyclophosphamide
 - b) docétaxel
 - c) doxorubicine
 - d) oxaliplatine
 - ☒ e) irinotécan
8. * Lequel des médicaments suivants n'est PAS une chimiothérapie
- a) cisplatine
 - b) paclitaxel
 - c) exemestane
 - d) oxaliplatine
 - ☒ e) étoposide
9. * L'anémie survenant au cours de la chimiothérapie repose sur un mécanisme
- a) de carence en fer
 - ☒ b) de carence en B12
 - c) de l'inhibition de la moelle osseuse induite par la tumeur
 - ☒ d) de l'inhibition de la moelle osseuse induite par le traitement
 - e) autoimmune
10. * Lequel des inhibiteurs de tyrosine kinase suivants est utilisé dans la leucémie myéloïde chronique
- ☒ a) sunitinib
 - b) imatinib
 - c) sorafénib
 - d) erlotinib
 - e) lapatinib

11.* Quelle est l'histologie la plus fréquente du cancer du sein

- a) carcinome lobulaire invasif
- b) carcinome canalaire invasif
- c) Tumeur phyllode
- d) La maladie de Paget
- e) angiosarcome

12.* Lequel des éléments suivants n'est PAS un facteur de risque de cancer de l'œsophage

- a) l'alcool
- b) le syndrome de Plummer-Vinson
- c) le tabac
- d) l'exposition au soleil
- e) l'œsophage de Barrett

13.* Les facteurs de risque du cancer du pancréas sont les suivants, sauf

- a) le tabac
- b) l'alcool
- c) l'obésité
- d) le Syndrome de Peutz-Jeghers
- e) les antécédents personnels de cancer du foie

14.* Lequel des éléments suivants n'est PAS un facteur de risque de cancer du poumon

- a) le tabac
- b) le régime
- c) l'exposition environnementale au radon
- d) l'exposition aux radiations
- e) l'exposition professionnelle à l'amiante

15.* Dans quel type de cancer du testicule peut-on utiliser la radiothérapie ?

- a) uniquement dans les tumeurs du sac vitellin
- b) uniquement dans le carcinome embryonnaire
- c) uniquement dans les séminomes
- d) seulement dans les tératomes
- e) dans tous les types histologiques de cancer du testicule

C ?

16. Parmi les cancers suivants, lesquels sont les plus fréquents chez les hommes ?

- a) cancer du poumon
- b) cancer de la thyroïde
- c) cancer de l'estomac
- d) cancer de l'œsophage
- e) cancer de la vessie

17. Quelles affirmations sont vraies concernant les cancers professionnels

- a) sont de plus en plus courants ces derniers temps
- b) l'amiante peut provoquer un cancer du col de l'utérus
- c) les travailleurs de l'industrie des colorants et des peintures développent fréquemment un cancer de la vessie
- d) l'exposition aux composés du benzène peut développer une leucémie
- e) l'exposition aux radiations augmente le risque de leucémie

18. La curiethérapie est

- a) une procédure de neurolyse antalgique pour le plexus brachial
- b) une technique de chimiothérapie intra-artérielle sur membre supérieur isolé
- c) une procédure dans laquelle la tumeur entre en contact avec une source radioactive
- d) une technique de radiothérapie
- e) procédé d'implantation d'un dispositif de perfusion de chimiothérapie

19. La chimiothérapie pratiquée avant la chirurgie curative est appelée

- a) chimiothérapie primaire
- b) chimiothérapie adjuvante
- c) chimiothérapie néoadjuvante
- d) chimiothérapie palliative
- e) chimiothérapie accélérée

20. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies concernant le cancer gastrique

- a) environ 95 % des cancers gastriques sont des adénocarcinomes
- b) l'adénocarcinome diffus est situé au niveau de l'estomac distal
- c) l'adénocarcinome intestinal est situé au niveau de l'estomac distal
- d) l'adénocarcinome diffus a un meilleur pronostic
- e) l'adénocarcinome intestinal a un meilleur pronostic

21. Quelles affirmations sont vraies concernant le cancer colorectal

- a) est rarement curable, même dans les premiers stades
- b) l'incidence diminue avec l'âge
- c) l'activité physique et l'obésité n'influencent pas le risque de développer un cancer colorectal
- d) les fumeurs ont un risque élevé
- e) la polypose adénomateuse familiale (PAF) est associée à un risque élevé

22. Quelles affirmations sont vraies concernant le cancer du foie

- a) les tumeurs malignes du foie peuvent être à la fois des tumeurs primaires et des tumeurs secondaires
- b) le cancer du foie est l'un des cancers les plus rares au monde
- c) survient exclusivement chez les femmes
- d) le carcinome hépatocellulaire est la forme la plus fréquente
- e) le taux de survie global à 5 ans est proche de 50 %

23. Les symptômes qui peuvent être rencontrés chez les patients atteints d'un cancer de l'œsophage sont

- a) régurgitation
- b) dysphagie
- c) vomissement
- d) perte de poids
- e) hématurie

24. L'examen clinique chez les patients atteints de carcinome hépatocellulaire peut détecter

- a) hépatomégalie
- b) splénomégalie
- c) circulation collatérale abdominale
- d) ascite
- e) tumeur au toucher rectal

25. Parmi les histologies suivantes, lesquelles sont caractéristiques du cancer des testicules ?

- a) Carcinome à cellules en anneau de chevalière
- b) Tumeur du sac vitellin
- c) choriocarcinome
- d) carcinome embryonnaire
- e) carcinome à cellules transitionnelles

26. L'adénocarcinome rénal est

- a) sensible à la chimiothérapie
- b) résistant à la chimiothérapie
- c) sensible à la radiothérapie
- d) résistant à la radiothérapie
- e) sensible aux thérapies anti-angiogéniques

bevacizumab

27. L'antigène carcinoembryonnaire (ACE) est fréquemment élevé dans

- a) le cancer colorectal
- b) le cancer du poumon
- c) le cancer du sein
- d) le cancer de tête et du cou
- e) la méningite bactérienne

28. Les affirmations suivantes sont vraies concernant l'IRM

- a) repose sur l'utilisation des rayons X
- b) repose sur l'utilisation d'un champ magnétique
- c) est contre-indiqué en présence de divers appareils métalliques ou stimulateurs cardiaques
- d) est plus efficace que la tomographie dans l'évaluation des lésions cérébrales ou pelviennes
- e) le temps de réalisation de l'IRM est très court, quelques secondes

29. Les suivantes critères microscopiques suggèrent une malignité

- a) une variation de la taille et de la forme des cellules
- b) une faible activité mitotique
- c) le noyaux de forme variable
- d) une disposition organisée des cellules
- e) une augmentation de l'activité mitotique

30. Les systèmes de classification des tumeurs malignes prend en compte les suivantes caractéristiques

- a) le degré de différenciation des tissus
- b) le nombre de mitoses
- c) la taille de la tumeur primaire
- d) le pléomorphisme nucléaire
- e) l'existence de métastases à distance

31. Le suivi des patients atteints d'un cancer

- a) peut détecter une rechute précoce
- b) s'appelle le dépistage
- c) s'appelle la prévention primaire
- d) s'appelle la prévention secondaire
- e) s'appelle la prévention tertiaire

32. Parmi les affirmations suivantes, lesquelles sont vraies concernant la curiethérapie ?

- a) en curiethérapie, les sources de rayonnement sont placées en contact intime avec le tissu tumoral
- b) la curiethérapie de surface est utilisée dans le cancer de la prostate
- c) les implants intra-cavitaires sont utilisés dans le cancer du col de l'utérus
- d) les techniques de post-chargement protègent le personnel médical
- e) la curiethérapie interstitielle est utilisée pour le cancer de la peau

33. Parmi les médicaments antiémétiques suivants, lesquels sont des antagonistes de la sérotonine ?

- a) ondansétron
- b) aprepitant
- c) métoclopramide
- d) palonosétron
- e) prochlorpérazine

34. Parmi les facteurs suivants, lesquels sont des facteurs de risque du cancer du sein ?

- a) cycle menstruel tardif et ménopause précoce
- b) contraceptifs oraux
- c) obésité
- d) alcool
- e) faible niveau socio-économique

35. Le Trastuzumab

- a) est un anticorps monoclonal anti-HER2
- b) est un anticorps monoclonal anti-CD20
- c) est un anticorps monoclonal anti-VEGF
- d) peut être associé à une chimiothérapie
- e) est utilisé dans certains types de cancer du sein

36. Quelles affirmations sont vraies concernant le pronostic du cancer de l'œsophage

- a) le cancer de l'œsophage a un bon pronostic, le taux de survie à 5 ans est supérieur à 40 %
- b) Le stade TNM est le facteur pronostique le plus important
- c) Une perte de poids de plus de 10% du poids corporel s'accompagne d'un pronostic plus sombre
- d) les métastases hépatiques n'influencent pas le pronostic
- e) la tumeur dans le tiers inférieur et moyen a un plus mauvais pronostic

37. Parmi les suivants, lesquels sont des syndromes dermatologiques paraneoplasiques ?

- a) l'ichtyose acquise
- b) le syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH
- c) le Syndrome d'Eaton-Lambert
- d) l'acanthosis nigricans
- e) la myasthénie grave

38. Les nausées et les vomissements causés par la chimiothérapie peuvent être

- a) aigu pendant les 24 premières heures de traitement
- b) retardé, à partir de 24 heures après le traitement
- c) intensité constante tout au long de la chimiothérapie
- d) par anticipation, avant l'administration
- e) la chimiothérapie ne provoque jamais de nausées et de vomissements

39. Dans le cancer du sein, la castration peut être pratiquée:

- a) chirurgicalement
- b) par irradiation
- c) chimiquement à l'aide d'inhibiteurs de l'aromatase
- d) chimiquement à l'aide d'analogues de la GnRH
- e) chimiquement en utilisant des anti-œstrogènes

40. Les facteurs de risque du cancer du foie sont

- a) l'infection par le VHB
- b) l'infection par le VHC
- c) la cirrhose
- d) l'ingestion d'aliments contaminés par l'aflatoxine
- e) l'exposition au soleil

41. Les saignements dans le cancer colorectal peuvent être

- ☒ a) un des premiers signes cliniques du cancer colorectal
- ☐ b) sous forme de méléna
- ☐ c) sous forme de sang rouge dans les selles
- ☐ d) sous forme d'hémorragie occulte
- ☐ e) sous forme d'hématémèse

42. Les déclarations suivantes concernant le traitement du cancer colorectal sont vraies

- ☐ a) la chimiothérapie n'est utile que chez les patients atteints d'une maladie métastatique
- ☒ b) la radiothérapie est utile dans le traitement du cancer du rectum
- ☐ c) la combinaison de la chimiothérapie et des anticorps monoclonaux prolonge la survie des patients atteints d'un cancer colorectal métastatique
- ☒ d) la chimiothérapie combinée couramment utilisée est basée sur le 5-FU et la capécitabine
- ☐ e) la radiothérapie est utile dans le traitement du cancer du côlon proximal

43. Parmi ces médicaments, lesquels sont des inhibiteurs de la tyrosine kinase à utiliser dans le cancer du rein ?

- ☒ a) sunitinib
- ☐ b) temsirolimus
- ☐ c) bévacizumab
- ☐ d) évérolimus
- ☒ e) sorafénib

44. Lequel des virus suivants a une capacité oncogène ?

- ☒ a) le virus d'Epstein-Barr
- ☒ b) le virus de l'hépatite C
- ☐ c) la souche VPH-16
- ☐ d) le virus de la grippe
- ☒ e) le virus de l'hépatite B

45. La numération formule sanguine (NFS) d'un patient cancéreux sous traitement de chimiothérapie souvent peut présenter

- ☒ a) une anémie
- ☐ b) une poliglobulie
- ☒ c) une thrombocytopénie
- ☐ d) une neutrophilie
- ☒ e) une neutropénie

46. Parmi les marqueurs suivants, lesquels sont utilisés dans le cancer colorectal ?

- ☒ a) AFP
- ☒ b) CEA
- ☐ c) CA 15-3
- ☐ d) CA 125
- ☒ e) CA 19-9

47. L'ultrasonographie

- ☐ a) a l'avantage de ne pas être invasif
- ☐ b) peut être pratiqué même pendant la grossesse
- ☐ c) est la méthode de choix dans le diagnostic du cancer du poumon
- ☐ d) a une résolution plus élevée que l'IRM dans le cancer du foie
- ☒ e) peut faire la différence entre une tumeur kystique et une tumeur solide

48. Les examens endoscopiques présentent les avantages suivants

- ☒ a) permettre le prélèvement par biopsie
- ☐ b) ne sont pas invasifs
- ☐ c) sont facilement tolérés par le patient
- ☒ d) visualiser l'épithélium des organes creux
- ☒ e) ont jamais besoin de sédation

49. Biopsie au trocart (core needle biopsy)

- ☐ a) est utilisé dans le cancer du sein
- ☒ b) est réalisé avec des aiguilles spéciales
- ☒ c) est utilisé dans le cancer de la prostate
- ☒ d) peut être réalisé sous guidage échographique
- ☐ e) ne permettent qu'un diagnostic cytologique limité

50. Concernant la classification TNM

- ☐ a) il existe deux types distincts de stadification - la stadification clinique et la stadification pathologique
- ☒ b) la stadification clinique est basée sur les résultats obtenus par examen microscopique de la tumeur
- ☐ c) les stades clinique et pathologique sont toujours identiques
- ☒ d) la stadification clinique diffère parfois de la stadification pathologique
- ☒ e) la stadification pathologique est basée sur des examens d'image

