

Întrebarea 33 din 50

Sugar de 10 luni diagnosticat cu herpangina se tratează cu următoarele:

- ☐ A) Penicilina
- ☒ B) Paracetamol/acetaminofen
- ☐ C) medicație antiherpetică
- ☒ D) deobstruante naso-faringiene
- ☐ E) Eritromicina

Următoarea >

lenovo

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA A

Timp rămas: 0 09:06

Bettina Isabella Anghelescu

Întrebarea 48 din 50

Glomerulonefritele poststreptococice la copil se prezintă majoritar:

- ☒ A) În timpul unei infecții cu streptococ grup A
- ☐ B) Cu fracțiunea C3 scăzută
- ☒ C) Cu hematurie
- ☒ D) Cu modificarea ASLO
- ☒ E) Simptomele pot să apară la 1-2 săptămâni după scarlatina

Următoarea ▶

ClassMarker

Rezultate pentru: Ionut Adrian Achim

Titlu: M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA A

Puncte: 215.5 din 237

Procentaj: 90.9%

Durată: 00:45:51

Data începerii: mie. 24 iun. 2020 10:00

Data finalizării: mie. 24 iun. 2020 10:46



Descarcă Certificat

Ați terminat. Vă mulțumim.

Întrebarea 5 din 50

*Un sugar de 3 luni prezintă la domiciliu o criză hipoxică în urma unui episod de agitație. Mama solicită ambulanța care constată o Sp O₂ 76%, care nu se corectează la administrare de oxigen, dar după liniștire, Sp O₂ ajunge la 80-82 %. Clinic sugarul prezintă suflu sistolic parasternal stg în focar pulmonar și suflu sistolic gr II sp IV parasternal stg, cu iradiere în roata. La spital, ECG relevă ritm sinusal regulat, 120 b/min, ax electric la 114 grade, deviație dreapta și hipertrofie ventriculară dreapta. Radiografia cardiopulmonară relevă circulație săracă și cord în sabot. Diagnosticul de suspiciune, în absența ecocardiografiei efectuate, ar trebui să fie:

- ☒ A) Tetralogie Fallot
- ☐ B) Stenoza de arteră pulmonară izolată
- ☐ C) Spasmul hohotului de plâns
- ☐ D) Cardiomiopatie restrictivă
- ☐ E) MCO necianogenă de tip defect septal interventricular

Următorul

SonicMaster

Întrebarea 26 din 50

Intoleranța secundară la dizaharide se caracterizează prin următoarele simptome:

- ☒ A) Scaunele sunt apoase, multiple, eliminate exploziv (4-10/z)
- ☒ B) Ph-ul scaunelor sub 5,5
- ☒ C) Sugarul prezintă frecvent eritem fesier
- ☐ D) Fără colici abdominale sau varsături
- ☐ E) Diareea prin intoleranță secundară la dizaharide se întâlnește doar ca urmare a bolii celiace și parazitozelor intestinale

Următoarea

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA A

Timp rămas: 0:59:02

Întrebarea 1 din 50

Tratamentul laringitei acute subglotice poate se face cu:

- ☒ A) Corticoterapie
- ☐ B) Antialergice
- ☐ C) Antibioterapie
- ☒ D) Adrenalina racemica - nebulizare/ aerosoli
- ☒ E) Oxigenoterapie

Urm

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA A

Timp rămas: 0:47:54

Bettina Isabella Anghelescu

Întrebarea 9 din 50

Ce sfaturi terapeutice ati da unui copil cu cardiomiopatie hipertrofica.

- ☐ A) Poate face orice tip de sport
- ☐ B) Evitarea oricărui efort fizic
- ☒ C) Evitarea sporturilor competitive
- ☐ D) Tratament cu alfa-blocante în doze mari
- ☒ E) Tratament cu beta-blocante în doze mari

Următoarea >

Întrebarea 1 din 50

*Copil în vârstă de 8 ani, fotbalist în echipa școlii acuză pe teren cefalee și vedere încetășată, după care cade fără să își piardă cunoștința. Medicul care îl consultă constată valori tensionale de 180/98 mmHg. Frecvența cardiacă a fost 120 b/min. Copilul prezintă suflu sistolic gr II sp II parasternal stg, nespecific, pulsuri radiate prezente, puls la artera femurală absent. Este solicitată ambulanță și trimis la spital unde valorile tensionale scad ușor, dar se mențin mari, 176/90 mmHg la membrele superioare și 140/70 mmHg la membrele inferioare. Consultul neurologic nu relevă modificări. Echografia abdominală în urgență nu relevă modificări renale. Provine din familie cu tată hipertensiv. Care credeți că este diagnosticul de suspiciune al copilului?

- ☐ A) Atac de panică cu tahicardie și hipertensiune
- ☐ B) Cardiomiopatie hipertrofică
- ☒ C) Coartată de aortă
- ☐ D) Tahicardie sinusală
- ☐ E) HTA esențială

Următoarea >

Întrebarea 2 din 50

*O fetita in varsta de 8 ani, cu greutate normala se intorneaza pentru pierdere nocturna de recent aparuta. Glicemia a jeun a fost de 120 mg/dl. Se efectueaza testul tolerantei la glucoza arata o glicemie la 2 ore de 210 mg/dl. Diagnosticul corect este:

- ☒ A) Scaderea tolerantei la glucoza
- ☐ B) Diabet zaharat tip I
- ☐ C) Diabet renal
- ☐ D) Diabet zaharat tip II
- ☐ E) Enurezis nocturn primar

Următoare

Întrebarea 4 din 50

Care din afirmatiile legate de boala Crohn de mai jos sunt adevarate?

- ☐ A) Cele mai frecvente simptome in boala Crohn sunt: crampe abdominale, tenesme, episoade de diaree cu sânge, mucus si puroi, fara leziuni perianale
- ☐ B) Copilul nu prezinta niciodata pancolita
- ☒ C) Boala este afectiunea cronica inflamatorie intestinala ce afecteaza orice segment al tubului digestiv
- ☒ D) Manifestarile clinice frecvent întâlnite în B. Crohn sunt: febra sau subfebrilitati, scadere ponderala, diaree cronica, dureri abdominale, leziuni perianale (fistule, fisuri)
- ☐ E) Inflamatiia din colita ulcerativa la copii este limitata la rect, sau se extinde cel mult la colonul distal

Următor

Timp rămas: 0:57:22

Întrebarea 2 din 50

Un sugar cu defect septal ventricular de mari dimensiuni prezinta clinie:

- ☒ A) Hepatomegalie
- ☒ B) Fatigabilitate la momentul alimentatiei
- ☒ C) Crestere ponderala deficitara
- ☐ D) Sufu diastolic intens
- ☒ E) Sufu sistolic rugos, ejectional, cu iradiere in spate de roata pe toata aria precordiala

ClassMarker

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA A

Timp rămas: 0:55:58

 Ionut Adrian Achim

Întrebarea 3 din 50

Tratamentul in anginele virale febrile se face cu:

- ☒ A) Paracetamol sau Ibuprofen
- ☐ B) Antiinflamator steroidian
- ☐ C) Claritromicina
- ☐ D) Antibiotic in functie de antibiograma
- ☒ E) Dezinfectante buco-faringiene

Următoarea 

Întrebarea 2 din 50

*O fetita in varsta de 8 ani, cu greutate normala se interneaza pentru pierdere nocturna de urina, recent aparuta. Glicemia a jeun a fost de 120 mg/dl. Se efectueaza testul tolerantei la glucoza care arata o glicemie la 2 ore de 210 mg/dl. Diagnosticul corect este:

- ☐ A) Diabet zaharat tip II
- ☐ B) Enurezis nocturn primar
- ☐ C) Scaderea tolerantei la glucoza
- ☒ D) Diabet zaharat tip I
- ☐ E) Diabet renal

Următoarea ►

Întrebarea 1 din 50

Prezența râurilor ronflante și sibilante la copil cu dispnee expiratorie sugerează diagnosticul de:

- ☒ A) Astm bronșic
- ☐ B) Pneumonie interstițială
- ☐ C) Pneumonie stafilococică
- ☐ D) Pneumonie streptococică
- ☒ E) Bronșiolită

Următoarea >

Întrebarea 1 din 50

În fața unui bolnav cu malnutriție următoarele date anamnestice sunt obligatorii pentru identificarea cauzei bolii:

- ☒ A) Date despre diversificare
- ☐ B) Varsta mamei la naștere
- ☐ C) Date despre vaccinare
- ☒ D) Prezența îmbolnăvirilor și/sau spitalizărilor repetate
- ☒ E) Tipul de alimentație

Următoarea ►

Întrebarea 2 din 50

*O fetiță în vârstă de 8 ani, cu greutate normală se întemează pentru pierdere nocturnă de recentă aparută. Glicemia a jeun a fost de 120 mg/dl. Se efectuează testul toleranței la glucoză arată o glicemie la 2 ore de 210 mg/dl. Diagnosticul corect este:

- ☒ A) Scaderea toleranței la glucoză
- ☐ B) Diabet zaharat tip I
- ☐ C) Diabet renal
- ☐ D) Diabet zaharat tip II
- ☐ E) Enurezis nocturn primar

Următoare

Întrebarea 3 din 50

Care din următoarele afirmații referitoare la markerii serologici din hepatita cronică cu VHB la sunt false?

- ☐ A) Anticorpul anti-HBc semnifică trecerea prin boală
- ☒ B) AgHBs reprezintă markerul cel mai sensibil al replicării virale
- ☒ C) Prezența AgHBe - implică o evoluție ușoară a bolii hepatice
- ☐ D) ADN VHB reprezintă markerul cel mai sensibil al replicării virale
- ☐ E) AgHBe - semnifică faza replicativă a infecției

Următoare

ClassMarker

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA A

Timp rămas: 0:55:08

Ionut Adrian Achim

Întrebarea 4 din 50

*Laringita acuta subglotica este sugerata de:

- ☐ A) Dispnee mixta, polipnee, geamat expirator, tiraj intercostal
- ☐ B) Disfagie marcata, trismus, sialoree, adenopatie latero-cervicala
- ☒ C) Dispnee inspiratorie, stridor inspirator, disfonie, tuse "latratoare", tiraj suprasternal
- ☐ D) Dispnee inspiratorie marcata cu instalarea rapida a insuficientei respiratorii severe, afonie, accentuarea dispneei in clinostatism
- ☐ E) Dispnee expiratorie, polipnee, wheezing, tiraj intercostal

Următoarea ▶

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA A

Timp rămas: 0:56:25

Bettina Isabella Anghelescu

Întrebarea 3 din 50

Criterii majore pentru diagnosticul reumatismului articular acut sunt:

- ☐ A) Antralgile, coreea, interval PR prelungit, eritem marginat
- ☐ B) Eritem marginat, noduli subcutanati, febră, artrita, probe inflamatorii mari
- ☒ C) Poliartrita migratorie, cardita, coreea, eritem marginat, noduli subcutanati
- ☐ D) Poliartrita migratorie, cardita, febră
- ☐ E) Poliartrita migratorie, CRP ridicat, eritem marginat, coreea, cardita

Urmasuarea +



REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

ClassMarker

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA A

Timp rămas: 0:54:20

Ionut Adrian Achim

Întrebarea 5 din 50

*Examenul clinic al unui baietel imediat dupa nastere, a evidentiat o vezica marita si rinichi palpabili. O cistografie a aratat o zona de obstructie si dilatare proximala a uretrei, ureterelor si rinichilor. In rest copilul nu mai prezinta aparent nicio anomalie, dar un jet urinar emis foarte slab. Care dintre urmatoarele este cel mai posibil diagnostic?

- ☒ A) Obstructie de jonctiune pieloureterala
- ☐ B) Sistem colector dublu
- ☐ C) Valva de uretra posterioara
- ☐ D) Sindromul nefrotic infantil
- ☐ E) Rinichi in potcoava

Urmatoarea ▶

Întrebarea 4 din 50

Glomerulonefritele poststreptococice la copil se prezinta majoritar:

- ☐ A) In timpul unei infectii cu streptococ grup A
- ☒ B) Cu fractiunea C3 scazuta
- ☒ C) Cu hematurie
- ☒ D) Cu modificarea ASLO
- ☒ E) Simptomele pot sa apara la 1-2 saptamani dupa scarlatina

Următoarea ►

Întrebarea 6 din 50

Tratamentul în anginele virale febrile se face cu:

- ☐ A) Antibiotic în funcție de antibiograma
- ☒ B) Dezinfectante buco-faringiene
- ☐ C) Claritromicina
- ☒ D) Paracetamol sau ibuprofen
- ☐ E) Antiinflamator steroidian

Următor

My SonicMaster

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA A

Timp rămas: 0:55:11

Bettina Isabella Anghelescu

Întrebarea 4 din 50

Alternativele terapeutice în absența bolii cu leziuni minime, dar cu recaderi frecvente ale sindromului nefrotic sunt:

- ☒ A) Ciclofosfamidă
- ☐ B) Azatioprină
- ☒ C) Ciclosporina (sau micofenolat mofetil)
- ☐ D) Isoniazidă
- ☐ E) Amfotericină

Următoarea >

Intrebarea 3 din 50

Care dintre urmatoarele afirmatii nu sunt adevarate:

- ☐ A) Cresterea incidentei obezitatii la copil este principala cauza a cresterii frecventei diabetului de tip II la varsta copilariei
- ☒ B) Copiii cu diabet zaharat nu au risc de a dezvolta microangiopatie diabetica.
- ☐ C) La majoritatea lor, diabetul este consecinta scaderii sau absentei secretiei de insulina
- ☒ D) HbA1c este indicat a se efectua doar la copiii cu diabet care asociaza si anemie
- ☐ E) Un pacient cu mucoviscidoza poate dezvolta diabet zaharat

Urmatoarea ►

Întrebarea 2 din 50

Sufiu sistolic de diverse grade poate fi decelat în următoarele malformații congenitale de cord:

- ☐ A) Stenoza aortică
- ☒ B) Foramen oval patent
- ☒ C) Defectul septal interventricular
- ☒ D) Canalul arterial persistent
- ☐ E) Stenoza de arteră pulmonară

[Următoarea >](#)

lenovo

Întrebarea 1 din 50

*Urmatoarele manifestari clinice sunt sugestive pentru laringita acuta subglotica

- ☐ A) Dispnee mixta, polipnee, geamat expirator, tiraj intercostal
- ☐ B) Distagie marcata, trismus, sialoree, adenopatie laterocervicala
- ☒ C) Debut brusc, dispnee inspiratorie, "tuse latratoare", tiraj suprasternal
- ☐ D) Dispnee inspiratorie marcata cu instalarea rapida a insuficientei respiratorii severe, cu accentuare in clinostatism, afonie
- ☐ E) Dispnee expiratorie, polipnee, wheezing, tiraj intercostal

Următoarea ▶

ClassMarker

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA A

Timp rămas: 0:52:54

Ionut Adrian Achim

Întrebarea 6 din 50

Urmatoarele afirmatii cu privire la rahitism sunt adevarate:

- ☐ A) Rahitismul carential este consecinta exclusiva a aportului necorespunzator de calciu
- ☒ B) Terapia cu calciu este indicata in toate cazurile de rahitism
- ☐ C) Primul trimestru de viata, leziunile rahitice apar preponderent la nivelul capului
- ☒ D) Bazele frontale si matenile condrocostale sunt semna de rahitism
- ☐ E) Profilaxia rahitismului cu vitamina D este indicata numai la sugarii eutrofici

Următoarea ▶

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA A

Timp rămas: 0:52:14

Întrebarea 7 din 50

Infectia urinara inalta la sugar se caracterizeaza prin:

- ☒ A) Urina tulbure, urat mirositoare
- ☐ B) Manevra Giordano pozitiva unilateral
- ☒ C) Febra, varsaturi, agitatie
- ☒ D) Urocultura din "punga-bag" cu peste 100.000 germeni/ mm3
- ☐ E) Absenta cilindrilor din sumarul de urina

Urm

_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA A

mp rămas: 0:57:41

 mustaf

Întrebarea 2 din 50

Care dintre următoarele afirmații nu sunt adevărate.

- ☐ A) Un pacient cu mucoviscidoză poate dezvolta diabet zaharat
- ☐ B) Creșterea incidenței obezității la copii este principală cauză a creșterii frecvenței diabetului de tip II la vârsta copilăriei
- ☐ C) HbA1c este indicat a se efectua doar la copii cu diabet care asociază și anemie
- ☒ D) La majoritatea lor, diabetul este consecință scăderii sau absenței secreției de insulină
- ☒ E) Copiii cu diabet zaharat nu au risc de a dezvolta microangiopatie diabetică

Următoarea ?

Întrebarea 5 din 50

*Examenul clinic al unui baietel imediat dupa nastere, a evidentiat o vezica marita si rinichi palpabili. O cistografie a aratat o zona de obstructie si dilatare proximala a uretrei, ureterelor si rinichilor. In rest copilul nu mai prezinta aparent nicio anomalie, dar un jet urinar emis foarte slab. Care dintre urmatoarele este cel mai posibil diagnostic?

- ☐ A) Sindromul nefrotic infantil
- ☐ B) Obstructie de jonctiune pieloureterala
- ☒ C) Valva de uretra posterioara
- ☐ D) Rinichi in potcoava
- ☐ E) Sistem colector dublu

Urmatoarea ►

Întrebarea 8 din 50

Boala diareică acută cu Rotavirus se caracterizează prin următoarele:

- ☒ A) Scaune apoase, frecvente
- ☐ B) Starea generală se menține bună în toate cazurile
- ☒ C) Febră, diaree, crampe abdominale
- ☐ D) Prezența de mucus și sange în scaun
- ☒ E) Diagnosticul pozitiv se stabilește prin determinarea antigenului fecal

Următorul

Întrebarea 6 din 50

*Un baiot in varsta de 10 ani, cu greutate normala se intemeaza pentru enurezis nocturn recent aparut. Probele hepatice si renale au fost normale. S-a efectuat testul tolerantei la glucoza care a aratat: glicemia a jeun a fost 120 mg% iar glicemia la 2 ore 240mg%. Diagnosticul corect este:

- ☐ A) Diabet renal
- ☐ B) Diabet zaharat tip II
- ☐ C) Enurezis nocturn primar
- ☐ D) Diabet zaharat tip I
- ☒ E) Scaderea tolerantei la glucoza

Următoarea ▶

Întrebarea 4 din 50

Alegeți afirmațiile corecte referitoare la tratamentul în talasemia majoră:

- ☒ A) Administrarea de chelatori de fier este indicată în toate cazurile
- ☒ B) Transplantul medular este singura cale de vindecare
- ☒ C) Se efectuează prin administrarea de concentrate eritocitare
- ☐ D) Transfuzia de masă eritocitară nu se administrează la valori ale Hb > 7g%
- ☒ E) Nivelul hemoglobinei trebuie menținut la valori > 10g%

Următoarea >

lenovo

Întrebarea 7 din 50

Semnele clinice de deshidratare la sugar sunt:

- ☒ A) Fontanela anterioara deprimata
- ☒ B) Oligurie
- ☒ C) Ochi infundati in orbite
- ☐ D) Fontanela bombata
- ☒ E) Pliu cutanat persistent

Urmatoarea ▶

Întrebarea 9 din 50

*Un sugar în vârstă de 7 luni, cu greutate normală la naștere, hrănit numai cu lapte de vacă. IP (indice ponderal) de 0,74 și la examenul clinic prezintă paloare și diminuarea țesutului subcutanat la nivelul trunchiului și membrelor. Testele de laborator arată ușoară anemie și hipoproteinemie. Cel mai probabil diagnostic este:

- ☐ A) Sindrom nefrotic
- ☐ B) Malnutriție globală gradul I cu anemie secundară
- ☒ C) Malnutriție globală gradul II cu anemie secundară
- ☐ D) Hipertiroidism
- ☐ E) Malnutriție proteică

Urmă

ClassMarker

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA A

Timp rămas: 0:50:35

Ionut Adrian Achim

Întrebarea 7 din 50

Diagnosticul de rinofaringita acuta este sugerat de urmatoarea simptomatologie:

- ☒ A) Rinoree apoasa sau obstructie nazala
- ☐ B) Tuse productiva
- ☐ C) Rinoree posterioara muco-purulenta
- ☒ D) Congestie faringiana
- ☒ E) Febra moderata

Urmatoarea ▶

Întrebarea 6 din 50

Purpura trombocitopenică se caracterizează prin:

- ☐ A) Hepato-splenomegalie
- ☐ B) Prezența elementelor purpurice doar la nivelul membrilor inferioare, cu dispoziție simetrică, bilaterală
- ☒ C) Prezența elementelor purpurice difuză
- ☐ D) Hemartroze aparute spontan
- ☒ E) Valori ale trombocitelor sub $100 \times 10^9/\text{mm}^3$

Următoarea >



REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

Întrebarea 10 din 50

Care din următoarele nu se încadrează în criteriile majore de reumatism articular acut:

- ☐ A) Coreea Sydenham
- ☐ B) Dovada infecției streptococice
- ☐ C) Cardita
- ☒ D) Febra
- ☒ E) Artrita

Următoarea

SonicMaster

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA A

Timp rămas: 0:49:37

Bettina Isabella Anghelescu

Întrebarea 7 din 50

Următoarele afirmații despre reumatismul articular acut nu sunt adevărate:

- ☐ A) Artrita nu are caracter saltant
- ☒ B) Artrita are caracter migrator și întotdeauna lasă sechele
- ☐ C) Corticoterapia este indicată în toate cazurile
- ☒ D) Salicilați sunt terapia de elecție
- ☒ E) Confirmarea infecției streptococice nu este obligatorie pentru diagnostic

Următoarea >

ClassMarker

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA A

Timp rămas: 0:46:50

 Ionut Adrian Achim

Întrebarea 9 din 50

Boala diareica acuta cu Rotavirus se caracterizeaza prin urmatoarele:

- ☐ A) Starea generala se mentine buna in toate cazurile
- ☐ B) Prezenta de mucus si sange in scaun
- ☒ C) Febra, diaree, crampe abdominale
- ☒ D) Diagnosticul pozitiv se stabileste prin determinarea antigenului fecal
- ☒ E) Scaune apoase, frecvente

Următoarea ▶

ClassMarker

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA A

Timp rămas: 0:48:49

Ionut Adrian Achim

Întrebarea 8 din 50

La un copil de 5 ani cu HIV ce prezinta un tablou de infectie respiratorie inferioara de 7 zile, cu evolutie brusca spre agravare, devenind dispneic si tahipneic, cu scaderea rapida a saturatiei de oxigen, care la imaginea radiografica prezinta aspect de geam mat, atitudinea este:

- ☒ A) Recoltam probe de sputa pentru examen citologic
- ☐ B) Suspectam o tuberculoza
- ☒ C) Administram rapid oxigen pe masca si anuntam terapia intensiva sa ne asiste
- ☐ D) Luam in considerare sa administram produs antimicrobian de tipul biseptol i.v.
- ☒ E) Suspectam o pneumocistoza

Următoarea ▶

Întrebarea 3 din 50

Angina acuta streptococica se caracterizeaza clinic prin:

- ☐ A) Stare generala relativ buna
- ☐ B) Depozite alb-cenusii la nivelul amigdalelor, sub forma de pseudomembrane
- ☒ C) Febra 39-40 grade Celsius
- ☒ D) Disfagie marcata
- ☒ E) Hiperemie intensa faringoamigdaliana cu delimitare neta la nivelul palatului

Următo

Întrebarea 8 din 50

Suflu sistolic de diverse grade poate fi decelat în următoarele malformații congenitale de cord:

- ☒ A) Defectul septal interventricular
- ☐ B) Foramen ovale patent
- ☐ C) Canalul arterial persistent
- ☒ D) Stenoza aortică
- ☒ E) Stenoza de artera pulmonară

Următoarea ►

Întrebarea 9 din 50

Imunodeficienta poate fi secundara.

- ☒ A) Infecției cu Salmonella
- ☐ B) Diabetului insipid
- ☐ C) Splenectomiei
- ☒ D) Infecției HIV
- ☒ E) Tratamentului citostatic

Următoarea ▶

Întrebarea 7 din 50

O fetita in varsta de 9 ani prezinta un nivel al ureei si creatininei ridicat. Pentru evaluarea insuficientei renale s-a efectuat clearance de creatinina. Creatinina a fost aleasa pentru acest test pentru ca este o substanta:

- ☒ A) Capabila de a acorda informatie despre reducerea RFG/GFR
- ☐ B) Dependenta de masa musculara si suprafata corporala
- ☒ C) Filtrata prin glomeruli
- ☒ D) Cu concentratie variabila in ser in functie de activitatea zilnica
- ☐ E) Reabsorbita de tubli renali

Următoarea ►

ClassMarker

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA A

Timp rămas: 0:44:00

👤 Ionut Adrian Achim

Întrebarea 10 din 50

*O fetita in varsta de 8 ani, cu greutate normala se interneaza pentru pierdere nocturna de urina, recent aparuta. Glicemia a jeun a fost de 120 mg/dl. Se efectueaza testul tolerantei la glucoza care arata o glicemie la 2 ore de 210 mg/dl. Diagnosticul corect este:

- ☒ A) Diabet zaharat tip I
- ☐ B) Diabet zaharat tip II
- ☐ C) Enurezis nocturn primar
- ☐ D) Diabet renal
- ☐ E) Scaderea tolerantei la glucoza

Următoarea ▶

Întrebarea 6 din 50

Ce sfaturi terapeutice ati da unui copil cu cardiomiopatie hipertrofica:

- ☐ A) Tratament cu alfa-blocante in doze mari
- ☐ B) Poate face orice tip de sport
- ☐ C) Evitarea oricarui efort fizic
- ☒ D) Tratament cu beta-blocante in doze mari
- ☒ E) Evitarea sporturilor competitive

Următo

Întrebarea 10 din 50

Pneumonia interstitiala se caracterizeaza prin:

- ☐ A) Opacitate triunghilara unilaterala, net delimitata, pe radiografia de torace
- ☐ B) Raluri subcrepitante in focar
- ☒ C) Interstitiu accentuat hilo-bazal cu aspect radiologic caracteristic "in plete de calugar"
- ☒ D) Stare generala influentata, febra, tuse seaca frecventa
- ☐ E) Probe inflamatorii pozitive

Următoarea >

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA A

Timp rămas: 0:44:23

Betina Isabela Anghelescu

Întrebarea 12 din 50

Consecințe care pot amenința viața copilului anuric sunt:

- ☒ A) Retenția de apă, cu HTA neresponsivă la tratamentul medicamentos
- ☒ B) Hiperpotasemia
- ☐ C) Dezechilibrul acido-bazic
- ☐ D) Hiponatremia
- ☐ E) Hipocalcemia

Următoarea >

pentru a căuta

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

ClassMarker

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA A

Timp rămas: 0:48:47

Întrebarea 8 din 50

Infectia urinara inalta la sugar se caracterizeaza prin:

- ☒ A) Urina tulbure, urat mirositoare
- ☐ B) Absenta cilindrilor din sumarul de urina
- ☐ C) Manevra Giordano pozitiva unilateral
- ☒ D) Febra, varsaturi, agitare
- ☒ E) Urocultura din "punga-bag" cu peste 100.000 germeni/mm³

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA A

Timp rămas: 0:47:58

Întrebarea 9 din 50

Diagnosticul de LAL este sugerat de:

- ☒ A) Hepato-splenomegalie
- ☒ B) Multiple adenopatii
- ☐ C) Dispnee inspiratorie
- ☐ D) Degete hipocratice
- ☒ E) Prezența de blasti atipici în formula leucocitară

ClassMarker

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA A

Timp rămas: 0:47:27

Întrebarea 10 din 50

Boala diareică acută cu Rotavirus se caracterizează prin următoarele:

- ☒ A) Scaune apoase, frecvente
- ☐ B) Starea generală se menține bună în toate cazurile
- ☒ C) Febră, diaree, crampe abdominale
- ☐ D) Prezența de mucus și sange în scaun
- ☒ E) Diagnosticul pozitiv se stabilește prin determinarea antigenului fecal

Întrebarea 8 din 50

Profilaxia endocarditei bacteriene se face:

- ☐ A) La pacienții cu malformații congenitale de cord cu excepția DSA
- ☒ B) În caz de proceduri la nivelul tractului respirator: consult ORL, bronhoscopie
- ☐ C) În caz de cadere a dinților de lapte
- ☐ D) În caz de explorare cardiologică prin ecografie transesofagiană
- ☒ E) La tratamente dentare sangerante la copii cu malformații congenitale

Următoarea >

lenovo

Întrebarea 14 din 50

Tratamentul în anginele virale febrile se face cu:

- ☐ A) Clantromicina
- ☐ B) Dezinfectante buco-faringiene
- ☒ C) Paracetamol sau Ibuprofen
- ☒ D) Antinfiamator steroidian
- ☐ E) Antibiotic în funcție de antibiogramă

Următoarea 

Întrebarea 14 din 50

Tratamentul în anginele virale febrile se face cu

- ☐ A) Clarithromidina
- ☒ B) Dezinfectante buco-faringiene
- ☒ C) Paracetamol sau ibuprofen
- ☐ D) Antiinflamator steroidian
- ☐ E) Antibiotic în funcție de antibiograma

Următoarea >



REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

Apăsați aici pentru a căuta

Întrebarea 10 din 50

Un sugar în vârstă de 8 luni, cu greutate normală la naștere, hrănit numai cu lapte de vacă are un IP de 0,72 și la examenul clinic prezintă paloare și diminuarea țesutului adipos la nivelul trunchiului și membrelor. Teste de laborator arată anemie și hipoproteinemie. Diagnosticul probabil e:

- ☐ A) Malnutriție gradul I
- ☒ B) Malnutriție gradul II cu anemie secundară
- ☐ C) Hepatită cronică
- ☐ D) Hipertiroidism
- ☐ E) Sindrom de deces respirator cronic

Următoarea >

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA A

Timp rămas: 0:46:19

Întrebarea 11 din 50

*Copil în vârstă de 8 ani, fotbalist în echipa școlii acuza pe teren cefalee și vedere încețoșată, care cade fără să își piardă cunoștința. Medicul care îl consultă constată valori tensiunii arteriale de 176/90 mmHg. Frecvența cardiacă a fost 120 b/min. Copilul prezintă suflu sistolic grad II sp. nespecific, pulsuri radiale prezente, puls la artera femurală absent. Este solicitat la spital unde valorile tensionale scad ușor, dar se mențin mari, 176/90 mmHg la membrele superioare și 140/70 mmHg la membrele inferioare. Consultul neurologic nu relevă modificări. Echografia abdominală în urgență nu releva modificări renale. Provine din familie cu hipertensiv. Care credeți că este diagnosticul de suspiciune al copilului?

- ☐ A) Atac de panică cu tahicardie și hipertensiune
- ☐ B) Cardiomiopatie hipertrofică
- ☐ C) Tahicardie sinusală
- ☒ D) Coartăție de aortă
- ☐ E) HTA esențială

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA A

Timp rămas: 0:41:16

 Ionuț-Constantin

Întrebarea 9 din 50

Tratamentul laringitei acute subglotice poate se face cu:

- ☐ A) Antialergice
- ☒ B) Adrenalina racemica - nebulizare/ aerosoli
- ☐ C) Antibioterapie
- ☒ D) Oxigenoterapie
- ☒ E) Corticoterapie

Următoare

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA A

Timp rămas: 0:35:35

 Ionuț-Constantin Andri

Întrebarea 15 din 50

Care din următoarele nu se încadrează în criteriile majore de reumatism articular acut:

- ☒ A) Dovada infecției streptococice
- ☐ B) Artrita
- ☐ C) Cardita
- ☒ D) Febra
- ☐ E) Coreea Sydenham

Următoarea >

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA A

Timp rămas: 0:33:21

Bettina Isabella Anghelescu

Întrebarea 19 din 50

Infectia urinară înaltă la sugar se caracterizează prin:

- ☒ A) Urină tulbură, urat mirositoare
- ☐ B) Manevra Giordano pozitivă unilateral
- ☒ C) Febră, varsături, agitație
- ☒ D) Urocultura din "punga-bag" cu peste 100.000 germeni/mm³
- ☐ E) Absența cilindrilor din sumarul de urină

Următoarea ►

pentru a căuta



REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

DELL

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA A

Timp rămas: 0:45:08

Întrebarea 13 din 50

*Care din următoarele defecte nu le întâlnim la o boală Fallot.

- ☐ A) Stenoza de arteră pulmonară
- ☐ B) Aorta dextropusă
- ☐ C) Stenoza aortică
- ☐ D) Defect septal ventricular
- ☒ E) Hipertrofie ventriculară dreaptă

Întrebarea 19 din 50

La domiciliu, un sugar de 7 luni are convulsii cu febra de 39 grade C ce se pot încadra în categoria celor febrile pentru ca:

- ☐ A) Episodul convulsiv a fost de durată și nu se oprește spontan
- ☒ B) Apar în context febril de peste 38 grade C
- ☒ C) Vârsta de apariție a convulsiilor febrile presupune un interval între 6 luni - 5 ani
- ☒ D) EEG-ul este normal între crize.
- ☐ E) Se datorează unei infecții a SNC

Următoarea >

lenovo

Întrebarea 16 din 50

"Un băiat în vârstă de 2 ani prezintă diaree cu striuri sanguinolente la scurt timp după o masă la un restaurant fast food. Câteva zile mai târziu dezvoltă paloare și fatigabilitate, fața este edematiată și mama afirmă că urinează foarte puțin. Examenele de laborator relevă hematocrit și trombocite scăzute și examen urinar cu eritrocite modificate structural. Care din următoarele diagnostice poate explica această simptomatologie?"

- ☐ A) GN poststreptococică
- ☐ B) Diverticulul Meckel
- ☐ C) Nefropatie urică
- ☐ D) Invaginație
- ☒ E) Sindromul hemolitic-uremic

Următoarea >

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA A

Timp rămas: 0:28:04

Bettina Isabella Anghelescu

Întrebarea 27 din 50

Bronsiolita acuta emfizematoasa este caracterizata clinic prin:

- ☒ A) Wheezing
- ☐ B) Disfonie
- ☐ C) Stridor
- ☐ D) Dispnee inspiratorie
- ☒ E) Dispnee expiratorie

Următoarea ▶



RO



REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA A

Timp rămas: 0:27:26

Bettina Isabella Anghelescu

Întrebarea 28 din 50

Ce simptome putem întâlni în criza hipoxică din boala Fallot:

- ☒ A) Accentuarea cianozei cu scăderea marcată a saturatelor arteriale de O₂
- ☐ B) Febră
- ☒ C) Agitație psiho-motorie marcată
- ☒ D) Tahicardie
- ☐ E) Convulsii febrile

Următoarea ▶



REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA A

Timp rămas: 0:21:20

Bettina Isabella Anghelescu

Întrebarea 34 din 50

*Urmatoarele manifestari clinice sunt sugestive pentru laringita acuta subglotica:

- ☐ A) Dispnee expiratorie, polipnee, wheezing, tiraj intercostal
- ☐ B) Dispnee mixta, polipnee, geamat expirator, tiraj intercostal
- ☒ C) Debut brusc, dispnee inspiratorie, "tuse latratoare", tiraj suprasternal
- ☐ D) Disfagie marcata, trismus, sialoree, adenopatie laterocervicala
- ☐ E) Dispnee inspiratorie marcata cu instalarea rapida a insuficientei respiratorii severe, cu accentuare in cianostatism, afonie

Următoarea ➤



REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

M_An_5_PEDIATRIE, AN V, MG, SERIA A

Timp rămas: 0 21:41

 Ionut-Constantin

Întrebarea 28 din 50

Laringita striduloasa se caracterizeaza prin urmatoarele :

- ☒ A) Examenul clinic obiectiv este negativ, fara demene de infectie de cai inferioare
- ☐ B) Anamneza pentru terenul atopic este de obicei negativa
- ☐ C) Simptomatologia se accentueaza la excitanti sonori
- ☒ D) Simptomatologia se poate repeta in noptile urmatoare
- ☒ E) Debut brutal nocturn, in afebrilitate

Urmatoarea

lenovo