

INSUFFISANCE HÉPATIQUE AIGÜE (IHA) CHEZ L'ENFANT

1. DÉFINITION

L'insuffisance hépatique aiguë (IHA) est une détérioration rapide de la fonction hépatique avec une coagulopathie ($\text{INR} \geq 1,5$) et une encéphalopathie hépatique en l'absence de maladie hépatique chronique préexistante.

2. ÉTIOLOGIES CHEZ L'ENFANT

- **Infections virales** : Hépatites A, B, C, D, E, CMV, EBV, HSV.
- **Toxiques** : Paracétamol, champignons, intoxications médicamenteuses.
- **Maladies métaboliques** : Maladie de Wilson, déficit en urocanil-coa synthétase, aciduries organiques.
- **Maladies auto-immunes** : Hépatite auto-immune.
- **Causes vasculaires** : Syndrome de Budd-Chiari, ischémie hépatique.

3. CLINIQUE

- **Signes généraux** : Asthénie, fièvre, troubles digestifs.
- **Signes hépatiques** : Ictère, hépatomégalie, douleur abdominale.
- **Signes de gravité** : Encéphalopathie hépatique (confusion, agitation, coma), hémorragies (troubles de la coagulation), insuffisance rénale associée.

4. DIAGNOSTIC

- **Bilan biologique** : Transaminases élevées (ASAT/ALAT), TP bas, $\text{INR} \geq 1,5$, bilirubine augmentée, ammoniémie élevée.
- **Examens virologiques** : Sérologies hépatites virales, PCR HSV, EBV, CMV.
- **Bilan métabolique** : Cuprémie/céruloplasmine (Wilson), ammoniémie, lactates.
- **Imagerie** : Échographie hépatique avec Doppler.
- **Biopsie hépatique** : Parfois nécessaire si étiologie incertaine.

5. PRISE EN CHARGE

- **Soins intensifs** : Surveillance des fonctions vitales, prévention de l'œdème cérébral.
- **Traitement étiologique** :
 - Acétylcystéine pour intoxication au paracétamol.
 - Antiviraux si infection virale (HSV, HBV).
 - Traitement spécifique des maladies métaboliques.
- **Support symptomatique** :
 - Correction des troubles hydro-électrolytiques et de la glycémie.
 - Administration de plasma frais congelé si hémorragies.
- **Transplantation hépatique** : Indiquée en cas d'échec du traitement médical (score de King's College, encéphalopathie sévère, acidose lactique persistante).

6. PRONOSTIC ET PRÉVENTION

- Pronostic variable selon l'étiologie et la rapidité de la prise en charge.
- Prévention par la vaccination contre les hépatites, l'éducation sur les toxiques hépatiques et la surveillance des enfants à risque.