

Question 43 de 50

Dans le cas de l'hyperparathyroïdie, les radiographies peuvent révéler :

- ☐ A) cardiomégalie
- ☐ B) hypertransparence
- ☒ C) résorption osseuse
- ☐ D) ostéosclérose
- ☐ E) des géodes

BCE p.90

Question 50

l'insuffisance surrénalienne secondaire:

- ☐ A) est caractérisée par hyponatremie importante
- ☐ B) est caractérisée par aldostérone basse
- ☐ C) a comme signe clinique la melanodermie
- ☐ D) a comme signe biologique l'hyperkaliémie
- ☐ E) est causée par le déficit de l'ACTH et l'atrophie des surrénales

AE

2021_MFR_An5_Endocrinologie

⌚ Temps restant: 0:15:26

Question 49 de 50

Ces médicaments inhibent la conversion périphérique du T4 en T3.

- ☒ A) les bêtabloquants
- ☐ B) la solution de Lugol
- ☒ C) les glucocorticoïdes
- ☒ D) les antithyroïdiens de synthèse
- ☒ E) le Propylthiouracil

ACDE

Question 22 de 50

Le traitement medical de l'hyperprolactinémie comprend:

- ☐ A) Sandostatin
- ☒ B) Bromocriptine
- ☒ C) Parlodel
- ☐ D) Minirin
- ☒ E) Cabergoline

BCE

Question 42 de 50

Les endocrinopathies qui peuvent produire hypercalcémie sont:

- ☒ A) l'hypothyroïdie
- ☐ B) le syndrome de Cushing
- ☐ C) l'insuffisance surrénalienne
- ☐ D) le pheochromocytome
- ☐ E) l'hyperthyroïdie

CDE

2021_MFR_An5_Endocrinologie

⌚ Temps restant: 0:45:52

Question 15 de 50

La polydipsie primaire est caractérisée, après la restriction hydrique, par :

- ☒ A) osmolarité plasmatique sans changement
- ☐ B) natrémie élevée
- ☐ C) ADH bas
- ☒ D) osmolarité urinaire élevée
- ☒ E) ADH élevée

ADE p.39

Question 44 de 50

Un patient de 43 ans diagnostiqué avec un craniopharyngiome, pour lequel une opération transphénoïdale a été réalisée, présente une asthénie, une hypotension et un syndrome polyuro-polydipsique. Lesquelles des investigations suivantes sont utiles pour élucider le diagnostic?

- ☒ A) IRM hypophysaire
- ☒ B) Détermination de l'osmolarité plasmatique et urinaire / 24h
- ☐ C) Détermination de la PTH
- ☐ D) Détermination de l'âge osseux
- ☒ E) Détermination des trophes hypophysaires et des hormones périphériques

Suivant ►

ABE

Question 48 de 50

Le système renine angiotensine:

- ☐ A) contrôle la production du cortisol
- ☒ B) contrôle la production d'aldostérone
- ☒ C) contrôle la sécrétion des hormones minéralo- corticoïdes
- ☒ D) interviennent dans le contrôle de la zone glomérulaire des corticosurrénales
- ☐ E) est produit dans la glande surrénale

BCD

2021_MFR_An5_Endocrinologie

⌚ Temps restant: 0:35:03

Question 27 de 50

Les causes d'hypothyroïdie du nouveau-né sont :

- ☒ A) l'agenésie thyroïdienne
- ☐ B) la sarcoidose
- ☒ C) les troubles congénitaux de l'hormonogénèse
- ☐ D) la thyroïdite de Riedel
- ☒ E) les carences iodées

ACE

Question 47 de 50

*La cause la plus fréquente de la forme ACTH indépendante du syndrome de Cushing

- ☐ A) l'hyperplasie micronodulaire pigmentaire
- ☒ B) la corticothérapie
- ☐ C) l'adénome
- ☐ D) l'hyperplasie macronodulaire bilatérale
- ☐ E) le corticosurrénalome

Suiva

B

⌚ Temps restant: 0:47:08

👤 OUMAI

Question 13 de 50

*La froideur cutanée est le signe clinique de:

- ☐ A) l'hypothyroïdie
- ☐ B) l'insuffisance antéhypophysaire
- ☐ C) le syndrome de Cushing
- ☐ D) la maladie d'Addison
- ☐ E) l'insuffisance surrénalienne aiguë

A

2021_MFR_An5_Endocrinologie

⌚ Temps restant: 0:41:31

👤 Ran

Question 21 de 50

La patiente de 59 ans, diagnostiquée avec une insuffisance antéro-hypophysaire, est hospitalisée dans notre clinique pour asthénie marquée, œdème des paupières, pâleur, hypotension, absence de poils axillaires-pubiens. L'établissement d'un traitement d'urgence implique l'administration de :

- ☐ A) mineralocorticoïdes et glucocorticoïdes
- ☐ B) desmopressine
- ☒ C) hormones thyroïdiennes
- ☐ D) estro-progestatif
- ☒ E) glucocorticoïdes

CE

Suivant

2021_MFR_An5_Endocrinologie

⌚ Temps restant: 0:26:22

Question 40 de 50

La neurohypophyse contient:

- ☒ A) la vasopressine
- ☒ B) l'ocytocine
- ☐ C) la prolactine
- ☒ D) l'hormone antidiurétique
- ☐ E) l'hormone de croissance

ABD

Question 19 de 50

Les signes cliniques suivants: douleur dans la region cervicale anterieure, fièvre, transpiration, pouls accelere accompagne de changements hormonaux: TSH = 0,1 μ UI / ml (0,4-4,6), FT4 = 22,4 (10-22,2), chez un patient age de 38 ans ans souleve la suspicion de:

- ☐ A) maladie de Basedow
- ☐ B) myxoedeme auto-immune
- ☐ C) cancer de la thyroide
- ☐ D) thyroidite subaigue
- ☐ E) insuffisance hypophysaire thyreotrope

D

2021_MFR_An5_Endocrinologie

⌚ Temps restant: 0:42:17

Question 20 de 50

Le traitement de l'hyperparathyroïdie secondaire comprend:

- ☒ A) l'apport des dérivés actifs de la vitamine D
- ☒ B) la réduction parathyroïdienne
- ☐ C) la chélation intestinale de l'hyperphosphorémie avec gluconate de calcium
- ☒ D) l'apport de calcium (carbonate de calcium)
- ☐ E) l'augmentation des apports protéiques

ABCD

Suiv

Question 49 de 50

L'iode radioactif a comme indications le traitement de:

- ☐ A) la maladie de Basedow
- ☐ B) la crise aigue thyreotoxique
- ☐ C) l'hyperthyroidie iode-induites
- ☐ D) l'adenome toxique
- ☐ E) la goitre multiheteronodulaire toxique

ADE

Question 10 de 50

Le traitement de la crise aiguë thyrotoxique comporte :

- ☒ A) des anticoagulants
- ☒ B) rehydratation
- ☒ C) des sédatifs
- ☐ D) levothyroxine à forte dose
- ☒ E) des bêtabloquants

ABCE

⌚ Temps restant: 0:08:54

Question 44 de 50

L'hyperthyroïdie iode-induite est produite par:

- ☐ A) le Metoclopramide
- ☐ B) l'Amiodarone
- ☐ C) les neuroleptiques
- ☐ D) les opiaces
- ☐ E) les produits de contraste de radiologie

BE

Question 42 de 50

*Le diagnostic de laboratoire et paraclinique du diabète insipide inclut une des explorations suivantes:

- ☐ A) La scintigraphie hypophysaire
- ☐ B) Le cathétérisme des sinus pétreux
- ☐ C) Le test de suppression avec glucose
- ☐ D) La scintigraphie osseuse
- ☐ E) Le test de restriction hydrique

E

Suivant ▶

Question 45 de 50

L'hyperkaliémie peut être causée par :

- ☒ A) l'insuffisance surrénalienne primitive
- ☐ B) le syndrome de Cushing
- ☒ C) l'insuffisance surrénalienne aiguë de la maladie d'Addison
- ☐ D) la corticothérapie
- ☐ E) l'insuffisance surrénalienne secondaire

AC

Question 39 de 50

Les crises convulsives peuvent survenir dans les cas suivants:

- ☐ A) la maladie d'Addison
- ☐ B) l'hypercalcémie
- ☐ C) l'hyperthyroïdie
- ☐ D) hypocalcémie
- ☐ E) le syndrome tumoral hypophysaire

ADE

⌚ Temps restant: 0:14:09

Question 47 de 50

*Le suivant n'est pas facteur de risque pour l'osteoporose:

- ☐ A) l'immobilisation
- ☐ B) l'obesite
- ☐ C) le tabagisme
- ☐ D) l'abus d'alcool
- ☐ E) l'indice de masse corporelle bas

B

⌚ Temps restant: 0:28:15

Question 36 de 50

Comme traitement medical de l'acromegalie on peut administre:

- ☐ A) L'octreotide
- ☐ B) Radiotherapie hypophysaire
- ☐ C) Insuline
- ☐ D) Pegvisomant
- ☐ E) Glucagon

ACD