VOLCANO-CA-MC: DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Prawdziwy teren i odtwarzanie erupcji

Bartosz Pajda

Wygenerowano: 22.10.2026

Prawdziwe wulkany (Etna, Wezuwiusz) i odtwarzanie erupcji krok po kroku. Dwie rzeczy:

- **A. Presety z prawdziwym terenem**: mapy wysokości Etny i Wezuwiusza pobrane z publicznego zbioru danych wysokościowych, kratery w zadanych miejscach (`vents.placement = "positions"`), wybór kraterów kliknięciem na mapie w GUI.
- **B. Odtwarzanie erupcji**: suwak czasu „krok 0 … ostatni krok", Odtwórz/Pauza i prędkość w podglądzie 2D i 3D, eksport klatek PNG (ZIP) i filmu WebM; odtwarzanie krystalizacji MC z migawek.

> **Zastrzeżenie.** Model **nie jest skalibrowany fizycznie**. To automat komórkowy „rozrostu ziaren" z regułami grawitacji i stygnięcia (`engine/src/ca/CaRules.hpp`) uruchomiony na prawdziwym terenie: **symulacja, nie prognoza**. Parametry lawy dobrano tak, żeby obraz był czytelny i czas obliczeń krótki, a nie z własności lawy Etny czy Wezuwiusza; zasięgi i czasy kroków nie odpowiadają prawdziwym kilometrom ani godzinom. Erupcja boczna Etny jest **inspirowana** erupcją z 2001 r. (położenie szczeliny), a nie jej odtworzeniem.

Reguły CA i MC nie zmieniły się: wyniki wszystkich wcześniejszych configów (`test_2d`, `lava_mc_2d`, `mc_full_2d`, `classic_ref`, `test_3d`, `heightmap_*`, `lava_mc_3d`, `mc_full_3d`) są bitowo identyczne z wynikami silnika sprzed tych zmian (`cmp` plików `ca_result.*`, `mc_result.*`, `stats.json`, `mc_stats.csv`), GCC i MSVC dają te same pliki, a czasy CA/MC w teście A/B (punkt 7) są takie jak przed zmianami.

1. Skąd dane

Źródło	**AWS Terrain Tiles** (Tilezen / Mapzen „Terrain Tiles"): publiczny zasób S3, bez klucza i logowania
Format	kafelki **Terrarium PNG** 256×256, Web Mercator (schemat „slippy map" z/x/y): `https://s3.amazonaws.com/elevation-tiles-prod/terrarium/{z}/{x}/{y}.png`
Dekodowanie	wysokość [m] = R·256 + G + B/256 − 32768 (dokładność 1/256 m; morze: 0 albo ujemne z ETOPO1)
Dane pod spodem	na lądzie przy zoomie 10–15 głównie **SRTM** (30 m), w Europie także **EU-DEM**; oceany: ETOPO1 (dokumentacja `tilezen/joerd`, `docs/data-sources.md`)
Licencja / przypisanie	dane są otwarte, ale wymagane jest przypisanie wg `tilezen/joerd`, `docs/attribution.md`; pełny tekst w `configs/heightmaps/README.md` (wzmianka i odnośnik w `README.md`); w metadanych każdej mapy (`<nazwa>.json`, pole `source.attribution`)
Data pobrania	2026-10-13 (`fetched` w metadanych)

Wymagane przypisanie (skrót; dla naszych obszarów istotne: *Europe … EU-DEM* oraz *SRTM … U.S. Geological Survey*):

```
* ArcticDEM terrain data DEM(s) were created from DigitalGlobe, Inc., imagery and funded
under National Science
  Foundation awards 1043681, 1559691, and 1542736;
* Australia terrain data © Commonwealth of Australia (Geoscience Australia) 2017;
* Austria terrain data © offene Daten Österreichs – Digitales Geländemodell (DGM) Österreich;
* Canada terrain data contains information licensed under the Open Government Licence –
Canada;
* Europe terrain data produced using Copernicus data and information funded by the European
Union - EU-DEM layers;
* Global ETOPO1 terrain data U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration
* Mexico terrain data source: INEGI, Continental relief, 2016;
* New Zealand terrain data Copyright 2011 Crown copyright (c) Land Information New Zealand
and the New Zealand
  Government (All rights reserved);
* Norway terrain data © Kartverket;
* United Kingdom terrain data © Environment Agency copyright and/or database right 2015. All
rights reserved;
* United States 3DEP (formerly NED) and global GMTED2010 and SRTM terrain data courtesy of
the U.S. Geological Survey.
```

2. Jak pobrano: `tools/fetch_dem.py`

```
python tools\fetch_dem.py --name etna --bbox 37.58 14.80 37.92 15.22 --zoom 11 --nx 160 --ny
160 --nz 70 --description "Etna (Sycylia)"
python tools\fetch_dem.py --name wezuwiusz --bbox 40.77 14.36 40.87 14.49 --zoom 12 --nx 140
```

```
--ny 140 --nz 50 --description "Wezuwiusz z Monte Somma (Kampania)"
python tools\fetch_dem.py ... --from-cache      # bez internetu, z kafelków w
tools\.dem_cache\ (poza repozytorium)
```

Kroki skryptu:


1. **bbox → kafelki.** Narożniki (szer., dł.) → globalne współrzędne piksela Web Mercator przy danym zoomie (`latlon_to_pixel`), zakres kafelków z marginesem 2 pikseli (`tile_range`); pobranie (`urllib`, 3 próby, cache `tools/.dem_cache/terrarium/z/x/y.png`), dekodowanie Terrarium (`decode_terrarium`), mozaika.
2. **Przepróbkowanie do siatki nx × ny.** Środek komórki (x, y) → (szer., dł.) **liniowo w bbox**: x = 0 to zachód, **y = 0 to południe, y = ny − 1 to północ** (ta sama konwencja co import obrazów w `gui/heightmap.py` i rzut z góry w podglądzie 2D); → piksel mozaiki → **interpolacja dwuliniowa** (`bilinear`). Gdy na komórkę przypada > 1,5 piksela kafelka, mozaika jest najpierw wygładzana (3 przebiegi filtra pudełkowego ≈ filtr Gaussa o szerokości ~komórki): komórka niesie średnią swojego terenu zamiast przypadkowego piksela (bez aliasingu).
3. **Skala pionowa.** Poziom odniesienia = max(0, minimum obszaru); gdy w kadrze jest morze, poziom morza (dno morza → 0); najwyższy punkt → **0,85·nz** komórek (`--peak`). Komórki = (wysokość − poziom) / (m na komórkę), zaokrąglone do 0,01 (silnik bierze `ceil`).
4. **Zapis** do `configs/heightmaps/` (małe pliki, do repozytorium): `<nazwa>.csv` (format silnika: ny wierszy × nx wartości), `<nazwa>.png` (podgląd w odcieniach szarości, północ u góry), `<nazwa>.json` (bbox, zoom, kafelki, źródło i przypisanie, data pobrania, m/komórkę w poziomie X/Y i w pionie, przewyższenie, min/max/średnia wysokość, położenie szczytu, wzór komórka ↔ szer./dł.).

Pomocniczo **`tools/latlon_to_grid.py`**: (szer., dł.) → kolumna (x, y) + wysokość + okno wysokości wokół + lokalne zagłębienia (do weryfikacji kraterów); `--cell X Y` odwrotnie. Wzór: `x = floor((dł - W)/(E - W)·nx)`, `y = floor((szer - S)/(N - S)·ny)`; punkt na granicy komórek należy do komórki na E/N.

Wynik pobrania

	Etna	Wezuwiusz
bbox (S, W, N, E)	37,58; 14,80; 37,92; 15,22 (bez zmian)	40,77; 14,36; 40,87; 14,49 (bez zmian)
zoom, kafelki	11: 12 kafelków (x 1108–1110, y 790–793)	12: 6 kafelków (x 2211–2212, y 1537–1539)
piksel kafelka	60 m (3,8 piksela na komórkę)	29 m (2,7 piksela na komórkę)
siatka	160 × 160 × 70	140 × 140 × 50
obszar	37,0 × 37,7 km	11,0 × 11,1 km
m/komórkę poziomo (X × Y)	231,3 × 235,9 (średnio 233,6)	78,3 × 79,3 (średnio 78,8)
m/komórkę pionowo	55,1	29,1
przewyższenie	×4,24	×2,71
wysokość min–max	0 (morze) – 3276 m	0 (morze) – 1235 m
najwyższa komórka	x = 74, y = 82 (37,7553 N, 14,9956 E), Krater Płn.-Wsch.	x = 75, y = 73 (40,8225 N, 14,4301 E), krawędź krateru

Szczyty wyszły niżej niż w rzeczywistości (Etna ~3350 m, Wezuwiusz 1281 m), bo komórka to średnia z ~230 m (Etna) i ~80 m (Wezuwiusz): wygładzenie ścina wierzchołki. **Kadr sprawdzony** na cieniowanej mapie z poziomicami (panel „Kratery na mapie” niżej: Etna i Wezuwiusz): oba wulkany są w środku i w całości, zadany bbox nie wymagał poprawek. Na Etnie widać na wschód od szczytu **Valle del Bove** (kotlina ze stromą ścianą zachodnią, dno ~1500–1850 m, x ≈ 86–100, y ≈ 62–90), morze w pasie wschodnim; na Wezuwiuszu Gran Cono z kraterem (zagłębienie ~200 m), łuk **Monte Somma** na północy (grzbiet 900–1060 m, y ≈ 87–95) i dolina między nimi (Atrio del Cavallo / Valle del Gigante, ~700–870 m), morze w narożniku SW.




3. Kratery w zadanych miejscach: `vents.placement = "positions"`


Nowe w configu: `"vents": { "placement": "positions", "positions": [[x, y], ...], "count": N }`. Krater = pierwsza komórka powietrza nad terenem w kolumnie (x, y), `flowId` = numer na liście (1, 2, …). Domyślnie lista jest pusta i `placement = "crater"`; stare configi działają bitowo tak samo (sprawdzają to testy i `cmp`).

Walidacja (`Config::fromJson`, komunikaty po polsku z nazwą parametru; GUI podświetla pole): - lista par liczb całkowitych `[x, y]`, `0 ≤ x < nx`, `0 ≤ y < ny`, bez powtórzeń kolumny; - przy `placement = "positions"` lista niepusta i **`vents.count` musi być równe długości listy** (wybór: jawna zgodność obu pól zamiast liczenia `count` z listy, bo pomyłka w jednym z pól nie przejdzie po cichu; GUI ustawia `count` samo przy każdym kliknięciu na mapie); - kolumna w całości ze skały (wysokość terenu ≥ nz) → błąd przy rozmieszczaniu (`VentPlacer::placeAt`); - lista przy `crater` / `random` → ostrzeżenie (ignorowana); `positions` w trybie `classic` → ostrzeżenie (zarodki losowe).

Lista **nie jest polem struktury `Config`**; zwraca ją `Config::ventColumns()` (czyta zwalidowany `effective`), a kratery rozmieszcza `VentPlacer::placeAt` wołane z `Simulation::buildVents`. Powód jest wydajnościowy, nie funkcjonalny: punkt 7.

GUI: „Kratery na mapie” (zakładka *Nowa symulacja*, panel pojawia się przy `placement = positions`): mapa wysokości (kolory hipsometryczne + cieniowanie ze światłem z NW + poziomice co „ładny” krok: 250 m na Etnie, 100 m na Wezuwiuszu; morze na niebiesko), **kliknięcie dodaje krater, kliknięcie na znaczniku usuwa**, *Cofnij ostatni*, *Wyczyść*; lista kraterów z wysokością w metrach i szer./dł.; pod kursorem: kolumna, wysokość terenu (komórki i m n.p.m.) i **szerokość / długość geograficzna** (dla map z metadanymi `<nazwa>.json`). Teren ze stożka pokazany w przybliżeniu (wzór generatora bez szumu), przekrój 2D (ny = 1) jako profil. Pole `vents.positions` w formularzu to tekst JSON (można też wpisać ręcznie).





4. Presety i położenia kraterów

Preset	Kratery [x, y]	Skąd i jak sprawdzone
`etna_real`	Voragine **[73, 80]** (37,7511 N 14,9929 E, 3251 m), Krater Płn.-Wsch. **[74, 82]** (37,7553 N 14,9956 E, 3276 m), Krater Płd.-Wsch. **[76, 78]** (37,7468 N 15,0008 E, 3131 m)	przybliżone współrzędne kraterów (Voragine ~37,751 N 14,993 E; NE ~37,754 N 14,994 E; SE ~37,747 N 15,000 E) → `latlon_to_grid.py`. Przy 234 m/komórkę **zagłębień kraterów nie widać**: szczyt to płaskowyż 3200–3276 m, kratery zlewają się w 2–3 sąsiednie komórki. NE: zadany punkt wypada w rogu komórki [73, 81], obok **najwyższej komórki mapy [74, 82]**, więc wzięta ona (NE to najwyższy krater Etny). SE: zadana komórka leży na wschodnim zboczu stożka SE (3131 m; jego wierzchołek [75, 79] ma 3222 m)
`etna_real_bocznа`	szczelina N–S: **[74, 60]** 2174 m, **[75, 62]** 2290 m, **[76, 64]** 2481 m (37,709–37,717 N, 14,996–15,001 E)	rejon szczeliny 37,71–37,72 N, 14,99–15,01 E, 2100–2700 m; trzy kratery wzdłuż spadku stoku, **inspirowane** erupcją z 2001 r.

Preset	Kratery [x, y]	Skąd i jak sprawdzone
`wezuwiusz_real`	**[71, 71]** (40,8211 N 14,4264 E, 1025 m)	krater ~40,821 N 14,426 E → `latlon_to_grid.py --window 5`: kolumna leży **na dnie zagłębienia** (lokalne minima [72, 70] 1018 m i [70, 71] 1023 m, krawędź 1180–1235 m, najniższy odcinek krawędzi na SW/W ~1075–1100 m)

```
python tools\latlon_to_grid.py etna 37.751 14.993 37.754 14.994 37.747 15.000 --window 3
python tools\latlon_to_grid.py wezuwiusz 40.821 14.426 --window 5
```

Parametry lawy (oba presety Etny: te same; `neighborhood = moore`, `ponding = true`, `eruptTemp = 1200`, `solidusTemp = 800`, `eruptionSteps = 150`, `coolingAmbient = 3`):

Preset	`coolingFall`	`coolingLateral`	kroki (koniec)	lawa [komórki]	zasięg maks.	czas CA*
`etna_real`	4	80	284 (brak płynnej lawy)	4402	46 komórek ≈ **10,8 km**	**~20 s**
`etna_real_boczna`	4	80	284 (brak płynnej lawy)	2347	39 komórek ≈ **9,0 km**	**~20 s**
`wezuwiusz_real`	1,3	27	128 (brak zmian w kroku)	2470	44 komórki ≈ **3,5 km**	**~5 s**

* MSVC Release, i9-13900HX, bez przypięcia, przy obciążonym tle (`WmiPrvSE` ~3 rdzenie); założony limit ≤ ~30 s spełniony.

Dla Wezuwiusza koszty stygnięcia „na komórkę" są ~1/3 wartości Etny, bo komórka jest ~3 razy mniejsza (79 m zamiast 234 m). Wezuwiusz kończy po 128 krokach regułą „brak zmian": wypełniony bazaltem krater zasypuje własny komin (płynny zostaje tylko krater o stałej `eruptTemp`), a lawa żyje (1200 − 800)/3 ≈ 133 kroki od przybycia.

Jak dobrano parametry (Etna, erupcja szczytowa, 160×160×70)


Wariant	sąsiedztwo	fall	lateral	inne	kroki	zasięg	czas	obraz
a	Moore	12	16		284	7,9 km	18 s	zwarte płaty wokół szczytu
b	Moore	4	30		284	14,8 km	20 s	szerokie wachlarze w dół stoku
d	Moore	3	50		284	13,1 km	20 s	wachlarze, palce na brzegach
f (wybrany)	**Moore**	**4**	**80**		284	**10,8 km**	**19 s**	**najwęższe, palczaste płaty; lob w Valle del Bove**
vn2	von Neumann	4	25		130	3,3 km	3 s	„romb", kula w metryce taksówkowej
vn5	von Neumann	0,5	6		141	14,7 km	3 s	duży romb, ignoruje rzeźbę
pent	pentagonal	3	50		284	11,4 km	23 s	jak Moore, mniej regularnie
z100	Moore	3	30	nz = 100	284	15,0 km	26 s	szerokie płaty
z140	Moore	2	30	nz = 140	284	5,6 km	36 s (> 30 s)	krótkie płaty


Wniosek: **przy tej rozdzielczości lawa tworzy płaty w kierunku spadku, a nie wąskie jęzory**; to cecha reguł, których nie zmieniamy: 1. *Model wzrostu bez zachowania masy*: każda komórka lawy jest nowym „źródłem", więc front obejmuje wszystko, co osiągalne w budżecie temperatury (1200 − 800 °C) od kraterów (`docs/architektura.md`, pytanie o dobór parametrów). 2. *Spływ po skosie przy spadku D = 1* (sąsiedztwo Moore'a) idzie do **wszystkich** niższych sąsiadów z podparciem, z każdym stopniem w dół płat poszerza się o ±1 komórkę (wachlarz ~90°). Wybór tylko kierunku największego spadku działa dopiero przy D ≥ 2 (lawa „przelewa się nad krawędź"), a na płaskich stopniach (D = 0) lawa rozlewa się wszędzie. 3. *Teren skwantowany do komórek*: 55 m w pionie przy 234 m w poziomie; stoki Etny 10–15° to schody o stopniach ~0,75–1 komórki, więc lawa jest prawie zawsze w reżimie D = 0 / D = 1. Doliny (barrancos) Etny są płytsze niż jedna komórka pionowa; jedyne doliny „widoczne" dla modelu to duże formy: Valle del Bove i dolina między Wezuwiuszem a Sommą.

Dlatego wybrano **drogie rozlewanie po płaskim (80 °C) i tani spływ w dół (4 °C)**: lawa biegnie po stromych stokach, a zatrzymuje się, gdzie teren łagodnieje (≤ 5 ruchów „w bok" na ścieżkę). Von Neumann (bez spływu po skosie) daje sztuczne romby, a wyższa rozdzielczość pionowa (nz = 100–140) nie poprawia kształtu, za to wydłuża obliczenia ponad limit.

5. Wyniki i obserwacje


Etna: erupcja szczytowa (`etna_real`)






- Kolory kraterów: na widoku z góry (`tools/plot_slice.py`, stara paleta) Voragine: niebieski, NE: pomarańczowy, SE: zielony; na zrzucie 3D z GUI (nowa paleta, dokument „Wygląd interfejsu”) Voragine: pomarańczowy, NE: niebieski, SE: jasnoniebieski.
- **Krater SE**: 1255 kolumn, głównie na **S i SW** (do y = 37, ~10 km, do ~1000 m n.p.m.) oraz wąski lob na **E**, po zachodniej ścianie Valle del Bove; **Krater NE**: 712 kolumn na **N i NW** (do y = 117, ~8 km, ~1150 m) i lob na NE nad Valle del Bove; **Voragine**: mały płat między nimi (otoczony lawą sąsiadów).
- **Valle del Bove:** lawa obu kraterów wchodzi na **górną, zachodnią ścianę kotliny** (26 kolumn w rejonie x ≥ 86, 58 ≤ y < 90, teren 2050–2460 m, do ~3 km na E od krateru SE), ale **nie dochodzi do dna** (~1500–1850 m); kończy się budżet temperatury na stromej ścianie (każdy poziom spadku i każdy ruch w bok kosztuje). Kierunek jest sensowny (z SE krateru lawa w rzeczywistości często wpływa do Valle del Bove), ale model zatrzymuje ją wcześniej.
- Ogólnie kierunki zgadzają się z rzeźbą: lawa schodzi radialnie po stożku tam, gdzie stok jest najdłuższy (S, N), omija zachodnie zbocza o łagodniejszym spadku i zatrzymuje się u podnóża stożka szczytowego / na pierwszych wypłaszczeniach (1000–1200 m).

Etna: erupcja boczna (`etna_real_boczna`, inspirowana 2001 r.)







Lawa ze szczeliny spływa **na S i SE** po południowym stoku (1181 kolumn, y 34–67, nic na północ od szczeliny poza kilkoma komórkami przy górnym kraterze), najdalej z najniższego krateru (2174 m): ~6 km na S, do ~870 m n.p.m. W 2001 r. najdłuższy potok z krateru na ~2100 m doszedł na S do wysokości

ok. 1000 m (kilka km nad Nicolosi); kierunek i rząd wielkości podobne, ale to zbieżność kierunku spadku stoku, nie kalibracja.

Wezuwiusz (`wezuwiusz_real`)





- Lawa najpierw **wypełnia krater** (reguła wypełniania zagłębień; krater ~7 komórek głębokości), potem **przelewa się przez najniższy odcinek krawędzi na SW/W** i spływa po stokach **S, W i SE** Gran Cono (2023 kolumn, do ~3,5 km od krateru, do ~230 m n.p.m.).
- Na **północy** lawa schodzi do doliny między stożkiem a Sommą (Atrio del Cavallo / Valle del Gigante, 800–870 m; najdalej y = 88) i **tam się zatrzymuje: przez grzbiet Monte Somma (900–1060 m, y ≈ 87–95) nie przelewa się w żadnej kolumnie**: lawa się nie wspina, a dolina nie jest zamkniętą niecką, którą mogłaby wypełnić. To zgodne z rolą Sommy jako bariery (np. lawa z 1944 r. popłynęła doliną Atrio del Cavallo i dalej na zachód, a nie przez grzbiet).

6. Odtwarzanie erupcji krok po kroku

Stan każdej komórki w kroku k (k = 0 … steps, stan k = po k krokach CA) da się odtworzyć z wyniku końcowego, bez nowego wyjścia silnika, bo `ca_result.bin` v2 zapisuje dla każdej komórki `arrivalStep` i `solidStep` (semantyka sprawdzona w kodzie `LavaCA::updateLava`: krok t czyta stan t i zapisuje stan t + 1, znacznik = numer kroku t):

typ końcowy	stan w kroku k
skała	skała
powietrze (komórka nigdy nie była lawą; jej `arrivalStep` = 0)	powietrze
lawa / bazalt	**powietrze** dla k < pojawienie, gdzie pojawienie = **0 dla krateru**, `arrivalStep + 1` dla reszty
bazalt	**bazalt** dla k ≥ `solidStep + 1`
(pozostałe)	**płynna lawa**, także lawa płynna do końca (jej `solidStep` = 0, rozpoznawana po typie końcowym)

Kratery mają `arrivalStep = 0` tak jak komórki zalane w kroku 0; rozpoznajemy je po położeniu (`stats.json` → `flows[].vent`). Bez listy kraterów (np. obcięta lista przy > 10 000 zarodków) wszystkie komórki z `arrivalStep = 0` pojawiają się w kroku 0; różnica najwyżej 1 kroku dla kilku komórek (GUI to zaznacza).

Temperatura w kroku k nie jest zapisana, ale da się ją **policzyć dokładnie**: po przybyciu płynna lawa traci dokładnie `coolingAmbient` na krok, a krater w trakcie erupcji ma stałe `eruptTemp` (reguła 2 w `CaRules.hpp`), więc T_k = min(eruptTemp, T_końc + coolingAmbient · (koniec − k)), koniec = `solidStep + 1` (bazalt) albo steps (lawa). Wybrano to zamiast „wieku lawy" (k − pojawienie): wiek nie odróżnia świeżej lawy daleko od krateru (już chłodnej) od lawy przy kraterze. Paleta **„żar"**: świeża lawa jasnożółta → pomarańcz → ciemniejąca czerwień przy temperaturze zastygania; bazalt: grafit, skała: ciepła szarość-brąz (od nowego wyglądu interfejsu te same kolory co w widoku „typ komórki", dokument „Wygląd interfejsu"); płynna lawa w 3D lekko świeci. Tryb **„krater"**: kolor `flowId` (dla `classic`: rozrost ziaren).

Sprawdzenie: silnik ma migawki `output.snapshotsEvery` (`snapshots/step_<k>.bin`, ten sam format co `ca_result.bin`; odtwarzanie dodało migawkę stanu **0**). Testy porównują odtworzenie z prawdziwym stanem: `engine/tests/test_replay.cpp`: każdy krok automatu (lawa 2D i 3D, kratery w kraterze / na zboczu / z listy, Moore / von Neumann, Vector / Matrix, classic): typ i `flowId` identyczne, temperatura z błędem < 0,05 °C (zaokrąglenia float); migawki zapisane przez silnik = odtworzenie; `gui/tests/test_replay.py`: to samo dla `gui/replay.py` na migawkach z silnika, liczba komórek płynnych w każdym kroku = `activeCells` ze `stats.json`, oraz **ta sama reguła w przeglądarce** (`gui/static/js/replay.js` uruchomiony przez `node`) daje te same stany i temperatury.


GUI. Przełącznik **„odtwarzanie erupcji"** w podglądzie 2D i 3D pokazuje pasek: **Odtwórz / Pauza**, suwak „krok 0 … steps", prędkość (kroków/s; domyślnie całość ~10 s), numer kroku, **liczba komórek płynnych i zastygłych** w tym kroku (cała objętość; w 2D także w przekroju), kolor „żar" / „krater". Dane pobierane **raz**: - 2D: pięć przekrojów bieżącej płaszczyzny (typ, pojawienie, zastygnięcie, temperatura końcowa, `flowId`; pola pochodne `appear`, `solidFrom` w `/api/result/slice`), stan klatki liczy przeglądarka; - 3D: wszystkie komórki lawy (`/api/result/replay/cells`: 22 B/komórkę) + wysokość terenu (`surface?`


`field=terrain`); **powierzchnia** w kroku k = najwyższa niepusta komórka kolumny (teren albo lawa pojawiona do k), **ściany**: tekstury przeliczane co klatkę, **woksele**: komórki posortowane wg pojawienia (`count` = widoczne). Ograniczenie: powyżej 2 mln komórek lawy pakiet próbkuje **całe kolumny** co `step` (powierzchnia w próbkach pozostaje poprawna), woksele: co n-tą komórkę do 150 tys.


Eksport animacji: *Klatki PNG (ZIP)*: do 200 klatek równomiernie (pierwsza i ostatnia zawsze), kadr jak *Eksport PNG* (tytuł z numerem kroku + legenda), ZIP bez kompresji tworzony w przeglądarce; *Nagraj WebM*: film 25 kl./s (MediaRecorder na canvasie, do 300 klatek). Sprawdzone w Chromium (Playwright): ZIP 129 klatek Wezuwiusza otwiera się bez błędów, WebM się zapisuje.


Krystalizacja MC: opcja `mc.snapshotsEvery` (domyślnie 0, wyłączone) zapisuje `mc_snapshots/mcs_<k>.bin` (format `mc_result.bin`) dla MCS 0, co N i na końcu; czas w osobnej sekcji `mcSnapshots` **nie wlicza się do** `mcSim`, wynik MC bez zmian (test). W GUI źródło odtwarzania „krystalizacja (MC)": suwak po migawkach, kryształy w przekroju 2D i na ścianach / powierzchni 3D (`mcs=<k>` w zapytaniach; woksele: stan końcowy).


Klatki Etny (3D, powierzchnia; kroki 8, 60, 150: koniec erupcji, 230: zastyganie):





Wulkan — spływ lawy (CA) i krystalizacja bazaltu (MC)
Automat komórkowy + Monte Carlo (model Pottsa)
silnik gotowy
PRZYGOTUJ Nowa symulacja Seria LICZ Zadania ANALIZUJ Wyniki Porównanie Podgląd 2D Podgląd 3D Czasy i statystyki
Wynik etna_real — 160×160×70 lava
160 × 160 × 70 (3D) · tryb lava · pola: 4 · ca_result.bin v2 · results/etna_real
Pobierz ZIP Eksport VTK
Widok ściany powierzchnia woksele Pole Krater / ziarno (flowId) Przewyższenie ×1 odtwarzanie erupcji
Reset kamery Eksport PNG
Odtwórz krok 60 / 284 prędkość 20 kroków/s kolor żar (temperatura)
płynna: 1409 · zastygła: 1721 komórek
Klatki PNG (ZIP) Nagraj WebM
z (pion) 0…69
y 0…159
x 0…159
Odtwarzanie erupcji — powierzchnia (najwyższa niepusta komórka kolumny w tym kroku) · 160×160×70
Legenda
Odtwarzanie: żar lawy
800
1200 °C
płynna lawa: temperatura w tym kroku (z temperatury końcowej i stygnięcia coolingAmbient na krok) — jasnożółta świeża, ciemnoczerwona tuż przed zastygnięciem
bazalt (zastygła lawa)
skała
powietrze


Wulkan — spływ lawy (CA) i krystalizacja bazaltu (MC)
Automat komórkowy + Monte Carlo (model Pottsa)
silnik gotowy
PRZYGOTUJ Nowa symulacja Seria LICZ Zadania ANALIZUJ Wyniki Porównanie Podgląd 2D Podgląd 3D Czasy i statystyki
Wynik etna_real — 160×160×70 lava
160 × 160 × 70 (3D) · tryb lava · pola: 4 · ca_result.bin v2 · results/etna_real
Pobierz ZIP Eksport VTK
Widok ściany powierzchnia woksele Pole Krater / ziarno (flowId) Przewyższenie ×1 odtwarzanie erupcji
Reset kamery Eksport PNG
Odtwórz krok 150 / 284 prędkość 20 kroków/s kolor żar (temperatura)
płynna: 648 · zastygła: 3143 komórek
Klatki PNG (ZIP) Nagraj WebM
z (pion) 0…69
y 0…159
x 0…159
Odtwarzanie erupcji — powierzchnia (najwyższa niepusta komórka kolumny w tym kroku) · 160×160×70
Legenda
Odtwarzanie: żar lawy
800
1200 °C
płynna lawa: temperatura w tym kroku (z temperatury końcowej i stygnięcia coolingAmbient na krok) — jasnożółta świeża, ciemnoczerwona tuż przed zastygnięciem
bazalt (zastygła lawa)
skała
powietrze








Przekrój 2D przez krater Wezuwiusza (y = 71; kroki 6, 40, 128) i krystalizacja MC z migawek (`lava_mc_3d`, MCS 0, 20, 200):



Wulkan — spływ lawy (CA) i krystalizacja bazaltu (MC)
Automat komórkowy + Monte Carlo (model Pottsa)
silnik gotowy
PRZYGOTUJ Nowa symulacja Seria LICZ Zadania ANALIZUJ Wyniki Porównanie Podgląd 2D Podgląd 3D Czasy i statystyki
Wynik wezuwiusz_real — 140×140×50 lava
140 × 140 × 50 (3D) · tryb lava · pola: 4 · ca_result.bin v2 · results/wezuwiusz_real
Pobierz ZIP Eksport VTK
Pole Typ komórki Przekrój ⊥ osi x y z Warstwa 71 / 139 granice ziaren odtwarzanie erupcji
Dopasuj Eksport PNG
Odtwórz krok 6 / 128 prędkość 10 kroków/s kolor żar (temperatura)
płynna: 56 · zastygła: 0 komórek · w przekroju: 21 / 0
Klatki PNG (ZIP) Nagraj WebM
Legenda
Odtwarzanie: żar lawy
800 1200 °C
płynna lawa: temperatura w tym kroku (z temperatury końcowej i stygnięcia coolingAmbient na krok) — jasnożółta świeża, ciemnoczerwona tuż przed zastygnięciem
bazalt (zastygła lawa)
skała
powietrze
Odtwarzanie erupcji · przekrój y = 71 · oś pozioma x, pionowa z · blok 140×140×50


Wulkan — spływ lawy (CA) i krystalizacja bazaltu (MC)
Automat komórkowy + Monte Carlo (model Pottsa)
silnik gotowy
PRZYGOTUJ Nowa symulacja Seria LICZ Zadania ANALIZUJ Wyniki Porównanie Podgląd 2D Podgląd 3D Czasy i statystyki
Wynik wezuwiusz_real — 140×140×50 lava
140 × 140 × 50 (3D) · tryb lava · pola: 4 · ca_result.bin v2 · results/wezuwiusz_real
Pobierz ZIP Eksport VTK
Pole Typ komórki Przekrój ⊥ osi x y z Warstwa 71 / 139 granice ziaren odtwarzanie erupcji
Dopasuj Eksport PNG
Odtwórz krok 40 / 128 prędkość 10 kroków/s kolor żar (temperatura)
płynna: 1842 · zastygła: 203 komórek · w przekroju: 46 / 3
Klatki PNG (ZIP) Nagraj WebM
Legenda
Odtwarzanie: żar lawy
800 1200 °C
płynna lawa: temperatura w tym kroku (z temperatury końcowej i stygnięcia coolingAmbient na krok) — jasnożółta świeża, ciemnoczerwona tuż przed zastygnięciem
bazalt (zastygła lawa)
skała
powietrze
Odtwarzanie erupcji · przekrój y = 71 · oś pozioma x, pionowa z · blok 140×140×50


Wulkan — spływ lawy (CA) i krystalizacja bazaltu (MC)
Automat komórkowy + Monte Carlo (model Pottsa)
silnik gotowy
PRZYGOTUJ Nowa symulacja Seria LICZ Zadania ANALIZUJ Wyniki Porównanie Podgląd 2D Podgląd 3D Czasy i statystyki
Wynik wezuwiusz_real — 140×140×50 lava
140 × 140 × 50 (3D) · tryb lava · pola: 4 · ca_result.bin v2 · results/wezuwiusz_real
Pobierz ZIP Eksport VTK
Pole Typ komórki Przekrój ⊥ osi x y z Warstwa 71 / 139 granice ziaren odtwarzanie erupcji
Dopasuj Eksport PNG
Odtwórz krok 128 / 128 prędkość 10 kroków/s kolor żar (temperatura)
płynna: 1 · zastygła: 2469 komórek · w przekroju: 1 / 48
Klatki PNG (ZIP) Nagraj WebM
z → (0...49)
x → (0...139)
Odtwarzanie erupcji · przekrój y = 71 · oś pozioma x, pionowa z · blok 140×140×50
Legenda
Odtwarzanie: żar lawy
800 1200 °C
płynna lawa: temperatura w tym kroku (z temperatury końcowej i stygnięcia coolingAmbient na krok) — jasnożółta świeża, ciemnoczerwona tuż przed zastygnięciem
bazalt (zastygła lawa)
skała
powietrze


Wulkan — spływ lawy (CA) i krystalizacja bazaltu (MC)
Automat komórkowy + Monte Carlo (model Pottsa)
silnik gotowy
PRZYGOTUJ Nowa symulacja Seria LICZ Zadania ANALIZUJ Wyniki Porównanie Podgląd 2D Podgląd 3D Czasy i statystyki
Wynik replay_lava_mc_3d — 80×80×50 lava
80 × 80 × 50 (3D) · tryb lava · pola: 5 · ca_result.bin v2 + mc_result.bin · results/replay_lava_mc_3d
Pobierz ZIP Eksport VTK
Pole Typ komórki Przekrój ⊥ osi x y z Warstwa 40 / 79 granice ziaren odtwarzanie erupcji
Dopasuj Eksport PNG
krystalizacja (MC, 21 migawek) Odtwórz MCS 0 (1/21) prędkość 2 migawek/s
Klatki PNG (ZIP) Nagraj WebM
z → (0...49)
x → (0...79)
Odtwarzanie krystalizacji MC · przekrój y = 40 · oś pozioma x, pionowa z · blok 80×80×50
Legenda
Kryształ (MC) — MCS 0
orientacje 1...50 — kolor stały z ID kryształu (jak plot_slice.py --color crystal)
powietrze
skała





7. Uwaga techniczna: zgodność czasów (test A/B) i układ kodu w MSVC

Pierwsza wersja trzymała listę kraterów jako `std::vector` w `VentsConfig`. Wyniki były bitowo identyczne, ale test A/B (stary i nowy `engine.exe` naprzemiennie, przypięte do procesora 2, 5–8 powtórzeń) pokazał **CA wolniejsze o 6–9%** (`test_3d` 1745 → 1871 ms, `heightmap_kanion` 3465 → 3772 ms) przy **niezmienionym kodzie automatu**; GCC i MC bez zmian. Bisekcja na kopiach źródeł + mapy linkera (`/MAP`): - ten sam kompilator (MSVC 19.38.33133), położenie exe bez znaczenia, gałąź

migawek bez znaczenia; - winna grupa zmian configu: pole-wektor dokładało instancje `vector<GridColumn>` (realokacja, destruktor), nowy destruktor `VentsConfig` i powiększało konstruktor kopiujący / destruktor `Config`. Linker MSVC układa te funkcje (COMDAT) **przed** kodem `LavaCA`, więc cały automat przesunął się o 400 B: `updateLava` z 32 na 48 B w linii 64 B (to samo dla `computeDescent`, `dropDepth`, `hasSupport`). To **efekt wyrównania gorącej pętli**, nie zmiany algorytmu; - umieszczenie `LavaCA` w osobnej podsekcji `.text$alava` (`__declspec(code_seg)`) dało układ stabilny, ale też ~5% wolniejszy (inne wyrównanie), odrzucone.

Rozwiązanie: lista kraterów **nie jest polem** `Config` (czyta ją `Config::ventColumns()` z `effective`, typ `vector<pair<int,int>>` jest już instancjonowany w `VentPlacer`), `mc.snapshotsEvery` mieści się w istniejącym wypełnieniu `McConfig` (rozmiar struktury bez zmian). Mapa linkera: adresy wszystkich funkcji `LavaCA` **identyczne** jak przed zmianami. Test A/B końcowy (mediana z 5, przypięte, tło ~3 rdzenie): `test_3d` CA ×1,002, `heightmap_kanion` ×0,990, `mc_full_2d` MC ×0,997, `lava_mc_2d` CA ×1,03 / MC ×1,04 (czasy 7–60 ms, przedziały się nakładają, czyli szum); GCC: `test_3d` 1531 ms vs 1573 ms przed zmianami.

Wniosek dla dalszej optymalizacji: w MSVC zmiana kodu, który *nie* jest automatem (np. nowe pole w `Config`), potrafi zmienić czas CA o ±7% przez położenie pętli w pliku wykonywalnym. Przy pomiarach przed/po porównywać build z tymi samymi zmianami „obok" albo sprawdzać mapą linkera (`/MAP`), czy adresy funkcji `LavaCA` się nie przesunęły.

8. Pliki

Plik	Co
`tools/fetch_dem.py`	pobranie kafelków Terrarium, mozaika, przepróbkowanie, skala pionowa, zapis CSV/PNG/JSON
`tools/latlon_to_grid.py`	(szer., dł.) ↔ (x, y), okno wysokości i zagłębienia (weryfikacja kraterów)
`configs/heightmaps/etna.*`, `wezuwiusz.*`, `README.md`	mapy (CSV, podgląd PNG, metadane JSON) i przypisanie danych
`configs/etna_real.json`, `etna_real_boczna.json`, `wezuwiusz_real.json`	presety (widoczne w GUI: *Nowa symulacja → Preset*)
`engine/src/io/Config.*`, `terrain/VentPlacer.*`, `app/Simulation.cpp`	`vents.placement = positions`, `Config::ventColumns()`, `VentPlacer::placeAt`, migawka stanu 0
`engine/src/app/McStage.*`	migawki kryształów `mc.snapshotsEvery`
`engine/tests/test_replay.cpp` (+ `test_config.cpp`, `test_terrain.cpp`)	kratery z listy, zgodność bitowa, odtwarzanie = stan automatu, migawki CA i MC
`gui/replay.py`, `gui/results.py`, `gui/app.py`, `gui/heightmap.py`	reguła odtwarzania, pola `appear` / `solidFrom` / `terrain`, `/api/result/replay*`, `mcs=<k>`, metadane geo map
`gui/static/js/replay.js`, `ventpicker.js`, `viewer2d.js`, `viewer3d.js`, `form.js`	pasek odtwarzania, paleta „żar", eksport ZIP/WebM, panel kraterów na mapie, pole JSON
`gui/tests/test_fetch_dem.py`, `test_replay.py`, `screenshots.py --only-real`	testy (bez internetu) i zrzuty `docs/img/real_*.png`, `replay_*.png`