

# Метод сопряженных градиентов

## Методы оптимизации

Александр Безносиков

Московский физико-технический институт

3 октября 2024



# Снова к Коши

- Снова решаем систему линейных уравнений:

$$Ax = b.$$

Ищем  $x \in \mathbb{R}^d$

- $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$  положительно определенная и  $b \in \mathbb{R}^d$ .

# Спряженные направления

## Определение сопряженных направлений

Множество векторов  $\{p_i\}_{i=0}^{n-1}$  будем называть сопряженным относительно положительно определенной матрицы  $A$ , если для любых  $i \neq j \in \{0, \dots, n-1\}$  следует

$$p_i^T A p_j = 0.$$

# Сопряженные направления: линейная независимость

## Линейная независимость сопряженных направлений

Сопряженных векторы  $\{p_i\}_{i=0}^{n-1}$  является линейно независимыми.

# Сопряженные направления: линейная независимость

## Доказательство

- От противного:

# Сопряженные направления: линейная независимость

## Доказательство

- От противного: пусть существует  $p_i$  такое, что существуют:

$$p_i = \sum_{j \neq i} \lambda_j p_j \text{ для некоторых } \lambda_j \in \mathbb{R}.$$

# Сопряженные направления: линейная независимость

## Доказательство

- От противного: пусть существует  $p_i$  такое, что существуют:

$$p_i = \sum_{j \neq i} \lambda_j p_j \text{ для некоторых } \lambda_j \in \mathbb{R}.$$

- Ударим определением: возьмем скалярное произведение с  $Ap_m$ , где  $m \neq i$

# Сопряженные направления: линейная независимость

## Доказательство

- От противного: пусть существует  $p_i$  такое, что существуют:

$$p_i = \sum_{j \neq i} \lambda_j p_j \text{ для некоторых } \lambda_j \in \mathbb{R}.$$

- Ударим определением: возьмем скалярное произведение с  $Ap_m$ , где  $m \neq i$

$$0 = p_m^T Ap_i = \sum_{j \neq i} \lambda_j p_m^T Ap_j = \lambda_m p_m^T Ap_m.$$

**Вопрос:** почему выполнен первый и последний переходы?



# Сопряженные направления: линейная независимость

## Доказательство

- От противного: пусть существует  $p_i$  такое, что существуют:

$$p_i = \sum_{j \neq i} \lambda_j p_j \text{ для некоторых } \lambda_j \in \mathbb{R}.$$

- Ударим определением: возьмем скалярное произведение с  $Ap_m$ , где  $m \neq i$

$$0 = p_m^T Ap_i = \sum_{j \neq i} \lambda_j p_m^T Ap_j = \lambda_m p_m^T Ap_m.$$

**Вопрос:** почему выполнен первый и последний переходы? Из-за определения сопряженности.

- Вопрос:** что получили?

# Спряженные направления: линейная независимость

## Доказательство

- От противного: пусть существует  $p_i$  такое, что существуют:

$$p_i = \sum_{j \neq i} \lambda_j p_j \text{ для некоторых } \lambda_j \in \mathbb{R}.$$

- Ударим определением: возьмем скалярное произведение с  $Ap_m$ , где  $m \neq i$

$$0 = p_m^T Ap_i = \sum_{j \neq i} \lambda_j p_m^T Ap_j = \lambda_m p_m^T Ap_m.$$

**Вопрос:** почему выполнен первый и последний переходы? Из-за определения сопряженности.

- Вопрос:** что получили?  $\lambda_m = 0$ .

# Сопряженные направления: линейная независимость

## Доказательство

- От противного: пусть существует  $p_i$  такое, что существуют:

$$p_i = \sum_{j \neq i} \lambda_j p_j \text{ для некоторых } \lambda_j \in \mathbb{R}.$$

- Ударим определением: возьмем скалярное произведение с  $Ap_m$ , где  $m \neq i$

$$0 = p_m^T Ap_i = \sum_{j \neq i} \lambda_j p_m^T Ap_j = \lambda_m p_m^T Ap_m.$$

**Вопрос:** почему выполнен первый и последний переходы? Из-за определения сопряженности.

- Вопрос:** что получили?  $\lambda_m = 0$ .
- Вопрос:** что из этого следует?

# Сопряженные направления: линейная независимость

## Доказательство

- От противного: пусть существует  $p_i$  такое, что существуют:

$$p_i = \sum_{j \neq i} \lambda_j p_j \text{ для некоторых } \lambda_j \in \mathbb{R}.$$

- Ударим определением: возьмем скалярное произведение с  $Ap_m$ , где  $m \neq i$

$$0 = p_m^T Ap_i = \sum_{j \neq i} \lambda_j p_m^T Ap_j = \lambda_m p_m^T Ap_m.$$

**Вопрос:** почему выполнен первый и последний переходы? Из-за определения сопряженности.

- Вопрос:** что получили?  $\lambda_m = 0$ .
- Вопрос:** что из этого следует? пробегаем по всем  $m \neq i$  и получаем, что  $\lambda_m = 0$ , а значит  $p_i = 0$ . Противоречие.

# Сопряженные направления: как использовать?

- У нас есть какой-то базис. **Вопрос:** как его можно использовать?

## Сопряженные направления: как использовать?

- У нас есть какой-то базис. **Вопрос:** как его можно использовать? Если у нас есть  $d$  сопряженных векторов, то они формируют базис. Раскладываем решение:

$$x^* = \sum_{i=0}^{d-1} \lambda_i p_i.$$

## Сопряженные направления: как использовать?

- У нас есть какой-то базис. **Вопрос:** как его можно использовать? Если у нас есть  $d$  сопряженных векторов, то они формируют базис. Раскладываем решение:

$$x^* = \sum_{i=0}^{d-1} \lambda_i p_i.$$

- Вопрос:** как найти  $\lambda_i$ ?

## Сопряженные направления: как использовать?

- У нас есть какой-то базис. **Вопрос:** как его можно использовать? Если у нас есть  $d$  сопряженных векторов, то они формируют базис. Раскладываем решение:

$$x^* = \sum_{i=0}^{d-1} \lambda_i p_i.$$

- Вопрос:** как найти  $\lambda_i$ ? Возьмем скалярное произведение с  $Ap_j$ :

$$p_j^T A x^* = \sum_{i=0}^{d-1} \lambda_i p_j^T A p_i = \lambda_j p_j^T A p_j.$$

Здесь опять воспользовались определением сопряженности.



## Спряженные направления: как использовать?

- У нас есть какой-то базис. **Вопрос:** как его можно использовать? Если у нас есть  $d$  сопряженных векторов, то они формируют базис. Раскладываем решение:

$$x^* = \sum_{i=0}^{d-1} \lambda_i p_i.$$

- Вопрос:** как найти  $\lambda_i$ ? Возьмем скалярное произведение с  $Ap_j$ :

$$p_j^T A x^* = \sum_{i=0}^{d-1} \lambda_i p_j^T A p_i = \lambda_j p_j^T A p_j.$$

Здесь опять воспользовались определением сопряженности.

- Заметим, что  $A x^* = b$ , тогда  $p_j^T b = \lambda_j p_j^T A p_j$ .

## Сопряженные направления: как использовать?

- У нас есть какой-то базис. **Вопрос:** как его можно использовать? Если у нас есть  $d$  сопряженных векторов, то они формируют базис. Раскладываем решение:

$$x^* = \sum_{i=0}^{d-1} \lambda_i p_i.$$

- Вопрос:** как найти  $\lambda_j$ ? Возьмем скалярное произведение с  $Ap_j$ :

$$p_j^T A x^* = \sum_{i=0}^{d-1} \lambda_i p_j^T A p_i = \lambda_j p_j^T A p_j.$$

Здесь опять воспользовались определением сопряженности.

- Заметим, что  $A x^* = b$ , тогда  $p_j^T b = \lambda_j p_j^T A p_j$ .
- Тогда

$$\lambda_j = \frac{p_j^T b}{p_j^T A p_j}.$$

## Сопряженные направления: как использовать?

- **Вопрос:** а видно ли какие-то проблемы?

# Сопряженные направления: как использовать?

- **Вопрос:** а видно ли какие-то проблемы? Все хорошо кроме того, что мы сами придумали сопряженные направления, сами сказали, что они существуют, а как их получать в реальности пока непонятно.

# Сопряженные направления: как использовать?

- **Вопрос:** а видно ли какие-то проблемы? Все хорошо кроме того, что мы сами придумали сопряженные направления, сами сказали, что они существуют, а как их получать в реальности пока непонятно.
- Начнем превращать рассуждения в некоторый итеративный метод:

$$x^{k+1} = x^k + \alpha_k p_k.$$

Т.е. предполагается, что мы на каждой итерации будем искать новое  $p_k$  и подбивать к нему  $\alpha_k$ .

# Метод сопряженных градиентов: $\alpha$

Мы уже более менее поняли, как искать  $\alpha$ , когда искали  $\lambda$ . **Вопрос:**  
 $\lambda = \alpha$ ?

## Метод сопряженных градиентов: $\alpha$

Мы уже более менее поняли, как искать  $\alpha$ , когда искали  $\lambda$ . **Вопрос:**  $\lambda = \alpha$ ? Не всегда. Итеративная схема с  $\alpha$ :

$$x^{k+1} = x^0 + \sum_{i=0}^k \alpha_i p_i.$$

## Метод сопряженных градиентов: $\alpha$

Мы уже более менее поняли, как искать  $\alpha$ , когда искали  $\lambda$ . **Вопрос:**  $\lambda = \alpha$ ? Не всегда. Итеративная схема с  $\alpha$ :

$$x^{k+1} = x^0 + \sum_{i=0}^k \alpha_i p_i.$$

Итеративная схема с  $\lambda$ :

$$x^{k+1} = \sum_{i=0}^k \lambda_i p_i.$$



## Метод сопряженных градиентов: $\alpha$

Мы уже более менее поняли, как искать  $\alpha$ , когда искали  $\lambda$ . **Вопрос:**  $\lambda = \alpha$ ? Не всегда. Итеративная схема с  $\alpha$ :

$$x^{k+1} = x^0 + \sum_{i=0}^k \alpha_i p_i.$$

Итеративная схема с  $\lambda$ :

$$x^{k+1} = \sum_{i=0}^k \lambda_i p_i.$$

Получается, что  $\alpha_i = \lambda_i$ , если  $x^0 = 0$ .

## Метод сопряженных градиентов: $\alpha$

Мы уже более менее поняли, как искать  $\alpha$ , когда искали  $\lambda$ . **Вопрос:**  $\lambda = \alpha$ ? Не всегда. Итеративная схема с  $\alpha$ :

$$x^{k+1} = x^0 + \sum_{i=0}^k \alpha_i p_i.$$

Итеративная схема с  $\lambda$ :

$$x^{k+1} = \sum_{i=0}^k \lambda_i p_i.$$

Получается, что  $\alpha_i = \lambda_i$ , если  $x^0 = 0$ . Нужна формула поиска  $\alpha$ , так как стартовать из 0 хорошо, но, возможно, у нас есть более близкий кандидат в качестве стартовой точки.

# Метод сопряженных градиентов: $\alpha$

- Можно разложить  $x^0$  по базису и найти для него  $\tilde{\lambda}_i$ :

# Метод сопряженных градиентов: $\alpha$

- Можно разложить  $x^0$  по базису и найти для него  $\tilde{\lambda}_i$ :

$$x^0 = \sum_{i=0}^{d-1} \tilde{\lambda}_i p_i, \text{ где } \tilde{\lambda}_i = \frac{p_i^T A x^0}{p_i^T A p_i}.$$

## Метод сопряженных градиентов: $\alpha$

- Можно разложить  $x^0$  по базису и найти для него  $\tilde{\lambda}_i$ :

$$x^0 = \sum_{i=0}^{d-1} \tilde{\lambda}_i p_i, \text{ где } \tilde{\lambda}_i = \frac{p_i^T A x^0}{p_i^T A p_i}.$$

- Тогда справедливо следующее утверждение:

$$x^0 + \sum_{i=0}^{d-1} \alpha_i p_i = \sum_{i=0}^{d-1} \left( \frac{p_i^T A x^0}{p_i^T A p_i} + \alpha_i \right) p_i = \sum_{i=0}^{d-1} \lambda_i p_i = \sum_{i=0}^{d-1} \frac{p_i^T b}{p_i^T A p_i} p_i.$$

## Метод сопряженных градиентов: $\alpha$

- Можно разложить  $x^0$  по базису и найти для него  $\tilde{\lambda}_i$ :

$$x^0 = \sum_{i=0}^{d-1} \tilde{\lambda}_i p_i, \text{ где } \tilde{\lambda}_i = \frac{p_i^T A x^0}{p_i^T A p_i}.$$

- Тогда справедливо следующее утверждение:

$$x^0 + \sum_{i=0}^{d-1} \alpha_i p_i = \sum_{i=0}^{d-1} \left( \frac{p_i^T A x^0}{p_i^T A p_i} + \alpha_i \right) p_i = \sum_{i=0}^{d-1} \lambda_i p_i = \sum_{i=0}^{d-1} \frac{p_i^T b}{p_i^T A p_i} p_i.$$

- Получаем

$$\alpha_k = \frac{p_k^T (b - A x^0)}{p_k^T A p_k}.$$

# Метод сопряженных градиентов: $\alpha$

- Результат уже нормальный, можно чуть-чуть еще докрутить:

$$p_k^T A(x^k - x^0) = 0.$$

**Вопрос:** почему?

# Метод сопряженных градиентов: $\alpha$

- Результат уже нормальный, можно чуть-чуть еще докрутить:

$$p_k^T A(x^k - x^0) = 0.$$

**Вопрос:** почему?  $(x^k - x^0) = \sum_{i=0}^{k-1} \alpha_i p_i$ , а  $p_i$  и  $p_k$  сопряженные относительно  $A$ .



## Метод сопряженных градиентов: $\alpha$

- Результат уже нормальный, можно чуть-чуть еще докрутить:

$$p_k^T A(x^k - x^0) = 0.$$

**Вопрос:** почему?  $(x^k - x^0) = \sum_{i=0}^{k-1} \alpha_i p_i$ , а  $p_i$  и  $p_k$  сопряженные относительно  $A$ .

- Тогда можно так:

$$\alpha_k = \frac{p_k^T (b - Ax^k)}{p_k^T A p_k} = -\frac{p_k^T r_k}{p_k^T A p_k}.$$

Здесь введено обозначение  $r_k = Ax^k - b$ .

# Метод сопряженных градиентов: физический смысл $\alpha$

- Рассмотрим шаг метода  $x^{k+1} = x^k + \alpha_k p_k$ , а также функцию

$$f(x) = \frac{1}{2} x^T A x - b x.$$

# Метод сопряженных градиентов: физический смысл $\alpha$

- Рассмотрим шаг метода  $x^{k+1} = x^k + \alpha_k p_k$ , а также функцию

$$f(x) = \frac{1}{2} x^T A x - b x.$$

- Вопрос:** что это за функция?

# Метод сопряженных градиентов: физический смысл $\alpha$

- Рассмотрим шаг метода  $x^{k+1} = x^k + \alpha_k p_k$ , а также функцию

$$f(x) = \frac{1}{2} x^T A x - b x.$$

- Вопрос:** что это за функция? Ее минимизация эквивалентна поиску решения системы уравнений:  $\nabla f(x^*) = Ax^* - b = 0$ .

# Метод сопряженных градиентов: физический смысл $\alpha$

- Рассмотрим шаг метода  $x^{k+1} = x^k + \alpha_k p_k$ , а также функцию

$$f(x) = \frac{1}{2} x^T A x - b x.$$

- Вопрос:** что это за функция? Ее минимизация эквивалентна поиску решения системы уравнений:  $\nabla f(x^*) = Ax^* - b = 0$ .
- Рассмотрим:

$$g(\alpha) = f(x^k + \alpha p_k).$$

Где у этой функции минимум по  $\alpha^*$ ?

# Метод сопряженных градиентов: физический смысл $\alpha$

- Рассмотрим шаг метода  $x^{k+1} = x^k + \alpha_k p_k$ , а также функцию




$$f(x) = \frac{1}{2} x^T A x - b x.$$

- Вопрос:** что это за функция? Ее минимизация эквивалентна поиску решения системы уравнений:  $\nabla f(x^*) = Ax^* - b = 0$ .
- Рассмотрим:




$$g(\alpha) = f(x^k + \alpha p_k).$$

Где у этой функции минимум по  $\alpha$ ?  $\alpha^* = \frac{p_k^T (b - Ax^k)}{p_k^T A p_k} = \alpha_k$ . Эта и есть физика — минимизация вдоль  $p_k$ .

# Метод сопряженных градиентов: физический смысл $\alpha$






# Метод сопряженных градиентов: физический смысл $\alpha$



- На второй картинке показано, что сопряженные направления не ортогональны (в привычном смысле этого слова).



# Метод сопряженных градиентов: физический смысл $\alpha$



- На второй картинке показано, что сопряженные направления не ортогональны (в привычном смысле этого смысла слова).
- На третьей картинке направления не являются сопряженным относительно  $A$  из-за этого возникают проблемы.

# Метод сопряженных градиентов: физический смысл $\alpha$

## Физический смысл $p$

Если  $\{p_i\}_{i=0}^k$  сопряженные направления, то для любого  $k \geq 0$  и  $i \leq k$  справедливо:

$$r_{k+1}^T p_i = 0 \text{ то же самое, что } \langle \nabla f(x^{k+1}), p_i \rangle = 0.$$

# Метод сопряженных градиентов: физический смысл $\alpha$

## Доказательство

- По индукции. База:

# Метод сопряженных градиентов: физический смысл $\alpha$

## Доказательство

- По индукции. **База:**  $r_1 = Ax^1 - b = Ax^0 - b + \alpha_0 Ap_0 = r_0 + \alpha_0 Ap_0$ ,  
в силу выбора  $\alpha_0 = -\frac{p_0^T r_0}{p_0^T Ap_0}$ :

$$p_0^T r_1 = p_0^T r_0 + \alpha_0 p_0^T Ap_0 = 0.$$

# Метод сопряженных градиентов: физический смысл $\alpha$

## Доказательство

- По индукции. **База:**  $r_1 = Ax^1 - b = Ax^0 - b + \alpha_0 Ap_0 = r_0 + \alpha_0 Ap_0$ ,  
в силу выбора  $\alpha_0 = -\frac{p_0^T r_0}{p_0^T Ap_0}$ :
$$p_0^T r_1 = p_0^T r_0 + \alpha_0 p_0^T Ap_0 = 0.$$
- Предположение:** пусть предположение верно для всех  $i \leq k$ .

# Метод сопряженных градиентов: физический смысл $\alpha$

## Доказательство

- По индукции. **База:**  $r_1 = Ax^1 - b = Ax^0 - b + \alpha_0 Ap_0 = r_0 + \alpha_0 Ap_0$ ,  
в силу выбора  $\alpha_0 = -\frac{p_0^T r_0}{p_0^T Ap_0}$ :  
$$p_0^T r_1 = p_0^T r_0 + \alpha_0 p_0^T Ap_0 = 0.$$
- **Предположение:** пусть предположение верно для всех  $i \leq k$ .
- **Переход:** докажем для  $k + 1$ .

# Метод сопряженных градиентов: физический смысл $\alpha$

## Доказательство

- По индукции. **База:**  $r_1 = Ax^1 - b = Ax^0 - b + \alpha_0 Ap_0 = r_0 + \alpha_0 Ap_0$ ,  
в силу выбора  $\alpha_0 = -\frac{p_0^T r_0}{p_0^T Ap_0}$ :

$$p_0^T r_1 = p_0^T r_0 + \alpha_0 p_0^T Ap_0 = 0.$$

- Предположение:** пусть предположение верно для всех  $i \leq k$ .
- Переход:** докажем для  $k+1$ . Рассмотрим:

$$r_{k+1} = Ax^{k+1} - b = Ax^k - b + \alpha_k Ap_k = r_k + \alpha_k Ap_k.$$

# Метод сопряженных градиентов: физический смысл $\alpha$

## Доказательство

- По индукции. **База:**  $r_1 = Ax^1 - b = Ax^0 - b + \alpha_0 Ap_0 = r_0 + \alpha_0 Ap_0$ ,  
в силу выбора  $\alpha_0 = -\frac{p_0^T r_0}{p_0^T Ap_0}$ :

$$p_0^T r_1 = p_0^T r_0 + \alpha_0 p_0^T Ap_0 = 0.$$

- Предположение:** пусть предположение верно для всех  $i \leq k$ .
- Переход:** докажем для  $k+1$ . Рассмотрим:

$$r_{k+1} = Ax^{k+1} - b = Ax^k - b + \alpha_k Ap_k = r_k + \alpha_k Ap_k.$$

Откуда в силу выбора  $\alpha_k$

$$p_k^T r_{k+1} = p_k^T r_k + \alpha_k p_k^T Ap_k = 0.$$

Для  $i < k$ :

$$p_i^T r_{k+1} = p_i^T r_k + \alpha_k p_i^T Ap_k = 0.$$

**Вопрос:** почему?



# Метод сопряженных градиентов: физический смысл $\alpha$

## Доказательство

- По индукции. **База:**  $r_1 = Ax^1 - b = Ax^0 - b + \alpha_0 Ap_0 = r_0 + \alpha_0 Ap_0$ ,  
в силу выбора  $\alpha_0 = -\frac{p_0^T r_0}{p_0^T Ap_0}$ :

$$p_0^T r_1 = p_0^T r_0 + \alpha_0 p_0^T Ap_0 = 0.$$

- Предположение:** пусть предположение верно для всех  $i \leq k$ .
- Переход:** докажем для  $k+1$ . Рассмотрим:

$$r_{k+1} = Ax^{k+1} - b = Ax^k - b + \alpha_k Ap_k = r_k + \alpha_k Ap_k.$$

Откуда в силу выбора  $\alpha_k$

$$p_k^T r_{k+1} = p_k^T r_k + \alpha_k p_k^T Ap_k = 0.$$

Для  $i < k$ :

$$p_i^T r_{k+1} = p_i^T r_k + \alpha_k p_i^T Ap_k = 0.$$

**Вопрос:** почему? В силу индукции и сопряженности.

## Метод сопряженных градиентов: $p$

- Пора уже искать  $p$ .
- **Вопрос:** что хотим потребовать от техники поиска  $p$  (вспомните, например, процедуру Грама-Шмидта)?

## Метод сопряженных градиентов: $p$

- Пора уже искать  $p$ .
- **Вопрос:** что хотим потребовать от техники поиска  $p$  (вспомните, например, процедуру Грама-Шмидта)? «Дешевизну» подсчета  $p_k$ :

$$p_k = -r_k + \beta_k p_{k-1},$$

где  $\beta_k$  – некоторый коэффициент. Чтобы найти  $p_k$  нужно знать только  $p_{k-1}$  и  $r_k$ , а старые  $r_i$  и  $p_i$  можно уже забыть (они учтены в  $x^k$ ).

## Метод сопряженных градиентов: $p$

- Пора уже искать  $p$ .
- **Вопрос:** что хотим потребовать от техники поиска  $p$  (вспомните, например, процедуру Грама-Шмидта)? «Дешевизну» подсчета  $p_k$ :

$$p_k = -r_k + \beta_k p_{k-1},$$

где  $\beta_k$  – некоторый коэффициент. Чтобы найти  $p_k$  нужно знать только  $p_{k-1}$  и  $r_k$ , а старые  $r_i$  и  $p_i$  можно уже забыть (они учтены в  $x^k$ ).

- **Вопрос:** как найти  $\beta_k$ ?

## Метод сопряженных градиентов: $p$

- Пора уже искать  $p$ .
- **Вопрос:** что хотим потребовать от техники поиска  $p$  (вспомните, например, процедуру Грама-Шмидта)? «Дешевизну» подсчета  $p_k$ :

$$p_k = -r_k + \beta_k p_{k-1},$$

где  $\beta_k$  – некоторый коэффициент. Чтобы найти  $p_k$  нужно знать только  $p_{k-1}$  и  $r_k$ , а старые  $r_i$  и  $p_i$  можно уже забыть (они учтены в  $x^k$ ).

- **Вопрос:** как найти  $\beta_k$ ? Сопряженность  $p_k$  и  $p_{k-1}$ :

$$0 = p_{k-1}^T A p_k = -p_{k-1}^T A r_k + \beta_k p_{k-1}^T A p_{k-1},$$

## Метод сопряженных градиентов: $p$

- Пора уже искать  $p$ .
- **Вопрос:** что хотим потребовать от техники поиска  $p$  (вспомните, например, процедуру Грама-Шмидта)? «Дешевизну» подсчета  $p_k$ :

$$p_k = -r_k + \beta_k p_{k-1},$$

где  $\beta_k$  – некоторый коэффициент. Чтобы найти  $p_k$  нужно знать только  $p_{k-1}$  и  $r_k$ , а старые  $r_i$  и  $p_i$  можно уже забыть (они учтены в  $x^k$ ).

- **Вопрос:** как найти  $\beta_k$ ? Сопряженность  $p_k$  и  $p_{k-1}$ :

$$0 = p_{k-1}^T A p_k = -p_{k-1}^T A r_k + \beta_k p_{k-1}^T A p_{k-1},$$

откуда

$$\beta_k = \frac{p_{k-1}^T A r_k}{p_{k-1}^T A p_{k-1}}.$$

# Метод сопряженных градиентов

---

## Алгоритм 1 Метод сопряженных градиентов

---

**Вход:** стартовая точка  $x^0 \in \mathbb{R}^d$ ,  $r_0 = Ax_0 - b$ ,  $p_0 = -r_0$  количество итераций  $K$

1: **for**  $k = 0, 1, \dots, K - 1$  **do**

2:  $\alpha_k = -\frac{r_k^T p_k}{p_k^T A p_k}$

3:  $x^{k+1} = x^k + \alpha_k p_k$

4:  $r_{k+1} = Ax^{k+1} - b$

5:  $\beta_{k+1} = \frac{r_{k+1}^T A p_k}{p_k^T A p_k}$

6:  $p_{k+1} = -r_{k+1} + \beta_{k+1} p_k$

7: **end for**

**Выход:**  $x^K$

---

# Метод сопряженных градиентов

## Алгоритм 2 Метод сопряженных градиентов

**Вход:** стартовая точка  $x^0 \in \mathbb{R}^d$ ,  $r_0 = Ax_0 - b$ ,  $p_0 = -r_0$  количество итераций  $K$

1: **for**  $k = 0, 1, \dots, K - 1$  **do**

$$2: \quad \alpha_k = -\frac{r_k^T p_k}{p_k^T A p_k}$$

$$3: \quad x^{k+1} = x^k + \alpha_k p_k$$

$$4: \quad r_{k+1} = Ax^{k+1} - b$$

$$5: \quad \beta_{k+1} = \frac{r_{k+1}^T A p_k}{p_k^T A p_k}$$

$$6: \quad p_{k+1} = -r_{k+1} + \beta_{k+1} p_k$$

7: **end for**

**Выход:**  $x^K$

Вопрос: а почему вдруг градиентов то?



# Метод сопряженных градиентов

## Алгоритм 3 Метод сопряженных градиентов

**Вход:** стартовая точка  $x^0 \in \mathbb{R}^d$ ,  $r_0 = Ax_0 - b$ ,  $p_0 = -r_0$  количество итераций  $K$

1: **for**  $k = 0, 1, \dots, K - 1$  **do**

$$2: \quad \alpha_k = -\frac{r_k^T p_k}{p_k^T A p_k}$$

$$3: \quad x^{k+1} = x^k + \alpha_k p_k$$

$$4: \quad r_{k+1} = Ax^{k+1} - b$$

$$5: \quad \beta_{k+1} = \frac{r_{k+1}^T A p_k}{p_k^T A p_k}$$

$$6: \quad p_{k+1} = -r_{k+1} + \beta_{k+1} p_k$$

7: **end for**

**Выход:**  $x^K$

**Вопрос:** а почему вдруг градиентов то?  $r_k = Ax^k - b = \nabla f(x^k)$ . Это стоит запомнить.

# Метод сопряженных градиентов: доказательство

- **Вопрос:** а может мы уже доказали оценку на сходимость?

# Метод сопряженных градиентов: доказательство

- **Вопрос:** а может мы уже доказали оценку на сходимость? Близи к этому, мы знаем, что если все  $\{p_i\}$  сопряженные направления, то нам хватит  $d$  шагов, чтобы восстановить коэффициенты для  $x^*$  в базисе из  $\{p_i\}$ .

# Метод сопряженных градиентов: доказательство

- **Вопрос:** а может мы уже доказали оценку на сходимость? Близи к этому, мы знаем, что если все  $\{p_i\}$  сопряженные направления, то нам хватит  $d$  шагов, чтобы восстановить коэффициенты для  $x^*$  в базисе из  $\{p_i\}$ .
- **Вопрос:** Знаем ли, что все  $\{p_i\}$  сопряженные?

# Метод сопряженных градиентов: доказательство

- **Вопрос:** а может мы уже доказали оценку на сходимость? Близи к этому, мы знаем, что если все  $\{p_i\}$  сопряженные направления, то нам хватит  $d$  шагов, чтобы восстановить коэффициенты для  $x^*$  в базисе из  $\{p_i\}$ .
- **Вопрос:** Знаем ли, что все  $\{p_i\}$  сопряженные? Нет, мы знаем только, что  $p_k$  и  $p_{k-1}$  сопряжены в силу подбора  $\beta_k$ . Надо показать более широкое утверждение:

Для любого  $k \geq 1$  для любого  $i < k$  выполняется  $p_k^T A p_i = 0$ .

# Метод сопряженных градиентов: доказательство

- Идем по индукции.

# Метод сопряженных градиентов: доказательство

- Идем по индукции.
- **База:**  $p_0$  и  $p_1$  сопряжены в силу подбора  $\beta_1$ .

# Метод сопряженных градиентов: доказательство

- Идем по индукции.
- **База:**  $p_0$  и  $p_1$  сопряжены в силу подбора  $\beta_1$ .
- **Предположение:** пусть для  $k \geq 1$  все  $\{p_i\}_{i=0}^k$  сопряженные.



# Метод сопряженных градиентов: доказательство

- Идем по индукции.
- **База:**  $p_0$  и  $p_1$  сопряжены в силу подбора  $\beta_1$ .
- **Предположение:** пусть для  $k \geq 1$  все  $\{p_i\}_{i=0}^k$  сопряженные.
- **Переход:** Докажем для  $k + 1$ .

# Метод сопряженных градиентов: доказательство

- Идем по индукции.
- **База:**  $p_0$  и  $p_1$  сопряжены в силу подбора  $\beta_1$ .
- **Предположение:** пусть для  $k \geq 1$  все  $\{p_i\}_{i=0}^k$  сопряженные.
- **Переход:** Докажем для  $k+1$ .  $p_{k+1}$  и  $p_k$  сопряжены в силу подбора  $\beta_{k+1}$ .

# Метод сопряженных градиентов: доказательство

- Идем по индукции.
- **База:**  $p_0$  и  $p_1$  сопряжены в силу подбора  $\beta_1$ .
- **Предположение:** пусть для  $k \geq 1$  все  $\{p_i\}_{i=0}^k$  сопряженные.
- **Переход:** Докажем для  $k+1$ .  $p_{k+1}$  и  $p_k$  сопряжены в силу подбора  $\beta_{k+1}$ . Рассмотрим  $i < k$ :

$$p_{k+1}^T A p_i = -r_{k+1}^T A p_i + \beta_{k+1} p_k^T A p_i = -r_{k+1}^T A p_i.$$

# Метод сопряженных градиентов: доказательство

- Идем по индукции.
- **База:**  $p_0$  и  $p_1$  сопряжены в силу подбора  $\beta_1$ .
- **Предположение:** пусть для  $k \geq 1$  все  $\{p_i\}_{i=0}^k$  сопряженные.
- **Переход:** Докажем для  $k+1$ .  $p_{k+1}$  и  $p_k$  сопряжены в силу подбора  $\beta_{k+1}$ . Рассмотрим  $i < k$ :

$$p_{k+1}^T A p_i = -r_{k+1}^T A p_i + \beta_{k+1} p_k^T A p_i = -r_{k+1}^T A p_i.$$

**Вопрос:** почему валиден второй переход?

# Метод сопряженных градиентов: доказательство

- Идем по индукции.
- **База:**  $p_0$  и  $p_1$  сопряжены в силу подбора  $\beta_1$ .
- **Предположение:** пусть для  $k \geq 1$  все  $\{p_i\}_{i=0}^k$  сопряженные.
- **Переход:** Докажем для  $k+1$ .  $p_{k+1}$  и  $p_k$  сопряжены в силу подбора  $\beta_{k+1}$ . Рассмотрим  $i < k$ :

$$p_{k+1}^T A p_i = -r_{k+1}^T A p_i + \beta_{k+1} p_k^T A p_i = -r_{k+1}^T A p_i.$$

**Вопрос:** почему валиден второй переход? в силу предположения индукции и того, что  $i < k$ .

# Метод сопряженных градиентов: доказательство

- Идем по индукции.
- **База:**  $p_0$  и  $p_1$  сопряжены в силу подбора  $\beta_1$ .
- **Предположение:** пусть для  $k \geq 1$  все  $\{p_i\}_{i=0}^k$  сопряженные.
- **Переход:** Докажем для  $k+1$ .  $p_{k+1}$  и  $p_k$  сопряжены в силу подбора  $\beta_{k+1}$ . Рассмотрим  $i < k$ :

$$p_{k+1}^T A p_i = -r_{k+1}^T A p_i + \beta_{k+1} p_k^T A p_i = -r_{k+1}^T A p_i.$$

**Вопрос:** почему валиден второй переход? в силу предположения индукции и того, что  $i < k$ .

- Осталось показать, что  $-r_{k+1}^T A p_i = 0$ . Запомним это.

# Метод сопряженных градиентов: доказательство

- Докажем, что для  $k \geq 0$  выполнено  $\text{span}\{r_0, \dots, r_k\} = \text{span}\{r_0, \dots, A^k r_0\}$  и  $\text{span}\{p_0, \dots, p_k\} = \text{span}\{r_0, \dots, A^k r_0\}$ .

# Метод сопряженных градиентов: доказательство

- Докажем, что для  $k \geq 0$  выполнено  $\text{span}\{r_0, \dots, r_k\} = \text{span}\{r_0, \dots, A^k r_0\}$  и  $\text{span}\{p_0, \dots, p_k\} = \text{span}\{r_0, \dots, A^k r_0\}$ .
- По индукции. **База:** следует из инициализации.



# Метод сопряженных градиентов: доказательство

- Докажем, что для  $k \geq 0$  выполнено  $\text{span}\{r_0, \dots, r_k\} = \text{span}\{r_0, \dots, A^k r_0\}$  и  $\text{span}\{p_0, \dots, p_k\} = \text{span}\{r_0, \dots, A^k r_0\}$ .
- По индукции. **База:** следует из инициализации.
- **Предположение:** пусть верно для всех  $i \leq k$ .

# Метод сопряженных градиентов: доказательство

- Докажем, что для  $k \geq 0$  выполнено  $\text{span}\{r_0, \dots, r_k\} = \text{span}\{r_0, \dots, A^k r_0\}$  и  $\text{span}\{p_0, \dots, p_k\} = \text{span}\{r_0, \dots, A^k r_0\}$ .
- По индукции. **База:** следует из инициализации.
- **Предположение:** пусть верно для всех  $i \leq k$ .
- **Переход:** докажем для  $k + 1$ . Используя предположение:  $r_k \in \text{span}\{r_0, \dots, A^k r_0\}$  и  $p_k \in \text{span}\{r_0, \dots, A^k r_0\}$ .

# Метод сопряженных градиентов: доказательство

- Докажем, что для  $k \geq 0$  выполнено  $\text{span}\{r_0, \dots, r_k\} = \text{span}\{r_0, \dots, A^k r_0\}$  и  $\text{span}\{p_0, \dots, p_k\} = \text{span}\{r_0, \dots, A^k r_0\}$ .
- По индукции. **База:** следует из инициализации.
- **Предположение:** пусть верно для всех  $i \leq k$ .
- **Переход:** докажем для  $k + 1$ . Используя предположение:  $r_k \in \text{span}\{r_0, \dots, A^k r_0\}$  и  $p_k \in \text{span}\{r_0, \dots, A^k r_0\}$ . Тогда  $Ap_k \in \text{span}\{Ar_0, \dots, A^{k+1} r_0\}$ .

# Метод сопряженных градиентов: доказательство

- Докажем, что для  $k \geq 0$  выполнено  $\text{span}\{r_0, \dots, r_k\} = \text{span}\{r_0, \dots, A^k r_0\}$  и  $\text{span}\{p_0, \dots, p_k\} = \text{span}\{r_0, \dots, A^k r_0\}$ .
- По индукции. **База:** следует из инициализации.
- **Предположение:** пусть верно для всех  $i \leq k$ .
- **Переход:** докажем для  $k + 1$ . Используя предположение:  $r_k \in \text{span}\{r_0, \dots, A^k r_0\}$  и  $p_k \in \text{span}\{r_0, \dots, A^k r_0\}$ . Тогда  $A p_k \in \text{span}\{A r_0, \dots, A^{k+1} r_0\}$ . А зная, что  $r_{k+1} = r_k + \alpha_k A p_k$ , получаем одно включение  $r_{k+1} \in \{r_0, \dots, A^{k+1} r_0\}$ .

# Метод сопряженных градиентов: доказательство

- Докажем, что для  $k \geq 0$  выполнено  $\text{span}\{r_0, \dots, r_k\} = \text{span}\{r_0, \dots, A^k r_0\}$  и  $\text{span}\{p_0, \dots, p_k\} = \text{span}\{r_0, \dots, A^k r_0\}$ .
- По индукции. **База:** следует из инициализации.
- **Предположение:** пусть верно для всех  $i \leq k$ .
- **Переход:** докажем для  $k + 1$ . Используя предположение:  $r_k \in \text{span}\{r_0, \dots, A^k r_0\}$  и  $p_k \in \text{span}\{r_0, \dots, A^k r_0\}$ . Тогда  $A p_k \in \text{span}\{A r_0, \dots, A^{k+1} r_0\}$ . А зная, что  $r_{k+1} = r_k + \alpha_k A p_k$ , получаем одно включение  $r_{k+1} \in \{r_0, \dots, A^{k+1} r_0\}$ . Откуда  $\text{span}\{r_0, \dots, r_{k+1}\} \subseteq \text{span}\{r_0, \dots, A^{k+1} r_0\}$ , но нам нужно равенство.

# Метод сопряженных градиентов: доказательство

- Докажем, что для  $k \geq 0$  выполнено  $\text{span}\{r_0, \dots, r_k\} = \text{span}\{r_0, \dots, A^k r_0\}$  и  $\text{span}\{p_0, \dots, p_k\} = \text{span}\{r_0, \dots, A^k r_0\}$ .
- По индукции. **База:** следует из инициализации.
- **Предположение:** пусть верно для всех  $i \leq k$ .
- **Переход:** докажем для  $k + 1$ . Используя предположение:  $r_k \in \text{span}\{r_0, \dots, A^k r_0\}$  и  $p_k \in \text{span}\{r_0, \dots, A^k r_0\}$ . Тогда  $A p_k \in \text{span}\{A r_0, \dots, A^{k+1} r_0\}$ . А зная, что  $r_{k+1} = r_k + \alpha_k A p_k$ , получаем одно включение  $r_{k+1} \in \{r_0, \dots, A^{k+1} r_0\}$ . Откуда  $\text{span}\{r_0, \dots, r_{k+1}\} \subseteq \text{span}\{r_0, \dots, A^{k+1} r_0\}$ , но нам нужно равенство. Заметим, что из второго предположения:  $A^{k+1} r_0 = A(A^k r_0) \in \text{span}\{A p_0, \dots, A p_k\}$ .

# Метод сопряженных градиентов: доказательство

- Докажем, что для  $k \geq 0$  выполнено  $\text{span}\{r_0, \dots, r_k\} = \text{span}\{r_0, \dots, A^k r_0\}$  и  $\text{span}\{p_0, \dots, p_k\} = \text{span}\{r_0, \dots, A^k r_0\}$ .
- По индукции. **База:** следует из инициализации.
- **Предположение:** пусть верно для всех  $i \leq k$ .
- **Переход:** докажем для  $k + 1$ . Используя предположение:  $r_k \in \text{span}\{r_0, \dots, A^k r_0\}$  и  $p_k \in \text{span}\{r_0, \dots, A^k r_0\}$ . Тогда  $Ap_k \in \text{span}\{Ar_0, \dots, A^{k+1} r_0\}$ . А зная, что  $r_{k+1} = r_k + \alpha_k Ap_k$ , получаем одно включение  $r_{k+1} \in \{r_0, \dots, A^{k+1} r_0\}$ . Откуда  $\text{span}\{r_0, \dots, r_{k+1}\} \subseteq \text{span}\{r_0, \dots, A^{k+1} r_0\}$ , но нам нужно равенство. Заметим, что из второго предположения:  $A^{k+1} r_0 = A(A^k r_0) \in \text{span}\{Ap_0, \dots, Ap_k\}$ . Так как  $(r_{i+1} - r_i)/\alpha_i = Ap_i$  получаем, что  $A^{k+1} r_0 \in \text{span}\{r_0, \dots, r_{k+1}\}$ .

## Метод сопряженных градиентов: доказательство

- Докажем, что для  $k \geq 0$  выполнено  $\text{span}\{r_0, \dots, r_k\} = \text{span}\{r_0, \dots, A^k r_0\}$  и  $\text{span}\{p_0, \dots, p_k\} = \text{span}\{r_0, \dots, A^k r_0\}$ .
- По индукции. **База:** следует из инициализации.
- **Предположение:** пусть верно для всех  $i \leq k$ .
- **Переход:** докажем для  $k + 1$ . Используя предположение:  $r_k \in \text{span}\{r_0, \dots, A^k r_0\}$  и  $p_k \in \text{span}\{r_0, \dots, A^k r_0\}$ . Тогда  $Ap_k \in \text{span}\{Ar_0, \dots, A^{k+1} r_0\}$ . А зная, что  $r_{k+1} = r_k + \alpha_k Ap_k$ , получаем одно включение  $r_{k+1} \in \{r_0, \dots, A^{k+1} r_0\}$ . Откуда  $\text{span}\{r_0, \dots, r_{k+1}\} \subseteq \text{span}\{r_0, \dots, A^{k+1} r_0\}$ , но нам нужно равенство. Заметим, что из второго предположения:  $A^{k+1} r_0 = A(A^k r_0) \in \text{span}\{Ap_0, \dots, Ap_k\}$ . Так как  $(r_{i+1} - r_i)/\alpha_i = Ap_i$  получаем, что  $A^{k+1} r_0 \in \text{span}\{r_0, \dots, r_{k+1}\}$ . Отсюда  $\text{span}\{r_0, \dots, A^{k+1} r_0\} \subseteq \text{span}\{r_0, \dots, r_{k+1}\}$ . Включение в обе стороны доказано.



# Метод сопряженных градиентов: доказательство

- Остался еще переход для второй части.

# Метод сопряженных градиентов: доказательство

- Остался еще переход для второй части.
- По правилу подсчета  $p_{k+1}$ :

$$\text{span}\{p_0, \dots, p_{k+1}\} = \text{span}\{p_0, \dots, p_k, r_{k+1}\}.$$

# Метод сопряженных градиентов: доказательство

- Остался еще переход для второй части.
- По правилу подсчета  $p_{k+1}$ :

$$\text{span}\{p_0, \dots, p_{k+1}\} = \text{span}\{p_0, \dots, p_k, r_{k+1}\}.$$

- По второму предположению индукции:

$$\text{span}\{p_0, \dots, p_{k+1}\} = \text{span}\{r_0, \dots, A^k r_0, r_{k+1}\}.$$

# Метод сопряженных градиентов: доказательство

- Остался еще переход для второй части.
- По правилу подсчета  $p_{k+1}$ :

$$\text{span}\{p_0, \dots, p_{k+1}\} = \text{span}\{p_0, \dots, p_k, r_{k+1}\}.$$

- По второму предположению индукции:

$$\text{span}\{p_0, \dots, p_{k+1}\} = \text{span}\{r_0, \dots, A^k r_0, r_{k+1}\}.$$

- По первому предположению:

$$\text{span}\{p_0, \dots, p_{k+1}\} = \text{span}\{r_0, \dots, r_k, r_{k+1}\}.$$

# Метод сопряженных градиентов: доказательство

- Остался еще переход для второй части.
- По правилу подсчета  $p_{k+1}$ :

$$\text{span}\{p_0, \dots, p_{k+1}\} = \text{span}\{p_0, \dots, p_k, r_{k+1}\}.$$

- По второму предположению индукции:

$$\text{span}\{p_0, \dots, p_{k+1}\} = \text{span}\{r_0, \dots, A^k r_0, r_{k+1}\}.$$

- По первому предположению:

$$\text{span}\{p_0, \dots, p_{k+1}\} = \text{span}\{r_0, \dots, r_k, r_{k+1}\}.$$

- По только что доказанному:

$$\text{span}\{p_0, \dots, p_{k+1}\} = \text{span}\{r_0, \dots, A^{k+1} r_0\}.$$

# Метод сопряженных градиентов: доказательство

- Возвращаемся к  $-r_{k+1}^T A p_i = 0$  для  $i < k$ .

# Метод сопряженных градиентов: доказательство

- Возвращаемся к  $-r_{k+1}^T A p_i = 0$  для  $i < k$ .
- Теперь мы знаем, что
$$p_i \in \text{span}\{r_0, \dots, A^i r_0\}.$$

# Метод сопряженных градиентов: доказательство

- Возвращаемся к  $-r_{k+1}^T A p_i = 0$  для  $i < k$ .
- Теперь мы знаем, что
$$p_i \in \text{span}\{r_0, \dots, A^i r_0\}.$$
- Откуда
$$A p_i \in \text{span}\{A r_0, \dots, A^{i+1} r_0\}.$$



# Метод сопряженных градиентов: доказательство

- Возвращаемся к  $-r_{k+1}^T A p_i = 0$  для  $i < k$ .
- Теперь мы знаем, что
$$p_i \in \text{span}\{r_0, \dots, A^i r_0\}.$$
- Откуда
$$A p_i \in \text{span}\{A r_0, \dots, A^{i+1} r_0\}.$$
- Из только, что доказанного

$$A p_i \in \text{span}\{A r_0, \dots, A^{i+1} r_0\} \subseteq \text{span}\{p_0, \dots, p_{i+1}\}.$$

# Метод сопряженных градиентов: доказательство

- Возвращаемся к  $-r_{k+1}^T A p_i = 0$  для  $i < k$ .

- Теперь мы знаем, что

$$p_i \in \text{span}\{r_0, \dots, A^i r_0\}.$$

- Откуда  $A p_i \in \text{span}\{A r_0, \dots, A^{i+1} r_0\}.$

- Из только, что доказанного

$$A p_i \in \text{span}\{A r_0, \dots, A^{i+1} r_0\} \subseteq \text{span}\{p_0, \dots, p_{i+1}\}.$$

- Но все  $p_j$  для  $j$  от 0 до  $i$  ортогональны  $r^{k+1}$  в силу то, что  $\{p_j\}$  сопряженные в силу предположения индукции. А значит получили то, что нужно.

# Метод сопряженных градиентов: сходимость

## Теорема о сходимости метода сопряженных градиентов

Метод сопряженных градиентов для решения системы линейных уравнений с квадратной положительно определенной матрицей размера  $d$  находит точное решение за не более чем  $d$  итераций.

# Метод сопряженных градиентов: сходимость

## Теорема о сходимости метода сопряженных градиентов

Метод сопряженных градиентов для решения системы линейных уравнений с квадратной положительно определенной матрицей размера  $d$  находит точное решение за не более чем  $d$  итераций.

Эквивалентно минимизации сильной выпуклой квадратичной задачи.

# Метод сопряженных градиентов: сходимость

- **Вопрос:** то, что получили плохо или хорошо?

# Метод сопряженных градиентов: сходимость

- **Вопрос:** то, что получили плохо или хорошо? На самом деле не очень. И метод сопряженных градиентов в момент своего появления 70 лет назад столкнулся с этой проблемой. Т.е. для *точного* решения системы уравнений конкурентен, но не особо популярен.

# Метод сопряженных градиентов: сходимость

- **Вопрос:** то, что получили плохо или хорошо? На самом деле не очень. И метод сопряженных градиентов в момент своего появления 70 лет назад столкнулся с этой проблемой. Т.е. для *точного* решения системы уравнений конкурентен, но не особо популярен.
- Ключевое слово в предыдущем абзаце «*точного*». Метод сопряженных градиентов можно останавливать раньше, он итеративный. А это уже интереснее.

# Метод сопряженных градиентов: сходимость

- **Вопрос:** то, что получили плохо или хорошо? На самом деле не очень. И метод сопряженных градиентов в момент своего появления 70 лет назад столкнулся с этой проблемой. Т.е. для *точного* решения системы уравнений конкурентен, но не особо популярен.
- Ключевое слово в предыдущем абзаце «*точного*». Метод сопряженных градиентов можно останавливать раньше, он итеративный. А это уже интереснее.
- Есть особенности сходимости, которые делают метод еще быстрее.



# Метод сопряженных градиентов: сходимость

## Теорема о сходимости метода сопряженных градиентов

Метод сопряженных градиентов для решения системы линейных уравнений с квадратной положительно определенной матрицей размера  $d$  находит точное решение за не более чем  $r$  итераций, где  $r$  — число уникальных собственных значений матрицы.

# Метод сопряженных градиентов: сходимость

## Теорема о сходимости метода сопряженных градиентов

Метод сопряженных градиентов для решения системы линейных уравнений с квадратной положительно определенной матрицей размера  $d$  находит точное решение за не более чем  $r$  итераций, где  $r$  — число уникальных собственных значений матрицы.

## Теорема о сходимости метода сопряженных градиентов

Метод сопряженных градиентов для решения системы линейных уравнений с квадратной положительно определенной матрицей размера  $d$  имеет следующую оценку сходимости:

$$\|x^k - x^*\|_A \leq 2 \left( \frac{\sqrt{\kappa(A)} - 1}{\sqrt{\kappa(A)} + 1} \right)^k \|x^0 - x^*\|_A.$$

Здесь  $\|x\|_A^2 = x^T A x$  и  $\kappa(A) = \lambda_{\max}(A) / \lambda_{\min}(A)$ .

# Метод сопряженных градиентов: сходимость

## Теорема о сходимости метода сопряженных градиентов

Метод сопряженных градиентов для решения системы линейных уравнений с квадратной положительно определенной матрицей размера  $d$  находит точное решение за не более чем  $r$  итераций, где  $r$  — число уникальных собственных значений матрицы.

## Теорема о сходимости метода сопряженных градиентов

Метод сопряженных градиентов для решения системы линейных уравнений с квадратной положительно определенной матрицей размера  $d$  имеет следующую оценку сходимости:

$$\|x^k - x^*\|_A \leq 2 \left( \frac{\sqrt{\kappa(A)} - 1}{\sqrt{\kappa(A)} + 1} \right)^k \|x^0 - x^*\|_A.$$

Здесь  $\|x\|_A^2 = x^T A x$  и  $\kappa(A) = \lambda_{\max}(A) / \lambda_{\min}(A)$ .

# Метод сопряженных градиентов: сходимость

## Теорема о сходимости метода сопряженных градиентов

Метод сопряженных градиентов для решения системы линейных уравнений с квадратной положительно определенной матрицей размера  $d$  находит точное решение за не более чем  $r$  итераций, где  $r$  — число уникальных собственных значений матрицы.

## Теорема о сходимости метода сопряженных градиентов

Метод сопряженных градиентов для решения системы линейных уравнений с квадратной положительно определенной матрицей размера  $d$  имеет следующую оценку сходимости:

$$\|x^k - x^*\|_A \leq 2 \left( \frac{\sqrt{\kappa(A)} - 1}{\sqrt{\kappa(A)} + 1} \right)^k \|x^0 - x^*\|_A.$$

Здесь  $\|x\|_A^2 = x^T A x$  и  $\kappa(A) = \lambda_{\max}(A) / \lambda_{\min}(A)$ .

# Метод сопряженных градиентов

---

## Алгоритм 4 Метод сопряженных градиентов (классическая версия)

---

**Вход:** стартовая точка  $x^0 \in \mathbb{R}^d$ ,  $r_0 = Ax_0 - b$ ,  $p_0 = -r_0$  количество итераций  $K$

1: **for**  $k = 0, 1, \dots, K - 1$  **do**

$$2: \quad \alpha_k = \frac{r_k^T r_k}{p_k^T A p_k}$$

$$3: \quad x^{k+1} = x^k + \alpha_k p_k$$

$$4: \quad r_{k+1} = r_k + \alpha_k A p_k$$

$$5: \quad \beta_{k+1} = \frac{r_{k+1}^T r_{k+1}}{r_k^T r_k}$$

$$6: \quad p_{k+1} = -r_{k+1} + \beta_{k+1} p_k$$

7: **end for**

**Выход:**  $x^K$

---

# Метод сопряженных градиентов

---

## Алгоритм 5 Метод сопряженных градиентов (классическая версия)

---

**Вход:** стартовая точка  $x^0 \in \mathbb{R}^d$ ,  $r_0 = Ax_0 - b$ ,  $p_0 = -r_0$  количество итераций  $K$

1: **for**  $k = 0, 1, \dots, K - 1$  **do**

2:  $\alpha_k = \frac{r_k^T r_k}{p_k^T A p_k}$

3:  $x^{k+1} = x^k + \alpha_k p_k$

4:  $r_{k+1} = r_k + \alpha_k A p_k$

5:  $\beta_{k+1} = \frac{r_{k+1}^T r_{k+1}}{r_k^T r_k}$

6:  $p_{k+1} = -r_{k+1} + \beta_{k+1} p_k$

7: **end for**

**Выход:**  $x^K$

---

Вспомним, что градиент то «зашит» в  $r_k = Ax^k - b = \nabla f(x^k)$ .

# Метод сопряженных градиентов для произвольной задачи

---

## Алгоритм 6 Метод сопряженных градиентов (Флетчер - Ривс)

---

**Вход:** стартовая точка  $x^0 \in \mathbb{R}^d$ ,  $p_0 = -\nabla f(x_0)$  количество итераций  $K$

- 1: **for**  $k = 0, 1, \dots, K - 1$  **do**
- 2:      $\alpha_k = ?$
- 3:      $x^{k+1} = x^k + \alpha_k p_k$
- 4:      $\beta_{k+1} = \frac{\langle \nabla f(x^{k+1}), \nabla f(x^{k+1}) \rangle}{\langle \nabla f(x^k), \nabla f(x^k) \rangle}$
- 5:      $p_{k+1} = -\nabla f(x^{k+1}) + \beta_{k+1} p_k$
- 6: **end for**

**Выход:**  $x^K$

---

# Метод сопряженных градиентов для произвольной задачи

---

## Алгоритм 7 Метод сопряженных градиентов (Флетчер - Ривс)

---

**Вход:** стартовая точка  $x^0 \in \mathbb{R}^d$ ,  $p_0 = -\nabla f(x_0)$  количество итераций  $K$

- 1: **for**  $k = 0, 1, \dots, K - 1$  **do**
- 2:      $\alpha_k = ?$
- 3:      $x^{k+1} = x^k + \alpha_k p_k$
- 4:      $\beta_{k+1} = \frac{\langle \nabla f(x^{k+1}), \nabla f(x^{k+1}) \rangle}{\langle \nabla f(x^k), \nabla f(x^k) \rangle}$
- 5:      $p_{k+1} = -\nabla f(x^{k+1}) + \beta_{k+1} p_k$
- 6: **end for**

**Выход:**  $x^K$

---

**Вопрос:** как искать шаг  $\alpha_k$ ?



# Метод сопряженных градиентов для произвольной задачи

## Алгоритм 8 Метод сопряженных градиентов (Флетчер - Ривс)

**Вход:** стартовая точка  $x^0 \in \mathbb{R}^d$ ,  $p_0 = -\nabla f(x_0)$  количество итераций  $K$

- 1: **for**  $k = 0, 1, \dots, K - 1$  **do**
- 2:      $\alpha_k = ?$
- 3:      $x^{k+1} = x^k + \alpha_k p_k$
- 4:      $\beta_{k+1} = \frac{\langle \nabla f(x^{k+1}), \nabla f(x^{k+1}) \rangle}{\langle \nabla f(x^k), \nabla f(x^k) \rangle}$
- 5:      $p_{k+1} = -\nabla f(x^{k+1}) + \beta_{k+1} p_k$
- 6: **end for**

**Выход:**  $x^K$

**Вопрос:** как искать шаг  $\alpha_k$ ? Мы хотим минимизировать вдоль направления  $p_k$ , получаем одномерную функцию зависящую от  $\alpha$ .  
Вспомним про бинпоиск и золотое сечение.

# Метод сопряженных градиентов для произвольной задачи

---

## Алгоритм 9 Метод сопряженных градиентов (Полак - Рибьер)

---

**Вход:** стартовая точка  $x^0 \in \mathbb{R}^d$ ,  $p_0 = -\nabla f(x_0)$  количество итераций  $K$

- 1: **for**  $k = 0, 1, \dots, K - 1$  **do**
- 2:      $\alpha_k = \text{Линейный поиск}$
- 3:      $x^{k+1} = x^k + \alpha_k p_k$
- 4:      $\beta_{k+1} = \frac{\langle \nabla f(x^{k+1}), \nabla f(x^{k+1}) - \nabla f(x^k) \rangle}{\langle \nabla f(x^k), \nabla f(x^k) \rangle}$
- 5:      $p_{k+1} = -\nabla f(x^{k+1}) + \beta_{k+1} p_k$
- 6: **end for**

**Выход:**  $x^K$

---

# Метод сопряженных градиентов для произвольной задачи

- Обобщения работают неплохо, но гарантии в теории далеко не самые оптимистичные.

# Метод сопряженных градиентов для произвольной задачи

- Обобщения работают неплохо, но гарантии в теории далеко не самые оптимистичные.
- Лучше иногда делать «рестарты». В данном случае «рестарты» предполагают иногда брать  $\beta_k = 0$ , забывая историю. **Вопрос:** итерация какого метода тогда получится?

# Метод сопряженных градиентов для произвольной задачи

- Обобщения работают неплохо, но гарантии в теории далеко не самые оптимистичные.
- Лучше иногда делать «рестарты». В данном случае «рестарты» предполагают иногда брать  $\beta_k = 0$ , забывая историю. **Вопрос:** итерация какого метода тогда получится? Градиентный спуск.

# Метод сопряженных градиентов для произвольной задачи

- Обобщения работают неплохо, но гарантии в теории далеко не самые оптимистичные.
- Лучше иногда делать «рестарты». В данном случае «рестарты» предполагают иногда брать  $\beta_k = 0$ , забывая историю. **Вопрос:** итерация какого метода тогда получится? Градиентный спуск.
- Подходит как метод «стартер», которым из начальной неизвестной точки, можно близко, но не совсем точно подойти к решению.