

## С3 Классы множеств

Теоретический анализ широкого множества методов оптимизации задействует предположения, которые можно ввести только на множествах, обладающих «хорошими» геометрическими свойствами. Неформально говоря, требуется, чтобы рассматриваемое множество, из которого выбираются параметры, не имело «впадин» или разрывов. Формальное описание такого множества дает понятие выпуклости.

### С3.1 Выпуклые множества

**Определение С3.1.** Множество  $S \subseteq X$  линейного пространства называется *выпуклым*, если для любых двух точек  $x_1, x_2 \in S$  и любого числа  $\alpha \in [0, 1]$ , точка  $\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2$  также принадлежит  $S$ .

Интуитивно, это означает, что отрезок, соединяющий любые две точки множества, полностью лежит во множестве.




Рис. С3.1: Выпуклое множество.




Рис. С3.2: Невыпуклое множество.

**Замечание С3.1.** Здесь и далее под  $X$  понимается линейное пространство, чаще всего это векторное пространство  $\mathbb{R}^d$ . В некоторых случаях рассматриваются и другие пространства, например матричное пространство  $X = \mathbb{R}^{d \times n}$  или пространство симметричных матриц  $\mathbb{S}^d$ .

**Пример С3.1.** Пусть  $a \in \mathbb{R}^d \setminus \{0\}$ ,  $b \in \mathbb{R}$ . Покажите, что полуплоскость

$$S(a, b) = \left\{ x \mid a^\top x \geq b \right\}$$

является выпуклым множеством.

**Решение.** Пусть  $x_1, x_2 \in S(a, b)$ , тогда  $a^\top x_1 \geq b$  и  $a^\top x_2 \geq b$ . Покажем, что для любого  $\alpha \in [0, 1]$  выполняется  $a^\top (\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2) \geq b$ :

$$a^\top (\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2) = \alpha a^\top x_1 + (1 - \alpha)a^\top x_2 \geq \alpha b + (1 - \alpha)b = b.$$

Следовательно, всякий отрезок между  $x_1$  и  $x_2$  также принадлежит полуплоскости. ■

**Пример С3.2.** Пусть  $a, b \in \mathbb{R}^d$  — различные точки. Покажите, что полуплоскость Вороного, то есть множество всех точек, которые ближе к  $a$ , чем к  $b$  в евклидовой норме:

$$V(a, b) = \left\{ x \in \mathbb{R}^d \mid \|x - a\|_2 \leq \|x - b\|_2 \right\}$$

является выпуклым множеством.

*Решение.* Перепишем множество  $V(a, b)$ :

$$\begin{aligned}\|x - a\|_2^2 \leq \|x - b\|_2^2 &\iff (x - a)^\top (x - a) \leq (x - b)^\top (x - b) \\ &\iff x^\top x - 2a^\top x + a^\top a \leq x^\top x - 2b^\top x + b^\top b \\ &\iff 2(b - a)^\top x \leq b^\top b - a^\top a.\end{aligned}$$

Таким образом, множество  $V(a, b)$  является полуплоскостью, а то, что полуплоскость — выпуклое множество, было показано в Примере С3.1. ■

**Пример С3.3.** Пусть  $\|\cdot\|$  — норма в  $\mathbb{R}^d$ ,  $r > 0$  и  $c \in \mathbb{R}^d$ . Покажите, что шар

$$\overline{B}(c, r) = \left\{ x \in \mathbb{R}^d \mid \|x - c\| \leq r \right\}$$

является выпуклым множеством.

*Решение.* Пусть  $x_1, x_2 \in \overline{B}(c, r)$ . Тогда

$$\begin{aligned}\|\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2 - c\| &= \|\alpha(x_1 - c) + (1 - \alpha)(x_2 - c)\| \\ &\leq \alpha\|x_1 - c\| + (1 - \alpha)\|x_2 - c\| \\ &\leq \alpha r + (1 - \alpha)r = r.\end{aligned}$$

Следовательно,  $\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2 \in \overline{B}(c, r)$ . ■

**Пример С3.4.** Пусть  $\|\cdot\|$  — норма в  $\mathbb{R}^d$ ,  $r > 0$  и  $c \in \mathbb{R}^d$ . Покажите, что сфера

$$S(c, r) = \left\{ x \in \mathbb{R}^d \mid \|x - c\| = r \right\}$$

не является выпуклым множеством.

*Решение.* Возьмем две диаметрально противоположные точки  $x + c$  и  $-x + c$  такие, что  $\|x\| = r$ . Тогда  $c$  является их средним арифметическим, но он не принадлежит  $S$ . Получили противоречие. ■

**Пример С3.5.** Покажите, что множество всех положительно полуопределённых матриц  $\mathbb{S}_+^d$  является выпуклым.

*Решение.* Пусть  $X_1, X_2 \in \mathbb{S}_+^d$  и  $\alpha \in [0, 1]$ , тогда матрица  $\alpha X_1 + (1 - \alpha)X_2$  принадлежит  $\mathbb{S}_+^d$ . Покажем это, взяв произвольный  $z \in \mathbb{R}^d$ :

$$z^\top (\alpha X_1 + (1 - \alpha)X_2) z = \alpha z^\top X_1 z + (1 - \alpha)z^\top X_2 z \geq 0.$$

■

**Пример С3.6.** Покажите, что множество матриц  $100 \times 100$  ранга хотя бы 2, у которых все элементы неотрицательные, является невыпуклым.

*Решение.* Пусть  $A$  — верхнетреугольная матрица, у которой все элементы на диагонали и выше равны 1, а  $B = 11^\top - A$  — дополняющая её нижнетреугольная матрица.

Легко заметить, что у матриц  $A$  и  $B$  ранг хотя бы 2, но у матрицы  $\frac{1}{2}A + \frac{1}{2}B = \frac{1}{2}11^\top$  ранг 1. ■

**Пример С3.7.** Покажите, что множество

$$M = \{ x \in \mathbb{R}_{++}^2 \mid x_1 x_2 \geq 1 \}$$

является выпуклым.

*Решение.* Пусть  $x, y \in M$ . Рассмотрим  $\alpha x + (1 - \alpha)y$ , где  $\alpha \in [0, 1]$ :

$$\begin{aligned} (\alpha x_1 + (1 - \alpha)y_1)(\alpha x_2 + (1 - \alpha)y_2) &= \alpha^2 x_1 x_2 + \alpha(1 - \alpha)(x_1 y_2 + x_2 y_1) + (1 - \alpha)^2 y_1 y_2 \\ &\geq \alpha^2 + 2\alpha(1 - \alpha)\sqrt{x_1 x_2 y_1 y_2} + (1 - \alpha)^2 \geq 1. \end{aligned}$$

Таким образом, точка  $\alpha x + (1 - \alpha)y \in M$ , значит  $M$  выпукло. ■

**Пример С3.8.** Покажите, что множество

$$M = \{ x \in \mathbb{R}_{++}^2 \mid \sqrt{x_1} + x_2 \geq 1 \}$$

является выпуклым.

*Решение.* Мы будем использовать следующий несложный факт: если  $z_1, z_2 > 0$  и  $\alpha \in [0, 1]$ , то

$$\sqrt{\alpha z_1 + (1 - \alpha)z_2} \geq \alpha\sqrt{z_1} + (1 - \alpha)\sqrt{z_2}.$$

Вообще говоря, это неравенство Йенсена (0.1) для вогнутой функции, но оно будет пройдено позже, поэтому его можно просто проверить возведением обеих частей неравенства в квадрат.

Пусть  $x, y \in M$ . Рассмотрим  $\alpha x + (1 - \alpha)y$ , где  $\alpha \in [0, 1]$ :

$$\begin{aligned} \sqrt{\alpha x_1 + (1 - \alpha)y_1} + \alpha x_2 + (1 - \alpha)y_2 &\geq \alpha\sqrt{x_1} + (1 - \alpha)\sqrt{y_1} + \alpha x_2 + (1 - \alpha)y_2 \\ &\geq \alpha + (1 - \alpha) = 1. \end{aligned}$$

Таким образом, точка  $\alpha x + (1 - \alpha)y \in M$ , значит  $M$  выпукло. ■

Определение позволяет проверять выпуклость некоторых наиболее простых множеств. В случае, когда множество имеет более сложную структуру, пользоваться определением может быть затруднительно. В связи с этим, требуется расширить математический аппарат анализа выпуклых множеств.

**Утверждение С3.1.** Пусть  $S \subseteq X$  — выпуклое множество. Тогда  $\text{int } S$  (внутренность) и  $\text{cl } S$  (замыкание) также являются выпуклыми множествами.

*Доказательство.*

- Внутренность  $S$  (множество всех точек  $S$ , содержащихся в нем с некоторой окрестностью).

Пусть  $x, y \in \text{int } S$ . По определению внутренней точки существуют радиусы  $r_x$  и  $r_y$  такие, что открытые шары  $B(x, r_x)$  и  $B(y, r_y)$  полностью содержатся в  $S$ . Рассмотрим отрезок, соединяющий  $x$  и  $y$ . Для любой точки  $z \in [x, y]$  можно построить такой шар  $B(z, r_z)$ , который полностью лежит в  $S$ . Действительно, поскольку

шары  $B(x, r_x)$ ,  $B(y, r_y)$  содержатся в выпуклом множестве  $S$ , то отрезки, соединяющие их точки, также лежат в  $S$ . То есть можно выбрать  $r_z = \min\{r_x, r_y\}$  и гарантировать принадлежность  $S$  шару с таким радиусом. Таким образом, все точки отрезка  $[x, y]$  являются внутренними точками  $S$ , поэтому  $\text{int } S$  является выпуклым множеством.




Рис. С3.3: Иллюстрация выпуклости внутренности множества.

- Замыкание  $S$  (множество всех пределов последовательностей из  $S$ ).

Пусть  $x, y \in \text{cl } S$ . Тогда найдутся последовательности  $\{x_k\}_{k=1}^{\infty} \subseteq S$  и  $\{y_k\}_{k=1}^{\infty} \subseteq S$  такие, что  $x_k \rightarrow x$  и  $y_k \rightarrow y$ . Таким образом, для любого  $\alpha \in [0, 1]$  последовательность  $\{\alpha x_k + (1 - \alpha)y_k\}_{k=1}^{\infty} \subseteq S$  и  $\alpha x_k + (1 - \alpha)y_k \rightarrow \alpha x + (1 - \alpha)y \in \text{cl } S$ . ■

Приведем пример, иллюстрирующий это утверждение.

**Пример С3.9.** Множество положительно определённых матриц  $\mathbb{S}_{++}^d$  является выпуклым.

*Доказательство.* Ранее в Примере С3.5 мы показали выпуклость  $\mathbb{S}_+^d$ . Теперь рассмотрим  $A \in \mathbb{S}_{++}^d$ . Из положительной определенности имеем

$$x^\top A x \geq \lambda_{\min}(A), \quad \forall x \in \mathbb{R}^d, \quad \|x\|_2 = 1.$$

Покажем, что  $A$  содержится в  $\mathbb{S}_+^d$  с некоторой окрестностью. Зафиксируем ненулевое возмущение  $E \in \mathbb{S}^d$ . Рассмотрим действие квадратичной формы  $A + tE$  на вектор  $x \in \mathbb{R}^d$  единичной евклидовой нормы при  $t > 0$ :

$$x^\top (A + tE) x = x^\top A x + t x^\top E x \geq \lambda_{\min}(A) + t x^\top E x.$$

Воспользуемся неравенством Коши–Буняковского–Шварца:

$$|x^\top E x| \leq \|E\|_2.$$

Таким образом, имеем

$$x^\top (A + tE) x \geq \lambda_{\min}(A) - t\|E\|_2.$$

Выбрав  $t \leq \frac{\lambda_{\min}(A)}{\|E\|}$ , получим, что

$$x^\top (A + tE)x \geq 0.$$

Таким образом,  $\mathbb{S}_{++} \subseteq \text{int } \mathbb{S}_+$ .

Теперь докажем обратное включение. Предположим, что матрица  $A$  имеет  $\lambda_{\min}(A) = 0$ . Это означает, что существует вектор  $x$  единичной евклидовой нормы, такой, что

$$Ax = 0.$$

Для  $t > 0$  рассмотрим возмущение  $A - txx^\top$ . Тогда имеем

$$x^\top (A - txx^\top)x = x^\top Ax - t = -t < 0.$$

Это доказывает  $\text{int } \mathbb{S}_+ \subseteq \mathbb{S}_{++}^d$ . Тогда  $\mathbb{S}_{++}^d$  выпукло как внутренность выпуклого множества. ■


**Замечание С3.2.** Отметим, что выпуклость  $\mathbb{S}_{++}^d$  может быть проверена значительно проще по определению и пример выше следует воспринимать, как искусственный.

### С3.2 Размерность множеств


Возникает вопрос, как определить размерность выпуклого множества. Сделать это формально помогает понятие аффинной оболочки множества.

**Определение С3.2.** Аффинной оболочкой множества  $S \subseteq X$  будем называть множество вида

$$\text{aff } S = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \left\{ \sum_{i=1}^k \alpha_i x_i \mid \sum_{i=1}^k \alpha_i = 1, \alpha_i \in \mathbb{R}^d, x_i \in S \right\}.$$



(a) Аффинная оболочка двух точек:  
 $y + \lambda(x - y)$ .



(b) Аффинная оболочка трёх точек:  
 $y + \lambda_1(x - y) + \lambda_2(z - y)$ .

Рис. С3.4: Аффинная оболочка через базисные векторы.

Аффинная оболочка имеет «хорошую» геометрию. Оказывается, что это «сдвинутое» линейное подпространство.

**Теорема С3.1.** Аффинная оболочка  $\text{aff } S$  множества  $S \subseteq X$  имеет вид

$$\text{aff } S = s + L_S,$$

где  $s \in \text{aff } S$  — произвольная точка из аффинной оболочки;  $L_S$  — линейное подпространство (непустое подмножество линейного пространства  $X$ , которое само является линейным пространством по отношению к операциям, определенным на  $X$ ), причем  $L_S$  единственное.

*Доказательство.* Зафиксируем  $s \in \text{aff } S$ . Положим

$$L_S = \left\{ x \in \mathbb{R}^d \mid x = y - s, y \in \text{aff } S \right\}.$$

Докажем, что  $L_S$  действительно линейное подпространство. Пусть  $x \in L_S$ , тогда  $x = y - s$ , где  $y \in \text{aff } S$ . По определению аффинной оболочки имеем  $\lambda y + (1 - \lambda)s \in \text{aff } S$ . Тогда

$$\lambda x = \lambda(y - s) = \lambda y + (1 - \lambda)s - s \in L_S.$$

Это доказывает замкнутость относительно операции умножения. Рассмотрим теперь  $x_1 = y_1 - s$ ,  $x_2 = y_2 - s \in L_S$ , где  $y_1, y_2 \in \text{aff } S$ . Так как

$$\frac{y_1 + y_2}{2} \in \text{aff } S,$$

то

$$\frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{y_1 + y_2}{2} - s \in L_S.$$

Домножив равенство на 2, получаем замкнутость  $L_S$  относительно операции сложения. Остается показать единственность. Выберем другую точку  $\tilde{s} \in \text{aff } S$  и определим линейное пространство  $M_S$  аналогично  $L_S$ . Имеем

$$\tilde{s} + L_S = s + (\tilde{s} - s) + L_S = s + L_S = \text{aff } S.$$

Таким образом,  $L_S = M_S$ . ■

Итак, мы определили аффинную оболочку точек, которая является сдвинутым линейным подпространством. Естественно определить  $\dim S = \dim \text{aff } S = \dim L_S$ .

### С3.3 Выпуклая оболочка

**Определение С3.3.** Выпуклой комбинацией точек  $x_1, \dots, x_k \in X$  называется любая точка вида

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i x_i,$$

где  $\sum_{i=1}^k \alpha_i = 1$ ,  $\alpha_i \geq 0$ .

**Утверждение С3.2.** Если  $S \subseteq X$  является выпуклым множеством и  $x_1, \dots, x_k \in S$ , то любая выпуклая комбинация точек  $x_1, \dots, x_k$  также принадлежит  $S$ .

*Решение.* Доказательство проведем индукцией по  $k$ .

- База при  $k = 2$  верна, поскольку тогда это определение выпуклого множества.
- Пусть утверждение верно для  $k - 1$ . Рассмотрим  $x_1, \dots, x_k \in S$ , и пусть  $\alpha_1, \dots, \alpha_k$  таковы, что  $\alpha_1 + \dots + \alpha_k = 1$  и  $0 \leq \alpha_i \leq 1$ . Если  $\alpha_k = 1$ , то утверждение очевидно, поскольку тогда имеем комбинацию из одной точки. В противном случае перепишем комбинацию:

$$\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_k x_k = (1 - \alpha_k) \left( \frac{\alpha_1}{1 - \alpha_k} x_1 + \dots + \frac{\alpha_{k-1}}{1 - \alpha_k} x_{k-1} \right) + \alpha_k x_k,$$

где каждое слагаемое  $\frac{\alpha_i}{1 - \alpha_k}$  лежит в интервале  $[0, 1]$ , а их сумма равна 1. По предположению индукции

$$\hat{x}_{k-1} = \frac{\alpha_1}{1 - \alpha_k} x_1 + \dots + \frac{\alpha_{k-1}}{1 - \alpha_k} x_{k-1} \in S.$$

Комбинация из двух точек  $\hat{x}_{k-1}$  и  $x_k$  принадлежит  $S$  по определению выпуклого множества. ■

**Определение С3.4.** Выпуклой оболочкой множества  $S \subseteq X$  будем называть множество всех выпуклых комбинаций элементов  $S$ :

$$\text{conv } S = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \left\{ \sum_{i=1}^k \alpha_i x_i \mid \sum_{i=1}^k \alpha_i = 1, \alpha_i \geq 0, \alpha_i \in \mathbb{R}, x_i \in S \right\}.$$

**Замечание С3.3.** Так как  $\text{conv } S \subseteq \text{aff } S$ , то  $\dim S = \dim \text{conv } S = \dim \text{aff } S = \dim L_S$ .

**Утверждение С3.3.** Выпуклая оболочка множества  $S \subseteq X$  — выпуклое множество.

*Доказательство.* Рассмотрим две точки  $x, y \in \text{conv } S$ :

$$x = \sum_{i=1}^k \alpha_i x_i, \quad y = \sum_{j=1}^n \beta_j x_j$$

и соединяющий их отрезок:

$$z = \lambda x + (1 - \lambda)y, \quad \lambda \in [0, 1].$$

Заметим, что  $\lambda \alpha_i \geq 0$  и  $(1 - \lambda)\beta_j \geq 0$ . Более того, имеем

$$\sum_{i=1}^k \lambda \alpha_i + \sum_{j=1}^n (1 - \lambda)\beta_j = \lambda + (1 - \lambda) = 1.$$

Таким образом,  $z$  — выпуклая комбинация точек  $S$ , а значит, принадлежит  $\text{conv } S$  по определению. ■

**Утверждение С3.4.** Пусть  $S, T \subseteq X$ . Тогда верны следующие утверждения:

1.  $S \subseteq \text{conv } S$ ;

2.  $S \subseteq T \rightarrow \text{conv } S \subseteq \text{conv } T$ ;

3.  $S$  является выпуклым тогда и только тогда, когда  $S = \text{conv } S$ .

*Доказательство.* Докажем каждый пункт по отдельности.

1. Точка  $x \in S$  принадлежит  $\text{conv } S$  по Определению С3.4. Таким образом,  $S \subseteq \text{conv } S$ .
2. Пусть  $S \subseteq T$ . Поскольку выпуклая комбинация согласно Определению С3.4 строится по всевозможным выпуклым комбинациям всевозможных точек множества, то в  $\text{conv } T$  содержатся те же комбинации, что и в  $\text{conv } S$ . Таким образом, имеем  $\text{conv } S \subseteq \text{conv } T$ .
3. Вложение  $S \subseteq \text{conv } S$  доказано в первом пункте утверждения. Докажем обратное вложение. Рассмотрим точку

$$y = \sum_{i=1}^k \alpha_i x_i \in \text{conv } S.$$

Для всех комбинаций, соответствующим  $k = 2$ , принадлежность  $S$  следует из определения выпуклого множества. Предположим, что утверждение доказано для всех размеров комбинаций, не превосходящих  $k - 1$ . Запишем

$$y = \sum_{i=1}^k \alpha_i x_i = (1 - \alpha_k) \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\alpha_i}{1 - \alpha_k} x_i + \alpha_k x_k.$$

Заметим, что  $\frac{\alpha_i}{1 - \alpha_k} \geq 0$  и

$$\sum_{i=1}^{k-1} \frac{\alpha_i}{1 - \alpha_k} = \frac{1 - \alpha_k}{1 - \alpha_k} = 1.$$

Таким образом, точка

$$\hat{x} = \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\alpha_i}{1 - \alpha_k} x_i$$

является выпуклой комбинацией из  $\text{conv } S$  размера  $k - 1$ . Она принадлежит  $S$  по предположению индукции. Тогда  $y$  принадлежит отрезку, соединяющему точки множества  $S$ , а значит,  $y \in S$  по определению выпуклого множества. Таким образом, если  $S$  выпукло, то  $S = \text{conv } S$ . ■

**Теорема С3.2.** Выпуклая оболочка  $S \subseteq X$  является пересечением всех выпуклых множеств, содержащих  $S$ .

*Доказательство.* Пусть  $T$  — пересечение всех выпуклых множеств, содержащих  $S$ .

⊖ Рассмотрим  $y \in \text{conv } S$ :

$$y = \sum_{i=1}^k \alpha_i x_i \in \text{conv } S.$$



Поскольку  $S \subseteq T$  по определению множества  $T$ , то имеем  $x_i \in T$  для любых  $i = \overline{1, k}$ . Это означает, что  $y \in \text{conv } T$  как выпуклая комбинация точек  $T$ . По определению  $T$  имеем  $T = \bigcap_i T_i$  — пересечение всех выпуклых множеств, содержащих  $S$ . Пусть  $x, y \in \bigcap_i T_i$ , тогда  $\alpha x + (1 - \alpha)y \in T_i$  для любого  $i$ , значит, эта точка лежит в пересечении. Таким образом,  $T$  — выпуклое множество и  $T = \text{conv } T$  согласно Утверждению С3.4. Следовательно,  $y \in T$ , откуда следует, что  $\text{conv } S \subseteq T$ .

⊖  $\text{conv } S$  является выпуклым множеством согласно Утверждению С3.3. Отсюда следует, что  $T \subseteq \text{conv } S$ . ■

**Пример С3.10.** Докажите, что

$$S = \text{conv} \left\{ xx^\top, x \in \mathbb{R}^d \mid \|x\|_2 = 1 \right\} = \left\{ A \in \mathbb{S}_+^d \mid \text{Tr}(A) = 1 \right\} = T.$$

*Доказательство.*

⊖ Докажем, что  $S \subseteq T$ . Рассмотрим  $x \in \mathbb{R}^d : \|x\|_2 = 1$ . Пользуясь Утверждением С1.5, покажем, что след матрицы  $xx^\top$  равен 1:

$$\text{Tr}(xx^\top) = \text{Tr}(x^\top x) = \|x\|_2^2 = 1.$$

Кроме того, очевидно, что  $xx^\top \in \mathbb{S}_+^d$ . Действительно, для произвольного  $v \in \mathbb{R}^d$  имеем

$$v^\top xx^\top v = \|v^\top x\|_2^2 \geq 0.$$

Теперь рассмотрим матрицу  $A \in \text{conv} \{ xx^\top \mid x \in \mathbb{R}^d, \|x\|_2 = 1 \}$ . Поскольку выпуклая оболочка — множество всевозможных выпуклых комбинаций, имеем

$$A = \alpha_1 x_1 x_1^\top + \alpha_2 x_2 x_2^\top + \dots + \alpha_k x_k x_k^\top,$$

где  $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_k = 1$ ,  $\alpha_i \geq 0$  и  $\|x_i\|_2 = 1$ . Поэтому, используя линейность следа, получим  $\text{Tr}(A) = 1$ . Более того, она положительно полуопределенна в силу положительной полуопределенности каждого из слагаемых и неотрицательности  $\alpha_i$ .

⊖ Докажем, что  $S \supseteq T$ . Пусть  $A \in \mathbb{S}_+^d$  и  $\text{Tr}(A) = 1$ . Матрица  $A$  симметричная, значит у нее есть базис из собственных векторов и она диагонализуема:

$$A = V \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_d) V^\top,$$

где  $V$  — ортогональная матрица. Заметим, что

$$1 = \text{Tr}(A) = \text{Tr}(V \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_d) V^\top).$$

Пользуясь Утверждением С1.5, запишем

$$\text{Tr}(V \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_d) V^\top) = \text{Tr}(V^\top V \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_d)) = \text{Tr}(\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_d)).$$

Таким образом, имеем

$$1 = \text{Tr}(\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_d)) = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_d,$$

где каждая  $\lambda_i$  неотрицательна в силу положительной полуопределенности матрицы  $A$ . Кроме того, из разложения  $A$  можно сделать вывод, что

$$A = \lambda_1 v_1 v_1^\top + \lambda_2 v_2 v_2^\top + \dots + \lambda_d v_d v_d^\top,$$

где  $v_i$  — соответствующие нормированные собственные вектора. Таким образом, представили  $A$  как выпуклую комбинацию одноранговых матриц, образованных вектором единичной нормы. Это завершает доказательство. ■

**Теорема С3.3 (Каратеодори).** Пусть  $S \subseteq X$  и  $\dim \operatorname{conv} S = d$ . Тогда любой элемент  $\operatorname{conv} S$  представляется как выпуклая комбинация не более чем  $d+1$  точки множества  $S$ .

*Доказательство.* Будем доказывать от противного. Пусть имеется вектор  $x \in \operatorname{conv} S$ , такой что

$$x = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i, \quad \sum_{i=1}^n \alpha_i = 1, \quad \alpha_i \geq 0, \quad n \geq d+2.$$

$x_2 - x_1, \dots, x_n - x_1$  принадлежат линейному пространству  $L_S$  из Теоремы С3.1. Поскольку  $\dim \operatorname{conv} S = d$ , то и  $\dim L_S = d$ . Это означает, что система векторов линейно зависима, поскольку состоит из  $d+1$  вектора. Тогда существуют  $\beta_2, \dots, \beta_n$  не равные нулю одновременно такие, что

$$\sum_{i=2}^n \beta_i (x_i - x_1) = 0.$$

Обозначим

$$\gamma_1 = -\sum_{i=2}^n \beta_i, \quad \gamma_i = \beta_i.$$

Это значит, что можно переписать исходное выражение как

$$\sum_{i=1}^n \gamma_i x_i = 0, \quad \sum_{i=1}^n \gamma_i = 0,$$

причем не все  $\gamma_i$  равны нулю одновременно. Это означает, что среди них есть такие, которые принимают отрицательное значение. Обозначим

$$a = \min \left\{ -\frac{\alpha_i}{\gamma_i} : \gamma_i < 0 \right\} = -\frac{\alpha_k}{\gamma_k}.$$

Тогда для любого  $i$   $\alpha_i + a\gamma_i \geq 0$ , причем

$$x = \sum_{i=1}^n (\alpha_i + a\gamma_i) x_i, \quad \sum_{i=1}^n (\alpha_i + a\gamma_i) = 1,$$

то есть это выпуклая комбинация. Но поскольку  $\alpha_k + a\gamma_k = 0$  по определению, то мы уменьшили число точек на одну. Этот процесс можно продолжать до тех пор, пока не окажется  $n = d+1$ . В таком случае продолжать итеративно будет невозможно, поскольку система  $d$  векторов в  $d$ -мерном пространстве не обязательно линейно зависима. ■

**Теорема С3.4. (Теорема Радона)** Пусть  $\dim X = d$ , тогда любое конечное множество  $S \subseteq X$ , содержащее не менее  $d+2$  точек, может быть разбито на два непересекающихся множества, выпуклые оболочки которых пересекаются.

*Доказательство.* Рассмотрим набор точек  $x_1, \dots, x_n \in S$ ,  $n \geq d+2$ . Из доказательства Теоремы С3.3 утверждается линейная зависимость системы  $x_2 - x_1, \dots, x_n - x_1$ . Тогда существует нетривиальная комбинация этих векторов с коэффициентами  $\beta_2, \dots, \beta_n$ , равная нулю. Введем коэффициенты  $\gamma_1, \dots, \gamma_n$  аналогично предыдущему доказательству:

$$\sum_{i=1}^n \gamma_i x_i = 0, \quad \sum_{i=1}^n \gamma_i = 0.$$

Выделим положительные и отрицательные коэффициенты в разные группы. Не ограничивая общность рассуждений, будем считать, что  $\gamma_1, \dots, \gamma_m \geq 0$ ,  $\gamma_{m+1}, \dots, \gamma_n < 0$ . Тогда имеем

$$\sum_{i=1}^m \tilde{\gamma}_i x_i = \sum_{i=m+1}^n \tilde{\gamma}_i x_i,$$

где для  $j = \overline{1, m}$  определили  $\tilde{\gamma}_i = \frac{\gamma_i}{\sum_{j=1}^m \gamma_j}$ , а для остальных —  $\tilde{\gamma}_i = -\frac{\gamma_i}{\sum_{j=1}^m \gamma_j}$ . Нетрудно видеть, что в обеих частях равенства стоят выпуклые комбинации. Таким образом, получили общую точку двух выпуклых оболочек. ■

**Теорема С3.5. (Теорема Хелли для конечных семейств)** Пусть  $\dim X = d$  и есть семейство из  $n \geq d+1$  выпуклых множеств  $S_1, \dots, S_n \subseteq X$  такое, что любые  $d+1$  имеют общую точку. Тогда все эти множества имеют общую точку.

*Доказательство.*

- База при  $n = d+1$  очевидна.
- Рассмотрим  $n \geq d+2$  выпуклых множеств  $S_1, \dots, S_n$ . Предположим, что утверждение доказано для любых  $n-1$  выпуклых множеств. Из каждого выберем некоторую точку:

$$x_k = \bigcap_{i=1, i \neq k}^n S_i.$$

Такие пересечения не пусты по предположению индукции. Но  $n \geq d+2$ , то есть можем воспользоваться теоремой Радона. Переставив индексы, получаем существование такого  $m$ , что  $\text{conv}\{x_1, \dots, x_m\}$  и  $\text{conv}\{x_{m+1}, \dots, x_n\}$  имеют общую точку  $x$ . Более того, каждая точка из множества  $x_1, \dots, x_m$  содержится в каждом из множеств  $S_{m+1}, \dots, S_n$ . Это означает, что  $x$  содержится в каждом  $S_{m+1}, \dots, S_n$  в силу их выпуклости. Аналогично доказывается принадлежность  $x$  множествам  $S_1, \dots, S_m$ . Таким образом, нашли общую точку для всех множеств. ■

### С3.4 Операции, сохраняющие выпуклость

**Определение С3.5.** Функция  $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^n$  называется *аффинной*, если найдутся  $b \in \mathbb{R}^n$  и  $A \in \mathbb{R}^{n \times d}$  такие, что  $f(x) = Ax + b$  для любого  $x \in \mathbb{R}^d$ .

Ряд базовых операций имеет свойство сохранять выпуклость множеств.

**Утверждение С3.5** (Параграф 3 из [32]). Следующие операции оставляют множество выпуклым:

- **Пересечение:** Пусть  $\{S_i\}_{i \in I} \subseteq X$  — не обязательно конечное семейство выпуклых множеств, тогда пересечение  $\bigcap_{i \in I} S_i$  также является выпуклым множеством.
- **Линейная комбинация:** Пусть  $S_1, S_2 \subseteq X$  — выпуклые множества и  $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ , тогда линейная комбинация  $c_1 S_1 + c_2 S_2 = \{c_1 x_1 + c_2 x_2 \mid x_1 \in S_1, x_2 \in S_2\}$  также является выпуклым множеством.
- **Взятие образа при аффинном отображении:** Пусть  $S \subseteq X$  — выпуклое множество,  $f$  — аффинная функция, тогда  $f(S)$  также является выпуклым множеством.
- **Взятие прообраза при аффинном отображении:** Пусть  $S \subseteq X$  — выпуклое множество,  $f$  — аффинная функция, тогда  $f^{-1}(S)$  также является выпуклым множеством.
- **Произведение:** Пусть  $S_1, S_2, \dots, S_n \subseteq X$  — выпуклые множества, тогда декартово произведение  $S_1 \times S_2 \times \dots \times S_n$  также выпукло.

**Пример С3.11.** Покажите, что многогранник:

$$S(A, b, C, d) = \left\{ x \in \mathbb{R}^d \mid Ax \preceq b, Cx = d \right\},$$

где  $A \in \mathbb{R}^{n \times d}$ ,  $b \in \mathbb{R}^n$ ,  $C \in \mathbb{R}^{k \times d}$  и  $d \in \mathbb{R}^k$  является выпуклым.

*Решение.* Ограничения можно переписать в следующем виде:  $a_i^\top x \leq b_i$  и  $c_i^\top x = d_i$ . То есть многогранник является выпуклым множеством, как пересечение полуплоскостей и плоскостей. ■

**Пример С3.12.** Покажите, что множество

$$S(\alpha, \beta) = \left\{ a \in \mathbb{R}^d \mid p(0) = 1, |p(t)| \leq 1 \forall t : \alpha \leq t \leq \beta \right\},$$

где

$$p(t) = a_0 + a_1 t + \dots + a_{d-1} t^{d-1},$$

является выпуклым.

*Решение.* Переформулируем ограничения на коэффициенты  $a$  в виде линейных равенств и неравенств. Тогда

$$p(0) = 1 \iff a_0 = 1,$$

ограничение вида  $|p(t)| \leq 1$  переписывается как

$$-1 \leq a_0 + a_1 t + \dots + a_{d-1} t^{d-1} \leq 1.$$

Обозначим это пересечение двух полуплоскостей за  $\mathcal{H}_t$ . Тогда множество коэффициентов переписывается в виде

$$\bigcap_{t \in [\alpha, \beta]} \mathcal{H}_t \cap \{a \mid a_0 = 1\},$$

что является выпуклым как пересечение выпуклых множеств. ■

**Пример С3.13.** Покажите, что множество

$$S(A, b, c, d) = \left\{ x \in \mathbb{R}^d \mid \|Ax + b\| \leq c^\top x + d \right\},$$

где  $A \in \mathbb{R}^{n \times d}$ ,  $b \in \mathbb{R}^n$ ,  $c \in \mathbb{R}^d$  и  $d \in \mathbb{R}$  является выпуклым.

*Решение.* Докажем для начала, что множество

$$T = \left\{ (x, t) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R} \mid \|x\| \leq t \right\}$$

является выпуклым. Это несложно делается по определению: возьмем  $\alpha \in [0, 1]$  и  $(x_1, t_1), (x_2, t_2) \in T$ . Тогда

$$\|\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2\| \leq \alpha\|x_1\| + (1 - \alpha)\|x_2\| \leq \alpha t_1 + (1 - \alpha)t_2,$$

что означает

$$(\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2, t_1 + (1 - \alpha)t_2) \in T.$$

Заметим, что  $S = f^{-1}(T)$ , где  $f(x) = (Ax + b, c^\top x + d)$  — аффинная функция. Получим, что  $S$  выпукло как прообраз выпуклого множества при аффинном отображении. ■

**Пример С3.14.** Покажите, что множество

$$S(P, c) = \left\{ x \in \mathbb{R}^d \mid x^\top P x \leq (c^\top x)^2, \ c^\top x \geq 0 \right\},$$

где  $P \in \mathbb{S}_+^d$  и  $c \in \mathbb{R}^d$  является выпуклым.

*Решение.* Как уже известно из Примера С3.13, множество

$$T = \left\{ (x, t) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R} \mid \|x\| \leq t \right\}$$

является выпуклым. Воспользуемся фактом (Пример С2.11), что

$$\forall P \in \mathbb{S}_+^d \ \exists Q \in \mathbb{S}_+^d : P = Q^2,$$

поэтому наше множество  $S$  переписывается как

$$S = \left\{ x \in \mathbb{R}^d \mid \|Qx\| \leq c^\top x \right\}.$$

Заметим, что  $S = f^{-1}(T)$ , где  $f(x) = (Qx, c^\top x)$  — аффинная функция. Поэтому  $S$  выпукло как прообраз выпуклого множества при аффинном отображении. ■

## С3.5 Конусы

**Определение С3.6.** Множество  $K \subseteq X$  называется *конусом*, если для любых  $x \in K$  и  $\alpha \geq 0$  точка  $\alpha x$  также принадлежит  $K$ .

**Пример С3.15.** В качестве простейшей иллюстрации определения, приведем ряд базовых примеров конусов:

- Множества  $\emptyset$ ,  $\{0\}$  и  $\mathbb{R}^d$ ;
- Прямая, проходящая через начало координат;
- Луч, начинающийся из начала координат;
- Любое линейное подпространство.

**Утверждение С3.6.**  $K \subseteq X$  является выпуклым конусом тогда и только тогда, когда для любых  $x_1, x_2 \in K$ ,  $\alpha_1, \alpha_2 \geq 0$  выполнено  $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 \in K$ .

*Доказательство.*

⊕ Пусть  $K$  — выпуклый конус. Тогда верно, что для  $x_1, x_2 \in K$  выполняется включение  $\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2 \in K$ ,  $0 \leq \alpha \leq 1$ . Возьмем  $\alpha_1, \alpha_2 \geq 0$  одновременно неравные нулю и представим через них  $\alpha$ :

$$\alpha = \frac{\alpha_1}{\alpha_1 + \alpha_2}.$$

Тогда воспользуемся определением конуса и получим  $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 \in K$ .

⊖ Пусть  $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 \in K$ , тогда если взять  $\alpha_1 = \alpha$  и  $\alpha_2 = 1 - \alpha$  при  $0 \leq \alpha \leq 1$ , то получим, что  $K$  является выпуклым. А если взять  $\alpha_1 = \alpha$  и  $\alpha_2 = 0$ , то получим, что  $K$  — конус. ■

**Утверждение С3.7.** Пересечение любого семейства множеств сохраняет свойство быть конусом, а также сохраняется свойство быть выпуклым конусом.

*Доказательство.*

- Пусть  $x \in \bigcap_{i \in I} K_i$ , тогда  $\alpha x \in \bigcap_{i \in I} K_i$ , так как  $\alpha x \in K_i \forall i \in I$ .
- Следует из того, что пересечение выпуклых множеств выпукло и пересечение конусов — конус. ■

**Пример С3.16.** Покажите, что множество

$$M = \left\{ (x, t) \in \mathbb{R}^{d+1} \mid \|x\| \leq t \right\}$$

является выпуклым конусом.

*Решение.* Проверим по критерию. Пусть  $\alpha_1, \alpha_2 \geq 0$ ,  $(x_1, t_1), (x_2, t_2) \in M$ , тогда

$$\|\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2\| \leq \alpha_1 \|x_1\| + \alpha_2 \|x_2\| \leq \alpha_1 t_1 + \alpha_2 t_2.$$

Следовательно, точка  $\alpha_1(x_1, t_1) + \alpha_2(x_2, t_2)$  также из  $M$ , то есть это выпуклый конус согласно утверждению С3.6. ■

**Пример С3.17.** Покажите, что  $\mathbb{S}_+^d$  является выпуклым конусом.

*Решение.* Нетрудно заметить, что умножение матрицы на неотрицательный коэффициент не меняет определённости. Ровно как и суммирование положительно полуопределённых матриц даёт положительно полуопределённую матрицу. ■

**Пример С3.18.** Матрица  $X \in \mathbb{S}^d$  называется *коположительной*, если  $z^\top X z \geq 0$  для всех  $z \succeq 0$ . Покажите, что множество коположительных матриц является выпуклым конусом.

*Решение.* Обозначим множество коположительных матриц за  $C$ . Перепишем это множество как пересечение полуплоскостей:

$$C = \bigcap_{z \succeq 0} \left\{ X \in \mathbb{S}^d \mid z^\top X z \geq 0 \right\}.$$

Полуплоскости являются выпуклыми конусами, а операция пересечения сохраняет это свойство, поэтому  $C$  также является выпуклым конусом. ■

### С3.6 Теоремы об отделимости

**Теорема С3.6 (Теорема об отделимости, Следствие 1.9.3 из [31]).** Пусть  $S$  и  $T$  — непересекающиеся непустые выпуклые множества в  $\mathbb{R}^d$ . Тогда найдётся  $\lambda \in \mathbb{R}^d \setminus \{0\}$  такое, что

$$\sup_{x \in S} \lambda^\top x \leq \inf_{y \in T} \lambda^\top y.$$

То есть любые два непересекающиеся множества можно разделить гиперплоскостью.

**Пример С3.19.** Пусть  $S$  — выпуклое множество с непустой внутренностью и точка  $x_0$  такая, что  $x_0 \notin \text{int } S$ . Покажите, что найдётся  $\lambda \in \mathbb{R}^d \setminus \{0\}$  такое, что

$$\sup_{x \in S} \lambda^\top x \leq \lambda^\top x_0.$$

*Решение.* Пусть  $x \in \text{int } S$ ,  $B_{r_0}(x) \subseteq S$  и  $y \in \partial S$ , тогда весь интервал  $[x, y)$  принадлежит внутренности, так как если  $z \in [x, y)$ , то  $B_r(z) \subseteq \text{int } S$ , где

$$r = r_0 \frac{\|y - z\|_2}{\|y - x\|_2}.$$

Поэтому  $\partial S \subseteq \text{cl int } S$ . Получаем, что

$$\text{cl } S = \text{cl}(\text{int } S \cup \partial S) \subseteq \text{cl}(\text{cl int } S) = \text{cl int } S.$$

А так как  $\text{cl } S \supseteq \text{cl int } S$ , то  $\text{cl } S = \text{cl int } S$ . Заметим теперь, что  $\text{int } S$  и  $x_0$  — непустые непересекающиеся выпуклые множества. Применив для них теорему об отделимости, получим

$$\sup_{x \in \text{int } S} \lambda^\top x \leq \lambda^\top x_0.$$

Требуемое утверждение получается взятием замыкания  $y \in \text{int } S$ . ■

**Пример С3.20.** Рассмотрим систему строгих неравенств

$$Ax \prec b, \quad A \in \mathbb{R}^{n \times d}, \quad b \in \mathbb{R}^n.$$

Она неразрешима тогда и только тогда, когда

$$\exists \lambda \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} : \lambda^\top A = 0, \lambda^\top b \leq 0, \lambda \succeq 0.$$

*Доказательство.*  $\Rightarrow$  Пусть система  $Ax \prec b$  неразрешима, тогда выпуклые множества  $\{b - Ax \mid x \in \mathbb{R}^d\}$  и  $\mathbb{R}_{++}^d$  не пересекаются. Воспользуемся теоремой об отделмости:

$$\exists \lambda \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} : \sup_{x \in \mathbb{R}^d} \lambda^\top (b - Ax) \leq \inf_{y \in \mathbb{R}_{++}^d} \lambda^\top y.$$

Так как правая часть неравенства не может быть равна  $-\infty$ , то  $\lambda \succeq 0$ . Помимо этого, устремляя  $y \rightarrow 0$ , получим

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^d} \lambda^\top (b - Ax) \leq 0.$$

Так как супремум ограничен сверху, можем сделать вывод, что

$$\lambda^\top A = 0, \lambda^\top b \leq 0.$$

$\Leftarrow$  Предположим, что нашелся такой  $x \in \mathbb{R}^d$ , что  $Ax \prec b$ . Так как  $\lambda \succeq 0$  и  $\lambda \neq 0$ , то

$$\lambda^\top Ax < \lambda^\top b \leq 0.$$

Отсюда мы получаем противоречие с тем, что  $\lambda^\top A = 0$ . ■

Сила данного утверждения в том, что разрешимость какого-то линейного неравенства от  $x$ , который лежит в  $d$ -мерном пространстве, сводится к разрешимости системы равенств и неравенств от переменной из  $n$ -мерного пространства. Это может быть полезно в случае  $n \ll d$ .

**Пример С3.21.** Операция взятия сопряжения нормы является *инволюцией*, т.е.  $\|\cdot\|_{**} = \|\cdot\|$ .

*Доказательство.* Для начала заметим, что

$$\|y\|_* = \sup_{\|x\| \leq 1} x^\top y \geq \left( \frac{x}{\|x\|} \right)^\top y.$$

Из этого следует

$$x^\top y \leq \|x\| \|y\|_*.$$

Более того, так как  $\{x \mid \|x\| \leq 1\}$  — компакт, то непрерывная функция  $x^\top y$  по теореме Вейерштрасса достигает на нем максимума в какой-то точке, следовательно

$$\forall y \exists x \neq 0 : x^\top y = \|x\| \|y\|_*.$$

Отсюда следует, что

$$\forall x \exists y \neq 0 : \|x\|_{**} \|y\|_* = x^\top y \leq \|x\| \|y\|_*.$$

Поэтому

$$\forall x \rightarrow \|x\|_{**} \leq \|x\|.$$



Далее будем пользоваться теоремой об отделимости. Зафиксируем  $x \neq 0$  (случай  $x = 0$  очевиден) и рассмотрим два выпуклых непересекающихся множества:

$$B(0, 1) = \{ x \mid \|x\| < 1 \}, \left\{ \frac{x}{\|x\|} \right\}.$$

По теореме об отделимости найдётся такой  $y \neq 0$ , что

$$\sup_{\|x\| < 1} x^\top y \leq \left( \frac{x}{\|x\|} \right)^\top y.$$

Следовательно,

$$\|y\|_* = \sup_{\|x\| \leq 1} x^\top y = \sup_{\|x\| < 1} x^\top y \leq \left( \frac{x}{\|x\|} \right)^\top y \leq \frac{\|x\|_{**} \|y\|_*}{\|x\|}.$$

Получили неравенство в обратную сторону:

$$\forall x \rightarrow \|x\|_{**} \geq \|x\|.$$

Это рассуждение завершает доказательство. ■

Этот пример показывает, что иногда теорема об отделимости может возникать в совершенно неожиданных местах, и без ее применения некоторые утверждения доказать нелегко.

**Теорема С3.7 (Теорема о строгой отделимости, Следствие 1.9.2 из [31]).** Пусть  $S$  и  $T$  — непересекающиеся непустые выпуклые множества в  $\mathbb{R}^d$ , причем  $S$  — компакт, а  $T$  замкнуто. Тогда найдётся  $\lambda \in \mathbb{R}^d \setminus \{0\}$  такое, что


$$\sup_{x \in S} \lambda^\top x < \inf_{y \in T} \lambda^\top y.$$

**Пример С3.22.** Множества

$$A = \left\{ (x, y) \mid x > 0, y \geq \frac{1}{x} \right\},$$

$$B = \left\{ (x, y) \mid x > 0, y \leq -\frac{1}{x} \right\}.$$

не могут быть строго отделены гиперплоскостью.



*Доказательство.* Предположим, нашелся такой  $\lambda \neq 0$ , который строго разделяет эти множества, то есть найдутся  $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$  такие, что

$$\sup_{a \in A} \lambda^\top a < c_1 < c_2 < \inf_{b \in B} \lambda^\top b.$$

Для любого  $x > 0$  выполняются включения

$$\left(x, \frac{1}{x}\right) \in A, \quad \left(x, -\frac{1}{x}\right) \in B.$$

Возьмем такой достаточно большой  $x > 0$ , что выполняется

$$2 \left| \frac{\lambda_2}{x} \right| < c_2 - c_1.$$

Тогда

$$\lambda_1 x + \frac{\lambda_2}{x} < c_1 \implies \lambda_1 x - \frac{\lambda_2}{x} < c_1 - 2 \frac{\lambda_2}{x} \leq c_1 + 2 \left| \frac{\lambda_2}{x} \right| < c_2,$$

то есть

$$\lambda_1 x - \frac{\lambda_2}{x} < c_2.$$

Это приводит нас к противоречию. ■