$$C^{(3)}_{\text{lequ}}{}^{i1\_i2\_i3\_i4\_} \to$$

$$\hbar \left(\frac{1}{32} s_\gamma c_\gamma \frac{1}{m_\oplus{}^2} y_e{}^{i1i2} y_u{}^{i3i4} \left(5 g_1{}^2 + 3 g_2{}^2\right) + \frac{1}{16} s_\gamma c_\gamma y_e{}^{i1i2} y_u{}^{i3i4} \left(5 g_1{}^2 + 3 g_2{}^2\right) \text{LF}_{1,2}[m_\oplus] - \right.$$
$$\frac{1}{24} m_1 \tilde{\mu} g_1{}^2 y_e{}^{i1i2} y_u{}^{i3i4} \text{LF}_{1,1,1,1,0}\left[m_1, m_e{}^{i2}, m_q{}^{i3}, \tilde{\mu}\right] -$$
$$\frac{1}{6} m_1 \tilde{\mu} g_1{}^2 y_e{}^{i1i2} y_u{}^{i3i4} \text{LF}_{1,1,1,1,0}\left[m_1, m_{\tilde{e}}{}^{i2}, m_{\tilde{u}}{}^{i4}, \tilde{\mu}\right] -$$
$$\frac{1}{48} m_1 \tilde{\mu} g_1{}^2 y_e{}^{i1i2} y_u{}^{i3i4} \text{LF}_{1,1,1,1,0}\left[m_1, m_{\tilde{l}}{}^{i1}, m_{\tilde{q}}{}^{i3}, \tilde{\mu}\right] - \frac{1}{12} m_1 \tilde{\mu} g_1{}^2 y_e{}^{i1i2} y_u{}^{i3i4}$$
$$\left. \text{LF}_{1,1,1,1,0}\left[m_1, m_{\tilde{l}}{}^{i1}, m_{\tilde{u}}{}^{i4}, \tilde{\mu}\right] - \frac{3}{16} m_2 \tilde{\mu} g_2{}^2 y_e{}^{i1i2} y_u{}^{i3i4} \text{LF}_{1,1,1,1,0}\left[m_2, m_{\tilde{l}}{}^{i1}, m_{\tilde{q}}{}^{i3}, \tilde{\mu}\right] \right)$$